

# 적게 먹되, 부실하게 먹지 않기

식욕이 줄어드는 것은 기회이지만, 무작정 굶으면 근육·수분·미량영양소가 같이 흔들립니다. 접시 구성을 단순하게 바꿉니다.

# 한 접시 공식은 단순할수록 오래 갑니다

단백질, 채소, 탄수화물을 모두 남기되 양과 순서를 조절합니다.

식욕이 줄었다고 한 종류만 먹으면 오래 못 갑니다. **단백질 먼저, 채소 충분히, 탄수화물은 작게**가 기본 공식입니다.

## PROTEIN

### 매끼 단백질

달걀·생선·두부·살코기·콩류 중 하나를 먼저 둡니다.

## VEG


### 채소와 섬유질

변비 예방과 포만감 안정에 도움이 됩니다.

## CARB

### 탄수화물


밥·빵·면은 굵기보다 양을 줄이고 천천히 먹습니다.



균형 식판

# 배가 빨리 부를수록 먹는 순서가 중요합니다

식사량이 줄 때 영양 우선순위를 잘못 잡으면 피로와 근손실이 생길 수 있습니다.



식사 순서

처음 5분은 단백질과 채소에 씁니다. 그 뒤 밥을 천천히 먹으면 포만감이 올라와도 필요한 영양을 먼저 확보할 수 있습니다.

## FIRST

### 첫 입

국물보다 단백질을 먼저 먹습니다.

## PACE

### 속도

한 숟가락 내려놓기, 15-20분 식사 시간을 목표로 합니다.

## STOP

### 멈춤 기준

배가 불편해지기 전, 70-80% 포만감에서 멈춥니다.

# 굶기와 튀김은 서로 다른 방식으로 치료를 방해합니다

굶으면 근육이 빠지고, 기름진 식사는 오심·역류를 키울 수 있습니다.

GLP-1 치료 중 위 배출이 느려질 수 있어 기름진 음식, 과식, 야식은 더 오래 불편할 수 있습니다. 반대로 굶기는 요요와 근손실을 부릅니다.

## AVOID

### 줄이기

튀김, 크림소스, 과식, 야식, 빠른 식사.

## DO NOT


### 굶기 금지

하루 한 끼만 먹는 방식은 근육과 담낭 건강에 불리할 수 있습니다.

## SMART

### 대체

죽·수프만 오래 먹기보다 단백질을 작게라도 포함합니다.



위장 부담 줄이기

# 외식은 실패가 아니라 설계가 필요한 상황입니다

약 때문에 많이 못 먹는 날일수록 무엇을 남길지보다 무엇을 먼저 먹을지 정합니다.



외식 전략

회식·외식에서는 처음부터 절반만 덜어두고 단백질과 채소를 먼저 먹습니다. 남기는 연습도 치료 기술입니다.

## ORDER

### 주문

구이·찜·국물 적은 메뉴를 우선합니다.

## PLATE

### 덜어먹기

처음부터 작은 접시에 나눠 담아 속도를 낮춥니다.

## DRINK

### 음주 주의

술은 탈수, 저혈당, 과식, 위장 증상을 모두 키울 수 있습니다.

## 이번 회차는 접시를 바꾸기

이번 주는 칼로리 계산보다 식사 순서와 접시 구성을 먼저 잡습니다.

**01** 식욕 감소는 기회지만, **영양 결핍**이 되면 안 됩니다.

**03** 굵기와 기름진 과식은 모두 피해야 합니다.

**02** 단백질을 먼저 먹고 탄수화물은 작게 남깁니다.

**04** 외식은 양보다 순서와 속도를 설계합니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과  
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요