

PM 주스(FitLine), 도움·주의·부작용·검사 신호로 설명하기

제품 사진과 라벨을 먼저 확인하고, 혈당·위장·카페인·상호작용 관점에서 환자에게 짧고 명확하게 안내합니다.

HELPFUL

도움될 수 있는 경우

CAUTION

조심해야 하는 경우

SIDE EFFECTS

흔한 불편 증상

TESTING

검사가 필요한 신호

정보 기준: 2026-06 · 진료실 설명용

**핵심 질문은 “몸에 좋은가?”보다 “내
환자에게 안전한가?”입니다.**

PM/FitLine 제품은 치료제가 아니라
건강기능식품입니다. 다만 당·카페인·나이아신·미네랄·
섬유 성분 때문에 환자군별 주의가 달라집니다.

먼저 어떤 PM 제품인지부터 확인합니다

환자가 "PM 주스"라고 말해도 실제 제품은 여러 가지입니다. 사진·라벨·섭취 시간까지 확인해야 상담이 정확합니다.

COMMON SET

PowerCocktail · Restorate · Activize

외래에서 가장 자주 만나는 조합입니다. 아침 영양/섬유, 저녁 미네랄, 각성/활력 제품이 섞여 있습니다.

같은 "주스"라도 성분과 주의점이 다릅니다.

FREQUENT CONFUSION

C-Balance는 별도 제품

"당이 떨어진다"는 설명은 C-Balance 광고가 제품군 전체로 일반화된 경우가 많습니다.

혈당 상담은 제품명을 분리해서 봅니다.

LABEL FIRST

국가·버전별 라벨 차이

과당 순서, 당류 표시, 미네랄 함량은 유통품 라벨에 따라 달라질 수 있습니다.

환자에게 실제 제품 사진을 요청합니다.

DO NOT ASSUME

"PM"은 저녁 복용 의미가 아닙니다

PM-International/FitLine 계열 제품을 뜻하는 경우가 많습니다. 동명이품도 있어 오인 가능성이 있습니다.

브랜드와 제품명을 함께 확인합니다.



3개 제품은 상담 포인트가 다릅니다

“좋은 영양제인가?”보다 어느 제품에 당·카페인·미네랄·섬유가 들어 있는지 나누어 설명합니다.

아침 · 15 g

PowerCocktail

과당, 아카시아검/식이섬유, 비타민 B/C/E, 셀레늄, 과라나 카페인, 유산균, 강황·생강·포도씨 성분이 섞인 아침용 분말입니다.

도움 가능

불규칙한 식사, 저섬유 식사 보완

흔한 불편

복부팽만, 가스, 속쓰림, 카페인 민감

확인 필요

당뇨·지방간·GERD·IBS에서는 라벨 먼저

과당 섬유 카페인 비타민 강황/생강

상담 초점: 혈당·복부팽만·카페인 민감성

저녁/취침 전 · 6.7 g

Restorate

과당/구연산 기반에 칼슘, 마그네슘, 아연, 철, 구리, 망간, 크롬, 셀레늄, 비타민 D3가 들어간 미네랄 제품입니다.

도움 가능

섭취 부족이 의심되는 미네랄 보완

흔한 불편

구연산 속쓰림, 마그네슘 관련 설사

확인 필요

CKD, 전해질 이상, 갑상선약·항생제 간격

과당 구연산 Ca/Mg/Zn 철 크롬

상담 초점: 신장기능·갑상선약/항생제 흡수 간격

아침/운동 전 · 5 g

Activize Oxyplus

B군 비타민, 나이아신, 카페인/과라나, 비트루트·강황·생강 계열 성분으로 각성감·활력감을 기대하는 제품입니다.

도움 가능

오전 활동 전 일시적 각성감

흔한 불편

불면, 두근거림, 불안, 홍조

확인 필요

부정맥·고혈압·불면·당뇨에서는 주의

B군 나이아신 카페인 비트루트 강황/생강

상담 초점: 불면·두근거림·홍조·혈당 방향성

도움이 된다면 이런 제한된 상황입니다

치료 효과가 아니라 “보조적으로 느낄 수 있는 변화”입니다. 시작한다면 목표와 중단 기준을 먼저 정합니다.



NUTRITION GAP

식사가 불규칙한 성인

식사 질이 낮고 비타민·미네랄 보충 목적이
분명한 경우, 단기간 보조 선택지로 볼 수
있습니다.

BOWEL SUPPORT

가벼운 변비·저섬유 식사

섬유/프리바이오틱 성분이 배변 규칙성에
보조가 될 수 있으나, 복부팽만을 같이 봐야
합니다.

MINERAL SUPPORT

미네랄 섭취 부족 의심

신장기능이 정상이고 약물 간격 문제가 없을 때,
미네랄 보충 목적을 분명히 하고 관찰합니다.

ALERTNESS

일시적 각성감

카페인 민감성이 없다면 오전 활동 전 각성감을
느낄 수 있습니다. 불면·심계항진이 생기면
중단합니다.

하지만 이런 기대는 제품 근거와 맞지 않습니다

환자 설명은 판매 후거나 NTC 문구보다 실제 라벨과 임상적으로 확인 가능한 결과를 기준으로 정리합니다.

BLOOD SUGAR

“혈당이 떨어진다”

PM 주스 전체에 적용할 수 없습니다. 제품에는 과당/포도당, 카페인, 나이아신이 포함될 수 있어 당뇨약 대체는 금물입니다.

C-Balance 광고와 혼동하지 않습니다.

STOMACH DISEASE

“위염·역류가 낫는다”

상부위장관 질환 치료 근거는 없습니다. 구연산, 생강/강황, 카페인 등 속쓰림·역류를 악화시킬 수 있습니다.

장과 위를 분리해서 설명합니다.

MYTH

“명현반응이니 참고 먹기”

홍조, 속쓰림, 두근거림, 설사는 호전 신호가 아니라 이상반응일 수 있습니다.

불편하면 멈추고 원인을 확인합니다.

ABSORPTION CLAIM

NTC·흡수율 문구

흡수율 주장은 임상적 치료 효과, 혈당 개선, 위장병 호전을 입증하는 자료와 다릅니다.

흡수 ≠ 질병 결과 개선

SPORT QUALITY

도핑/품질 인증

순도·도핑 안전성 참고자료일 수는 있지만, 당뇨·위장·피로 치료 효과 인증은 아닙니다.

품질과 효능을 분리합니다.

CLINIC PHRASE

짧은 설명

“드셔도 되는지와 효과가 입증됐는지는 다른 문제입니다. 안전하게 보려면 라벨과 약을 같이 봐야 합니다.”

환자 선택은 존중하되 위험 기준은 선명하게

당뇨·지방간·고중성지방에서는 주의 쪽으로 기울입니다

PM/FitLine 제품은 “무당 건강주스”로 설명하면 부정확합니다. 실제 유통품 라벨의 당·열량을 확인합니다.

FRUCTOSE / SUGAR

과당·당류 확인

PowerCocktail 라벨에는 과당과 “sugar and sweetener” 문구가 확인됩니다.
Restorate·Activize도 당 성분 확인이 필요합니다.

CAFFEINE

카페인 민감성

과라나 유래 카페인도 각성감뿐 아니라 불면, 불안, 심계항진, 역류 악화를 유발할 수 있습니다.

NIACIN

나이아신 방항성

고용량 나이아신 연구에서는 신규 당뇨 위험 증가가 보고되었습니다. 제품 용량에서 효과 크기는 불확실하지만 혈당 상승상 주의합니다.

STOP RULE

처방약 대체 금지

혈당약을 줄이고 PM 주스로 대체하려는 경우는 명확히 만류하고 HbA1c·혈당일지를 확인합니다.



흔한 부작용은 위장 증상부터 묻습니다

섬유·이눌린·아카시아검, 구연산, 생강/강황, 카페인이 들어가면 장에는 도움과 불편이 함께 나타날 수 있습니다.



BLOATING

복부팽만·가스

발효성 섬유와 이눌린은 변비에는 보조가 될 수 있지만, IBS 성향에서는 가스와 팽만을 악화시킬 수 있습니다.

BOWEL CHANGE

설사·복통·변 변화

섬유, 마그네슘, 산성 성분이 장운동과 수분을 바꾸며 설사나 경련성 통증을 만들 수 있습니다.

UPPER GI

속쓰림·역류

구연산, 카페인, 공복 복용은 위산 역류와 속쓰림을 악화시킬 수 있어 GERD 환자는 특히 조심합니다.

RED FLAG

계속되면 중단

검은변, 혈변, 체중감소, 야간 설사, 빈혈, 지속 구토가 있으면 건강식품 문제가 아니라 검사 대상입니다.

두근거림·불면·홍조는 명현반응이 아닙니다

Activize와 PowerCocktail의 각성감은 주로 카페인/과라나 맥락에서 설명하고, 홍조는 나이아신 반응으로 안내합니다.

CAFFEINE

불면·불안·떨림

오후 복용, 카페인 민감자, 공황/불안 성향에서는 수면과 심박 증상이 먼저 악화될 수 있습니다.

PALPITATION

두근거림·홍부불편

부정맥, 미조절 고혈압, 갑상선항진증, 흉통 병력이 있으면 시작 전부터 권하지 않는 편이 안전합니다.

NIACIN FLUSH

얼굴 화끈거림·홍조

나이아신의 혈관 확장 반응일 수 있습니다. 심하거나 반복되면 복용 지속 이유가 없습니다.

ALLERGY

두드러기·발진

가려움, 입술/눈 주위 부종, 호흡곤란이 동반되면 즉시 중단하고 진료가 필요합니다.



이런 경우는 조심하거나 피합니다

환자가 원하면 “절대 금지”보다 위험 이유를 짚고, 필요한 경우 검사·복용 간격·중단 기준을 제시합니다.

METABOLIC

당뇨·전당뇨·지방간

당·과당, 카페인, 나이아신 방향성 때문에 “혈당에 좋은 주스”로 권하면 위험합니다.

혈당일지와 HbA1c로 확인

HEART / SLEEP

부정맥·고혈압·불면

카페인 민감성과 심계항진, 불안, 수면 악화를 먼저 확인합니다.

흉통·실신이면 심전도 우선

KIDNEY

CKD·전해질 문제

미네랄 제품은 신장기능 저하에서 축적·전해질 문제를 만들 수 있어 검사 확인이 우선입니다.

Cr/eGFR, 전해질 확인

MEDICATION

갑상선약·항생제·골다공증약

칼슘/철/마그네슘은 레보티록신, 퀴놀론·테트라사이클린, 비스포스포네이트 흡수를 방해할 수 있습니다.

복용 간격 조정 필요

BLEEDING / PROCEDURE

항응고제·시술 예정

강황/생강 성분, 다약제 병용, 내시경·수술 예정이면 담당의와 중단 여부를 조율합니다.

내시경/수술 전 목록 공유

SPECIAL POPULATION

임신·수유·소아·알레르기

카페인, 고함량 비타민/미네랄, 유산균, 식물추출물 안전성을 쉽게 일반화하지 않습니다.

제품별 금기와 라벨 확인

이럴 땐 검사하고 원인을 확인합니다

“먹고 불편했다”를 모두 제품 탓으로만 보지 않습니다. 위험 신호는 기저질환 평가로 연결합니다.

검은변·혈변·빈혈

위장관 출혈 가능성 확인

체중감소·야간증상

지속 설사, 야간 통증, 발열 포함

지속 속쓰림·구토

역류/위염/담도 문제 평가

항달·짙은 소변

간담도·약물/보충제 관련 평가

두근거림·홍통·실신

카페인 민감성만으로 단정 금지

혈당 악화·저혈당 반복

당뇨약 조정 여부와 HbA1c 확인



외래에서는 라벨 → 약물 → 검사 순서로 봅니다

복용을 무조건 막기보다, 환자별 위험을 빠르게 선별하고 기록 가능한 목표를 정합니다.

1

제품 확인

사진, 제품명, 1회량, 하루 섭취량, 복용 시간, C-Balance 여부를 확인합니다.

PowerCocktail / Restore /
Activize 구분

라벨의 당·카페인·미네랄 확인

실제 복용 시간과 양 기록

2

약물·질환 확인

당뇨약, 항응고제, 갑상선약, 항생제,
CKD, 부정맥, GERD, 임신/수유를
문습니다.

당뇨약·항응고제·항혈소판제

레보티록신·항생제·골다공증약

CKD·부정맥·불면·GERD

3

필요 검사

CBC, 간/신장기능, 전해질,
공복혈당/HbA1c, 지질/TG를 기본으로
맞춥니다.

CBC · AST/ALT · bilirubin

Cr/eGFR · Na/K/Mg/Ca

FPG/HbA1c · TG/lipid

4

중단 기준

위장증상 지속, 혈당 악화, 두근거림,
홍조/발진, 황달, 흉통이면 중단 후
재평가합니다.

혈변·검은변·체중감소

흉통·실신·심한 두근거림

황달·호흡곤란·전신 두드러기

결론은 간단합니다: 제품 확인, 위험군 확인, 이상하면 중단

복용 여부는 환자가 결정하더라도, 치료 대체와 위험 신호 방치는 피해야 합니다.

가져올 것

제품 사진, 라벨, 약봉투, 복용 시간 기록

기록할 것

혈당, 속쓰림/설사, 두근거림, 수면 변화

멈출 것

혈변·황달·흉통·실신·호흡곤란·혈당 악화



모바일로 다시 보기