

# 위내시경 후 주의사항

위내시경 (EGD · Esophagogastroduodenoscopy) 후 안전하고 빠른 회복을 위한 단계별 안내입니다. 진정(수면) 회복,식이 재개, 조직검사 (Biopsy) 후 관리, 복약 재개 시점을 한 장으로 정리했습니다.



## 회복 단계별 타임라인

- 0 직후 (30분~1시간) · 인후 마취 회복기** — 목 마취(Topical anesthesia)가 풀릴 때까지 음식·물 모두 금지. 침은 뱉지 말고 그대로 삼키세요. 진정(수면) 내시경을 받으신 분은 어지러움·졸림이 남아 있을 수 있어 보호자 동반 귀가 필수, 당일 운전·대중교통 단독 이용·중요한 의사결정·기계 조작은 금지입니다.
- 1 1~2시간 후 · 식이 재개 시점** — 물을 한 모금씩 먼저 마셔보고 사레(흡인)가 들리지 않으면 미음·죽부터 천천히 시작하세요. 삼킴 반사(Gag reflex)가 완전히 돌아온 뒤(보통 1~2시간) 음식을 드시는 것이 안전합니다. 사레가 들리면 식사를 중단하고 30분 더 기다린 후 재시도.
- 2 당일 저녁 · 식사 주의** — 부드러운 음식(죽·미음·연두부·흰살생선) 위주로. **뜨거운 음식·국물은 검사 후 6시간 이상 피해 주세요** — 식도·위 점막이 일시적으로 예민합니다. 맵고 자극적인 음식, 카페인, 탄산, 술, 담배는 당일 절대 금지. 평소 식사량의 2/3 정도만 드시고 천천히 씹어 드세요.
- 3 다음날부터 · 정상 활동 복귀** — 특별한 증상이 없으면 평소 식단으로 점진 복귀 가능합니다. 가벼운 인후 불편감·트림·복부 팽만은 검사 중 주입한 공기 때문이며 1~2일 내 자연 호전됩니다. 단, 조직검사를 받으신 경우 아래 안내를 추가로 따라 주세요.

### 조직검사 (BIOPSY) 받으신 경우

- 1. 당일 식사** — 죽·미음만, 뜨거운 음식 금지 (출혈 예방)
- 2. 2~3일간** 자극적·딱딱한 음식·뜨거운 음식 회피
- 3. 음주·흡연·격렬한 운동**은 최소 2일간 금지
- 4. 약간의 갈색 토물·소량 출혈**은 가능 (점차 호전)
- 5. 결과 확인** — 약 1~2주 후 예약된 외래일에 내원
- 6. H. pylori 검사** 동시 시행 시 결과지를 함께 안내

### 복약 재개 (MEDICATION RESUMPTION)

- 1. 일반 약** — 식사 재개 후 평소대로 복용
- 2. 항혈소판제 (Aspirin·Plavix)** — 의사 지시 따라 재개
- 3. 항응고제 (와파린·엘리퀴스·자렐토)** — 의사 확인 필수
- 4. 당뇨약·인슐린** — 식사량에 맞춰 용량 조절
- 5. PPI·위산억제제** 처방 시 안내된 일정대로
- 6. 조직검사 시 항혈전제** 재개 시점은 외래에서 결정

### 즉시 병원·응급실로 연락하세요 · CALL CLINIC

- 1. 다량의 토혈 (Hematemesis)** — 선홍색 피 또는 커피 찌꺼기 양상의 구토
- 2. 흑색변 (Melena) · 혈변** — 검고 끈적한 변, 또는 붉은 혈변 (위장관 출혈 의심)
- 3. 지속·악화되는 복통 또는 가슴 통증** — 검사 부위 천공(Perforation) 가능성
- 4. 38°C 이상 발열·오한·호흡곤란·삼킴 곤란 (Dysphagia)** — 즉시 응급실 방문

