약은 시작점,
생활은 엔진

마운자로·위고비 치료를 시작하기 전, 기대효과·안전확인·목표설정을 먼저 맞춥니다. 체중계 숫자보다 중요한 것은 근육과 대사 건강입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약은 식욕을 낮추고 포만감을 돕는 도구입니다

약이 식사량을 줄여 주더라도, 무엇을 먹고 어떻게 움직일지는 여전히 치료의 중심입니다

약이 도와주는 부분

마운자로·위고비는 **주 1회 주사**로 식욕과 포만감 신호에 작용합니다. 허기와 과식을 줄이고, 작은 식사에도 포만감을 느끼도록 돕습니다.

약이 못 하는 부분

근육 지키기, 식사 선택, 탈수 예방, 오래 유지하는 습관은 **나의 생활**이 맡아야 합니다.

목표 다시 정하기

체중 숫자만이 아니라 허리둘레·혈압·혈당·지방간 위험이 좋아지는지를 같이 봅니다.




그림 · 식욕·포만감 경로 — 약은 뇌와 위장 사이의 신호에 작용합니다(설명용 그림).

Tip · 감량의 질은 단백질, 근력운동, 수면, 정기 진료가 결정합니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 미국비만의학회 영양 권고

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

첫 처방 전에는 기준선을 남깁니다

체중만 재면 반쪽입니다 — 허리둘레·혈압·혈액검사·복용약을 같이 봐야 안전합니다



기준선 기록이란

치료 전 상태를 기록해 두면 정체기와 부작용을 해석하기 쉬워집니다. 특히 **당뇨약을 함께 쓰는 분**은 저혈당 위험도 확인합니다.

체중·허리둘레

매주 같은 조건으로 체중을, 월 1회 허리둘레를 잽니다(병원 권장 주기).

혈당·간·콩팥·지질

당뇨·지방간·콩팥 기능·콜레스테롤 상태를 치료 전후로 비교합니다.

먹는 약 점검

인슐린·설폰요소제(혈당약), 이뇨제, 위장약은 증상에 따라 조정할 수 있습니다.

Tip · 혈압도 첫 처방 전에 함께 재서 남겨 둡니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항(당뇨약·저혈당) · 광교바른내과 진료 안내(기록 주기)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

용량은 천천히 올리는 것이 치료입니다

빠르게 올리면 감량이 아니라 오심·구토·탈수로 이어질 수 있습니다

약	시작 용량	이렇게 올립니다
위고비	0.25 mg 주 1회	보통 4주 간격으로 올립니다. 유지 용량은 처방에 따릅니다
마운자로	2.5 mg 주 1회	4주 뒤부터 5 mg 이상으로 단계적으로 올리는 것을 고려합니다

⚠ 증상이 먼저입니다

심한 오심·구토·설사, 식사를 못 하는 상태가 있으면 **증량보다 조절이 먼저**입니다.



그림 · 단계적 증량 — 한 칸씩, 몸이 견디는지 보며 올립니다(설명용 그림).

Tip · 두 약 모두 낮은 용량에서 시작해 단계적으로 올립니다 — 속도보다 견딜 수 있는 치료가 더 오래 갑니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

감량 이후를 먼저 설계합니다

치료의 성공은 몇 kg 감량보다, 줄어든 체중을 유지할 수 있는 생활 습관입니다



그림 · 상담·체중·식사·운동·수면 — 유지 습관을 하나씩 쌓습니다.

1 주 1회 기록 같은 요일·같은 시간

매일 재는 것보다 주간 평균을 봅니다.

2 근육 지키기 단백질 + 근력운동

감량 속도가 빠르면 근육 손실이 커질 수 있어 단백질과 근력운동을 같이 합니다.

3 진료에서 조정 혼자 판단하지 않기

부작용·정체기·약 중단 계획은 진료에서 함께 정합니다.

Tip · 요요를 줄이는 기본 — 매주 체중, 매일 단백질, 주 2회 근력운동, 충분한 수면.

근거 · 미국비만의학회 영양 권고 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침 · 광교바른내과 진료 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

목표 체중 뒤에도 유지 계획을 이어갑니다

비만은 장기 관리가 필요한 만성 재발성 질환입니다

다시 늘어나는 이유

강의는 중단 뒤 체중 재증가를 의지 부족만의 문제로 보지 않습니다. 식욕과 체중이 되돌아가려는 생물학적 반응을 함께 설명합니다.

처음부터 유지까지

목표 체중에 도달했다는 이유만으로 약을 임의로 끊지 않습니다. 식사·저항운동을 이어 가며 효과와 부작용, 치료 지속의 부담을 진료 때 점검합니다.

중단·변경을 원한다면

체중·혈당과 식사량을 함께 기록해 가져오세요. 유지용량이나 대체 치료, 중단 뒤 추적 계획을 의료진과 정합니다. 용량·투여 간격은 스스로 바꾸지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 똑똑한 비만치료 의사되기: GLP-1 기반약제를 중심으로(정창희)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이번 회차는 기록부터 시작

첫 주는 몸의 반응을 관찰하고 기준선을 남깁니다 · 집에서 볼 1장 요약: **시작 안내문**

이번 회차 핵심

01 처음 목표는 **빠른 감량**보다 안전한 시작입니다.

02 기준선 기록은 정체기와 부작용을 해석하는 기준이 됩니다.

03 증량은 정해진 일정보다 **몸이 견디는지**가 먼저입니다.

04 약은 도구이고, 유지 습관이 치료의 본체입니다.

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

참고한 자료 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내
미국 질병통제예방센터 신체활동 지침
미국비만의학회 영양 권고 · 광교바른내과 진료 안내