
# 운동은 벌칙이 아니라 대사 신호

약을 시작한 첫 주부터 가벼운 걷기를 붙이면 혈당·식욕·수면이 같이 안정됩니다. 목표는 완벽한 운동이 아니라 끊기지 않는 활동량입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 걷기는 체중보다 먼저 혈당에 도움이 됩니다

식후 10분 걷기만 붙여도 혈당 패턴과 식욕 반동을 줄이는 데 도움이 됩니다



### 하루에 나눠 넣는 10분

처음부터 1시간 운동을 목표로 잡으면 오래 못 갑니다. 식후·출퇴근·계단·집안일처럼 하루에 나눠 넣는 **10분**이 더 현실적입니다.

### 첫 목표

식후 10분 걷기, 하루 1회부터 시작합니다.

### 나눠서 쌓기

10분씩 3번도 30분 운동입니다. 이어서 하지 않아도 됩니다.

### 몸에 생기는 변화

근육이 포도당을 쓰면서 식후 혈당과 졸림이 줄어들 수 있습니다.

Tip · 식사 뒤, 출퇴근길, 계단 — 하루 중 이미 있는 틈에 10분을 넣으세요.

근거 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침 · 광교바른내과 진료 안내(식후 10분 걷기)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 성인 기준은 주 150분, 시작은 절반부터

성인 기준은 주 150분 중간 강도 유산소와 주 2일 근력운동 — 아래 1·2주차 분량은 병원의 시작 예시입니다

**70~90분**

**1주차**

하루 10~15분, 주 5~6일

**90~120분**

**2주차**

컨디션이 괜찮으면 한 번에 20분까지

**150분**

**목표**

오심·어지럼 없이 유지되면 천천히

### 주간 걷기 목표

처음 2주는 150분을 채우기보다 **기록이 끊기지 않는 패턴**을 만드는 시기입니다. 진료 때 걸음 수보다 실제로 가능한 시간을 같이 조정합니다.



Tip · 중간 강도란 숨이 약간 차지만 대화는 할 수 있는 정도입니다.

근거 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침(주 150분·주 2일 근력) · 광교바른내과 진료 안내(1·2주차 예시)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 약 시작 초반에는 무리한 운동이 독이 될 수 있습니다

식사량이 줄고 수분이 부족하면 어지럼·저혈당·탈수가 생길 수 있습니다



그림 · 수분·회복 — 운동과 휴식의 균형을 맞춥니다(설명용 그림).

### 이럴 땐 멈추세요

식은땀, 심한 어지럼, 가슴 통증, 숨이 차서 힘든 느낌이 있으면 운동을 중단합니다.

### 수분이 먼저

구토·설사가 있거나 더운 날에는 운동보다 수분과 전해질 보충이 먼저입니다.

### 당뇨약을 함께 쓰는 분

인슐린·설폰요소제(혈당약)를 쓰는 분은 운동 전후에 저혈당 증상이 없는지 확인합니다.

Tip · 식사를 거의 못 한 날의 고강도 운동은 위험할 수 있습니다 — 몸의 신호를 보고 강도를 낮추는 것도 치료입니다.

근거 · 위고비·마운자로 허가사항 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 운동복을 입기 전에도 운동은 시작됩니다

주차·계단·청소·산책처럼 생활 안에서 활동량을 올리면 실패가 적습니다

| 이럴 때 | 이렇게 해 보세요 |
|---|---|
| **이미 있는 습관에 붙이기** | 식사 뒤 10분, 퇴근길 한 정거장 먼저 내리기, 통화하며 걷기 |
| **무릎·허리가 불편하면** | 평지 걷기, 실내 자전거, 물속 운동을 고려합니다 |
| **덤으로 좋아지는 잠** | 낮 활동량이 늘면 밤잠의 질이 좋아지고 야식 욕구도 줄 수 있습니다 |



그림 · 생활 속 루틴 — 운동화·물·식사·잠을 하루 흐름에 잇습니다(설명용 그림).

Tip · 식후 → 양치 → 걷기처럼 이미 있는 습관 뒤에 붙이면 오래 갑니다.

근거 · 미국 질병통제예방센터 신체활동 지침 · 광교바른내과 진료 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이번 회차는 10분부터 쌓기

이번 주는 식후와 일상 속에 자주 넣는 움직임이 목표입니다 · 집에서 볼 1장 요약: **시작 안내문**

## 이번 회차 핵심

01 운동 시작은 식후 10분 걷기면 충분합니다.

02 처음부터 주 150분을 억지로 채우지 않아도 됩니다.

03 식사를 못 하거나 탈수·어지럼이 있으면 운동 강도를 낮춥니다.

04 운동은 따로 하는 행사가 아니라 생활에 붙이는 습관입니다.

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요

**참고한 자료** 위고비·마운자로 허가사항 · 한국릴리 안내
미국 질병통제예방센터 신체활동 지침
미국비만의학회 영양 권고 · 광교바른내과 진료 안내