# 아이가 자꾸 배가 아파요 검사는 정상인데, 왜 그럴까요?

## 소아 기능성 복통·과민성 장 증후군 — 약 없이 식사와 생활습관으로 편안해지는 근거 기반 관리

# 대부분은 위험한 병이 아닙니다

검사에서 이상이 없는 반복성 복통은 대개 '기능성'이며, 시간과 좋은 생활습관으로 대다수가 좋아집니다

**90% 이상**

반복성 복통으로 병원을 찾은 아이 **10명 중 9명 이상**은 검사에서 위험한(기질적) 원인이 없는 '기능성'입니다.

**대부분 식사·생활 관리로 좋아집니다**

### 장이 망가진 것이 아닙니다

혈액검사·내시경에서 이상이 보이지 않지만 복통이 반복되는 흔한 상태입니다. 뇌와 장을 잇는 신경망(뇌-장 축)이 **예민해진 것**입니다.

### 나쁜 병으로 번지지 않습니다

기능성 복통과 과민성 장 증후군은 암이나 염증성 장 질환으로 **진행하지 않습니다**.

### 그래도 잘 이해해야 합니다

통증이 반복되면 아이의 불안·수면·학교생활이 힘들 수 있어, 이해하고 관리하는 것이 중요합니다.

Tip · 아이 앞에서는 걱정보다 "괜찮아질 거야"라는 말이 먼저입니다.

근거 · Rome IV 2016

# 기능성 복통과 과민성 장 — 뇌-장 축의 문제입니다

검사에 나오지 않을 뿐, 아이가 느끼는 통증은 진짜입니다

### 장이 예민해진 상태

장의 신경이 예민해지면 정상적인 장 운동이나 가스도 뇌에서 **심한 통증**으로 느껴집니다. 이것을 '내장 과민성'이라고 합니다.

### 꾀병도, 부모 잘못도 아닙니다

예민한 성격이나 꾀병 때문이 아니라 의학적으로 확인된 뇌-장 신경의 반응 변화입니다.

### 통증을 키우는 '방아쇠'

스트레스·긴장·불규칙한 생활·수면 부족, 특정 음식이 통증을 더 자주, 더 세게 만듭니다. 그래서 식사·생활을 다듬어 과민 반응을 가라앉히는 접근이 효과적입니다.




그림 · 뇌와 장은 신경으로 이어져 있어, 예민해진 신호가 통증으로 크게 느껴집니다(설명용 그림).

근거 · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 효과는 있는데 잘 먹지 못한다면

김효원 교수 Q&A · 처방한 진료팀과 조절합니다.

### 연자가 소개한 방법

식욕부진이 있을 때 트레스탄을 함께 처방해 호전되는 아이들이 있으며, 그래도 호전되지 않으면 약물휴일이나 주말에 지속시간이 짧은 제형을 사용하는 경험을 답했습니다.

### 아이의 반응을 공유합니다

약의 효과, 식사량, 식욕·성장 변화를 처방한 진료팀에 알려 함께 조절합니다.



아이의 식사와 몸 상태 변화를 기록해 진료 때 함께 살펴봅니다.

Q&A에서 소개한 약물 조절 방법은 아이를 진료하는 처방팀과 결정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 반복되는 복통이 아이에게 남기는 것들

통증 그 자체보다, 아이의 일상과 마음에 미치는 영향이 더 클 수 있습니다

### 불안

"또 아프면 어쩌지" 걱정하며 아플 만한 상황을 피합니다. 불안은 다시 통증을 키웁니다.

### 우울감

하고 싶은 활동을 못 해 위축되고 기분이 가라앉습니다. 통증과 기분은 서로 영향을 줍니다.

### 학교 결석

결석·조퇴가 잦아지면 학습과 친구 관계에 영향을 주고, 결석 자체가 불안을 키웁니다.

### 삶의 질 저하

놀이·식사·여행처럼 또래가 누리는 일상 활동이 줄어듭니다.

### 수면 문제

잠들기 어렵거나 자다 깨면 피로가 쌓이고, 피로는 통증에 더 민감하게 만듭니다.

### 가족의 걱정

부모의 불안과 잦은 병원 방문·반복 검사가 아이에게도 전해져 온 가족이 지칩니다.

Tip · 여섯 가지는 서로 꼬리를 뭅니다 — 불안·수면·결석이 다시 통증을 키웁니다.

근거 · Rome IV 2016 · Br J Gen Pract 2026

# 식욕저하와 배 아픔이 약과 연결되나요?

김효원 교수 강의 · ADHD 약 복용 중인 아이의 변화입니다.

### 메칠페니데이트

식욕저하·불면·두통·복통이 나타날 수 있는 부작용으로 소개되었습니다.

### 식사량을 함께 봅니다

식욕저하가 두드러지면 용량이나 약의 종류를 조절하는 과정이 필요하다고 설명했습니다.



약 복용 중 아이의 식사량과 식욕 변화를 함께 살펴봅니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 약의 종류에 따라 반응이 다를 수 있습니다

복용 중인 약 이름을 확인해 주세요.

## 메칠페니데이트

콘서타·메디키넷·페니드

- 효과가 빠르게 나타나는 중추신경 자극제로 소개했습니다.
- 복용 당일부터 작용하며 제형에 따라 지속시간이 다릅니다.
- 식욕저하·불면·두통·복통을 함께 살핍니다.

vs

## 아토목세틴 등

비중추신경 자극제

- 효과가 나타나는 데 최소 2주 이상 걸릴 수 있습니다.
- 작용이 나타나면 24시간 효과가 지속된다고 설명했습니다.
- 아토목세틴은 메스꺼움이나 구토가 생길 수 있습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 왜 '먹는 것'과 '생활 리듬'이 중요할까요?

예민한 장은 음식·식사 시간·생활 리듬에 크게 반응합니다 — 약을 늘리기 전에 먼저 다듬을 부분

## 통증을 키우는 쪽

무엇을·언제·어떻게 먹는지가 통증의 **빈도와 세기**를 바꿉니다.

- 특정 음식이 장에서 가스·수분을 늘립니다
- 어떤 음식은 장을 직접 자극합니다
- 예민한 장은 이 신호를 **통증으로 크게** 느낍니다
- 오래 굶다 몰아 먹으면 더 예민하게 반응합니다

vs

## 가라앉히는 쪽

규칙적인 식사·충분한 수분·안정된 생활 리듬이 **과민 반응을 달랩니다**.

- 검사가 정상이면 약보다 **식사·생활 조절이 먼저**입니다
- 약물은 최소화합니다
- 부작용이 없는 안전한 첫걸음입니다
- 온 가족이 함께 실천할 수 있습니다

Tip · 순서는 안심 → 식사·생활 조절 → 필요할 때만 약입니다.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 도움이 되는 식사 습관 6가지

거창한 식이요법이 아니라, 오늘부터 집에서 바로 실천할 수 있는 기본기입니다



**규칙적인 식사**
아침을 거르지 않고 정해진 시간에 — 몰아 먹으면 장이 예민해집니다

**충분한 수분**
물을 자주 — 변이 부드러워져 변비형 복통에 특히 도움이 됩니다

**적절한 식이섬유**
채소·과일·통곡물을 조금씩 — 한꺼번에 늘리면 가스가 찹니다

**천천히·꼭꼭 씹기**
급히 먹으면 공기를 삼켜 더부룩합니다 — 식사 중 TV·휴대폰 끄기

**균형 잡힌 식단**
성장기라 무리한 제한은 금물 — 오래 빼기 전엔 의료진과 상의

**유산균·페퍼민트(선택)**
도움이 되는 아이도 있지만 개인차가 큽니다 — 시작 전 상의

그림 · 정해진 시간에, 물 한 잔과 함께, 화면은 끄고 천천히 먹습니다(설명용 그림).

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 배를 더 아프게 할 수 있는 음식 — 줄여 보세요

아이마다 방아쇠는 다르지만, 아래 음식들은 예민한 장을 자극하는 흔한 원인입니다

| 음식 | 왜 아플 수 있나 | 이렇게 바꿔 보세요 |
|---|---|---|
| **탄산음료 · 사이다** | 탄산 가스가 배를 부풀려 더부룩함과 통증을 부릅니다 | 물이나 보리차로 |
| **과일주스 · 단것** | 과당·소르비톨(무설탕 껌·젤리 포함)이 가스·설사를 일으킵니다 | 주스 대신 생과일을 적당히 |
| **카페인** | 콜라·초콜릿·에너지음료가 장을 자극하고 잠을 방해합니다 | 특히 저녁에는 피하기 |
| **기름지고 튀긴 음식** | 소화가 느려 식후 복통·더부룩함을 잘 일으킵니다 | 튀김·패스트푸드 줄이기 |
| **맵고 자극적인 음식** | 아이마다 다르지만 흔한 방아쇠입니다 | 반복되면 잠시 줄여 반응 보기 |
| **유제품 과다(해당 시)** | 유당불내증이면 우유·아이스크림 뒤 복통·설사가 생깁니다 | 의심되면 진료 때 확인 |

주의 · 저포드맵 같은 엄격한 제한식을 아이 스스로·오래 하면 영양과 성장에 해롭습니다. 필요하면 의료진·영양 상담과 함께 짧게.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 같은 성분도 제형에 따라 다릅니다

김효원 교수의 제형·작용시간 설명입니다.

| 약 이름 | 강의에서 소개한 작용시간 | 제형 특징 |
|---|---|---|
| **페니드** | 4시간 | 가루약으로 만들 수 있습니다. |
| **메디키넷** | 6시간 | 캡슐을 열어 복용할 수 있습니다. |
| **콘서타** | 12시간 | 열어서 먹는 제형이 아닙니다. |

어떤 제형을 쓸지는 약효와 부작용, 아이가 약을 먹는 방법을 함께 보고 정합니다.

# 우리 아이만의 방아쇠 찾기 — 음식·통증 일기

2~4주만 꾸준히 적으면, 반복되는 음식·상황 패턴이 눈에 보입니다

**1** 📖 **무엇을 적나**

먹은 음식과 시간 · 언제·얼마나 아팠는지 · 배변 상태 · 그날의 스트레스·수면을 짧게 적습니다.

**2** 📅 **얼마나**

**2~4주**만 꾸준히 적으면 반복되는 음식·상황 패턴이 보입니다.

**3** 🩺 **어떻게 쓰나**

진료 때 함께 해석해, 반복되는 방아쇠 음식만 **골라서** 줄입니다. 막연한 광범위 제한이 아닙니다.



핵심 · 기록으로 확인된 방아쇠만 줄이고, 나머지는 골고루 먹여 성장에 필요한 영양을 지켜 주세요.

근거 · 관리 방법 — 음식·증상 일기 2~4주 → 방아쇠 확인 → 표적 조절

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 치료 필요성은 주기적으로 다시 봅니다

아이의 생활 기능과 성장, 약효를 함께 평가합니다.

## 보통 1년마다

### 종합 재평가

교재에서는 보통 1년마다 약의 효과와 치료 필요성을 종합적으로 다시 평가한다고 설명했습니다.

### 효과가 분명하면

주의력·과잉행동·충동성과 생활 기능이 얼마나 좋아졌는지 함께 살핍니다.

### 호전되어 안정되면

약을 계속 쓰는 경우도 있지만, 상태가 호전되고 안정되면 감량이나 중단을 시도할 수 있다고 설명했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 하루의 리듬이 장을 편하게 합니다

잠·활동·배변 — 식사만큼 중요한 생활 습관입니다



**아침 · 충분한 잠**

장 리듬이 안정됩니다

**낮 · 등교 유지와 가벼운 운동**

매일의 활동이 통증 예민함을 낮춥니다

**밤 · 정해진 잠자리**

피로는 통증을 키웁니다

Tip · 배변 습관도 리듬입니다 — 아침 식후 화장실에 여유 있게 앉기. 변비는 소아 복통의 아주 흔한 원인입니다.

근거 · 관리 방법 — 규칙적 수면·가벼운 운동·배변 습관

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 우리 아이에게 어떻게 적용할까요?

경고 신호(11쪽)가 없다면, 검사·약물에 앞서 식사·생활부터 단계적으로 시도합니다

1

## 안심과 이해

의사가 위험한 원인을 배제해 '기능성'으로 확인하고, 위험한 병이 아님을 함께 이해합니다. 통증·음식 일기로 방아쇠를 살핍니다.

**위험한 병이 아님을 확인**

2

## 식사 다듬기

규칙적인 식사·충분한 수분·적정 식이섬유를 지키고, 확인된 방아쇠 음식(탄산·단것·카페인·기름진 음식)을 줄입니다.

**방아쇠 음식만 골라 줄이기**

3

## 생활 리듬

규칙적인 수면·가벼운 운동·등교 유지와 편안한 배변 습관이 기본입니다. 통증에 온 가족이 너무 크게 반응하지 않는 것도 중요합니다.

**잠·운동·등교·배변**

4

## 안 나아지면 진료실로

몇 주 실천해도 나아지지 않거나 경고 증상이 있으면 추가 평가·약물·전문 치료로 조정합니다.

**몇 주 뒤 다시 평가**

안내 · 우리 아이에게 맞는 식사 조절과 생활 계획은 원내에서 함께 구체적으로 정해 드립니다.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이런 신호가 있으면 식사 조절보다 검사가 먼저입니다

하나라도 있으면 기능성으로 단정하지 말고 반드시 추가 평가가 필요합니다

### 체중 감소 · 성장 지연

다이어트 없이 빠지는 체중, 키·몸무게 성장 곡선에서 벗어나는 경우는 위험한 원인을 찾는 **정밀 검사**가 필요합니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**

### 혈변 · 밤중 통증 · 반복 발열

대변에 피가 섞이거나, 잠을 깨우는 밤중 통증·밤중 설사, 반복되는 열은 기능성 복통에서는 **드문 경고 신호**입니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**

### 가족력 · 삼킴 곤란 · 계속되는 구토

염증성 장 질환·셀리악병 가족력, 삼키기 힘듦, 반복되는 구토는 다른 병을 시사하므로 **검사를 우선**합니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**

Tip · 이런 신호는 기능성 복통에서는 드뭅니다. 식사·생활 관리는 위험한 원인을 배제한 뒤 시작합니다.

근거 · 소아 복통 경고 증상

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 오늘 꼭 기억할 7가지

소아 기능성 복통·과민성 장은 이해와 식사·생활 관리로 충분히 좋아집니다

**01** 아이 앞에서 걱정을 드러내기보다 **"괜찮아질 거야"**라고 안심시켜 주세요

**02** 기능성 복통·과민성 장은 **뇌-장 축의 문제** — 꾀병도, 부모 잘못도 아닙니다

**03** **통증·음식 일기**로 스트레스·식사·수면 등 방아쇠를 함께 찾아봅니다

**04** **규칙적인 식사·충분한 수분·등교 유지**가 회복의 기본입니다

**05** 탄산·과한 주스나 단것·카페인·기름진 음식을 **줄여 보세요**

**06** 성장기이므로 **무리한 제한식은 금물** — 음식을 오래 빼기 전 의료진과 상의하세요

**07** 체중 감소·혈변·성장 지연 등 **경고 증상은 바로 진료**·검사로 확인합니다

**안심하고, 살펴보고,**
**식사·생활을 단계적으로**

Tip · 이 장을 사진으로 찍어 냉장고에 붙여 두세요.

근거 · Rome IV 2016 · NASPGHAN

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

# 키·체중과 식욕 변화를 정기적으로 봅니다

초기 식욕저하와 성장 경과를 함께 살펴봅니다.

### 키와 체중 기록

약을 쓰는 동안 키와 체중을 정기적으로 기록합니다.

### 초기 변화

처음에는 식욕이 줄고 일시적으로 성장이 늦어질 수 있다고 설명했습니다.

### 성장 곡선의 경과

연자는 초기 이후 원래 성장 곡선을 따라가는 모습을 설명했습니다. 교재는 약 3년 뒤 회복세를 소개했습니다.

### 약 조절

식욕저하가 너무 두드러지거나 성장 지연이 보이면 용량 조절이나 약물 변경을 고려합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 복통 약을 더 처방받을 때도 알려 주세요

김효원 교수 Q&A · ADHD 치료 중 약물 병용에 관한 답변입니다.

### 현재 복용 약

ADHD 약 이름과 함께 다른 병원에서 받은 약도 알려 주세요. 연자는 소아에서 교감신경을 항진시키는 약을 주의한다고 답했습니다.

### 에나폰·웰부트린

내장과민성 등에 에나폰을 함께 써도 되는지 묻는 질문에, 연자는 웰부트린과 삼환계 항우울제인 에나폰은 ADHD 약과 잘 함께 쓰지 않는다고 설명했습니다.

### 다른 항우울제 병용

SSRI 계열은 ADHD 약과 대부분 안전하게 함께 쓸 수 있다는 답변도 제시했습니다. 현재 약의 조합을 확인해 정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 대부분 좋아집니다 — 식사와 생활 관리로 더 편안하게

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

## 광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 대부분 좋아집니다

안심과 이해에서 시작해, 아이에게 맞는 식사 조절과 생활 계획을 함께 찾아가겠습니다. 궁금한 점은 언제든 문의해 주세요.

## 참고한 자료

Rome IV 2016(뇌-장 상호작용 장애 분류) · NASPGHAN 소아 기능성 복통 관리 · Br J Gen Pract 2026

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요