
무증상 췌장효소 상승: 원인 평가와 불필요한 처방 줄이기

수치 상승 자체와 췌장염·외분비기능부전을 구분합니다. 아래 내용은 연자 Q&A 의견입니다.

원인부터 평가하는 3단계



경도의 효소 상승 자체가 췌장염을 의미하지는 않습니다 — 연자 Q&A 의견.

약제는 효소 수치가 아닌 임상 상태로

약제	연자 Q&A 의견
Camostat	단순 lipase 상승만으로 처방하지 않음. 무증상·효소만 높은 경우 일상적 사용 불필요. 통증이 있는 일부 환자에서 제한적으로 고려.
췌장효소 보충제	췌장염 병력 자체가 아니라 지방변·체중감소 등 외분비기능부전이 있을 때 사용. 변기에 붙는 변만으로 만성췌장염 진단 불가.

복통이 발생하면 초기 정상 검사도 재해석

검사	연자 Q&A에 제시된 시간 경과
Lipase	증상 발생 4–8시간부터 상승, 약 24시간 최고, 보통 8–14일 상승 가능.
CRP	더 늦게 상승하며 대개 36–72시간에 최고치.

전형적인 통증이 지속되면

초기 정상값만으로 췌장염을 배제하지 않습니다. 몇 시간 후 lipase 재검 또는 영상검사를 고려합니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 만성췌장염: 진단의 핵심과 치료의 실제(오동욱)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-asymptomatic-pancreatic-enzymes/