
ADHD 치료제 복용자 심혈관·성장·이상반응

약 이름·제형·작용시간과 기존 질환을 함께 확인



자극제 · methylphenidate

구분	진료 중 확인할 내용
제품·작용시간	페니드 4시간 · 메디키넷 6시간 · 콘서타 12시간. 페니드는 가루약 가능, 메디키넷은 캡슐 개봉 가능, 콘서타는 개봉 불가.
효과·흔한 이상반응	반응률은 슬라이드 70~85%, 음성 70~80%. 복용 당일부터 작용. 식욕저하·불면·두통·복통, 필요시 용량 조절·약물 변경.

시작 전 · 심질환 병력과 돌연사 가족력

Methylphenidate는 혈압·맥박을 경미하게 상승시킵니다(강의 음성: 각각 3~4 정도). 기존 부정맥·구조적 심기형·심질환·돌연사 가족력을 확인하고, 기왕력이 있으면 신중히 평가합니다. 성인에서는 기존 고혈압·성인병도 주의합니다.

복용 중 기록할 항목

구분	진료 중 확인할 내용
혈압·맥박	기존 심혈관질환과 함께 확인.
틱·경련	틱 악화·경련 역치 저하 가능. 기존 틱·경련이 있으면 주의하고 비자극제 고려.
키·체중·식욕	퍼센타일표에 정기 기록. 초기 식욕저하로 일시적 성장지연 가능, 지연 시 약물 조절 고려. 슬라이드는 약 3년차 회복세·최종 성인 신장은 대체로 정상 범위라고 설명.

ADHD 치료제와 내과 병용약 점검

김효원 연자 Q&A · 교감신경 항진 약물과 항우울제를 구분

교감신경을 항진시키는 약 · 연자 Q&A

소아 ADHD 약 복용 중 내과약 질문에, 소아에서는 교감신경을 항진시키는 약들을 주의하도록 답했습니다.

항우울제 병용 질문 · 연자 Q&A

구분	진료 중 확인할 내용
SSRI	에나폰을 SSRI 계열로 대체하는 경우가 많으며 ADHD 약과 같이 써도 대부분 안전하다고 답변.
Wellbutrin·에나폰 (TCA)	교감신경계에 작용하여 ADHD 약과 잘 같이 쓰지 않는다고 답변. 에나폰은 상호작용·부작용이 많다고 설명.

비자극제 · 본강

구분	진료 중 확인할 내용
Atomoxetine·clonidine	스트라테라·켑베이. 틱·불안 동반 또는 자극제 부작용 시 선택. 효과까지 최소 2주 이상, 작용 후 24시간 지속.
Atomoxetine 대사	CYP2D6 대사. Poor metabolizer에서는 구토 등이 가능. 오심 때문에 연자는 저녁 처방을 하지만 아침·저녁 모두 가능하다고 설명.

식욕저하가 심할 때 · 연자 Q&A

효과는 있으나 식욕부진이 있으면 트레스탄 병용으로 좋아지는 아이가 있고, 계속되면 약물 휴일 또는 주말에 지속시간이 짧은 약을 처방하기도 한다고 답했습니다.

정기 재평가와 치료의 맥락 · 본강

보통 1년마다 효과·필요성을 종합 재평가합니다. 효과가 뚜렷하면 지속하고 호전·안정 시 감량·중단 시도를 설명했습니다. 약물과 부모교육·정신사회적 치료·학습 지원을 함께 시행합니다. ADHD는 단일 검사·뇌영상으로 진단하지 않으며 여러 정보와 기능 손상을 종합합니다. 의심되면 소아청소년정신과로 의뢰합니다. 동반 문제를 함께 보고 약물·부모교육·정신사회적 치료를 병행합니다.