
의료진 진료 카드 · ASL-089

사람 물림 · Tdap과 TIG

연자 Q&A의 실제 물림 증례: 상처 분류와 기본접종 횟수로 두 제제의 필요성을 각각 판단한다.

사람에게 물린 상처 + 기본접종력 불명확·3회 미만



연자 Q&A · 물림 증례 판단

질문 상황	발달장애 학생에게 팔을 물린 교사. 항생제와 Tdap은 투여했고, 접종력이 불확실할 때 hypertet도 필요한지 질문.
답변의 조건	사람 물림은 오염상처. 기본접종력이 불명확하거나 3회 미만이면 Tdap과 TIG(hypertet)를 함께 투여하는 것이 적절하다고 답변.
동시 투여	오염상처에서 TIG와 파상풍백신이 모두 필요하면 같은 날 서로 다른 부위에 투여. TIG 투여가 백신효과를 방해하지 않는다고 설명.

연자 Q&A · 손주 접촉 상담과 구분

백일해 접촉 상담	10년 이내 Tdap 접종력이 있으면 손주·조카 접촉을 위한 반복 Tdap은 필요 없다고 답변. 이 답변은 영아 접촉자 상담 맥락.
Arthus 반응	파상풍 항체가 있는 상태에서 재접종하면 항원-항체 반응으로 접종부위 주변 심한 부종(Arthus 반응)이 생길 수 있어 필요한 만큼 접종한다고 설명.
임신	매 임신 별도 접종이 필요하며, 이 경우에도 이전 Arthus 반응력이 있으면 접종금기에 해당한다는 연자 Q&A 답변.

진료 중 확인할 정보: 물린 상처인지, 기본접종 기록이 분명한지, 3회를 완료했는지, Tdap과 TIG가 각각 필요한 조건에 해당하는지. 영아 접촉 상담의 '10년'을 오염상처 판단에 대입하지 않는다.