
의료진 진료 카드 · ASL-091

내시경 기생충 · 관찰에서 치료로

구충·편충은 위치와 모양, 조충은 편절을 본다. 불필요한 제거·생검을 피하라는 연자의 안전 설명.

모양·발견 위치에 따른 강의의 치료 분기



본강의 · 위치와 관찰 단서

구충	십이지장 점막에 약 1cm 충체가 박혀 보임. 앞쪽 hook으로 점막에 부착. 맨발의 토양 노출 후 유충이 피부로 침입하는 경로.
편충	3~5cm. 가는 앞부분은 맹장 점막에 박혀 있고 두꺼운 뒷부분이 장내에 노출. 대장내시경 cecum에서 관찰 가능.
회충	둥글고 긴 충체; 대변으로 가져오는 선충은 대부분 회충. 수컷 13~17cm, 암컷 20~35cm. 환경의 성숙 충란을 섭취해 감염.

본강의 · 선충 치료와 제거

구충·회충	Albendazole 400mg 경구 1회.
편충	Albendazole 400mg 경구, 3일. 회충·구충보다 약효가 떨어져 3일분을 처방한다는 설명.
제거에 대한 연자 설명	구충·편충은 일부만 제거될 수 있고 박힌 부분을 전부 빼기 어렵다. 약효가 높고 충체 일부만으로 동정도 어려워 내시경 제거에 애쓸 필요가 없다고 설명.

납작하고 긴 충체를 대장내시경에서 발견한 경우: 유구·무구조충을 모양만으로 구분하기 어려우며, 유구조충 충란 섭취에 따른 낭미충증의 이론적 위험 때문에 굳이 생검하지 말라는 연자의 안전 권고다.

의료진 진료 카드 · ASL-091

조충 · 편절과 치료 후 의뢰

성숙 편절의 모양은 단서이며, 약물 치료 후 배출 충체를 가지고 감염내과로 연결한다.

본강의 · 조충 관찰과 치료

광절·동해열두조충	성숙 편절은 가로가 더 긴 모양. 광절열두조충 D. latus, 동해열두조충 D. nihonkaiense. 연어·송어 등 큰 생선의 생식과 관련. Praziquantel 10 mg/kg 경구 1회.
Taenia spp.	성숙 편절은 세로가 더 길다. 유구조충 T. solium·무구조충 T. saginata. 미성숙 편절은 구분이 안 된다. Praziquantel 10 mg/kg 경구 1회.
감염 경로	유구조충은 덜 익힌 감염 돼지고기, 무구조충은 육회 등 감염 소고기. 연자는 현재 국내에는 무구조충이 주로 문제라고 설명. 성충을 먹는 것과 충란·감염형 섭취를 구분.
치료 후 의뢰	Praziquantel 복용 후 대변에 나온 충체를 가지고 연자 외래(감염내과)로 의뢰하면 추가 조치 여부를 평가한다고 설명했다.

유구조충의 위험과 내시경 조작

형태의 한계	두절의 hooklet·흡반과 성숙 편절 모양 등으로 세부 분류하지만, 진료실에서 본 Taenia 모양만으로 유구·무구를 확정하기 어렵다는 설명.
생검 회피의 이유	유구조충 충란을 잘못 섭취하면 인체 유구낭미충증, 특히 신경계 침범의 치명적 위험이 있을 수 있어 불필요한 생검으로 환자·의료진 위험을 높이지 말라고 강조.
내시경 발견 요충	요충도 맹장 주변에 살 수 있다. 암컷 8~13mm·수컷 2~5mm, 암컷이 항문으로 이동해 충란 배출. 편충의 3~5cm 형태와 구분.

요충에 대한 본강의: albendazole 400mg 1회 후 2~3주 간격 2~3회 가족 반복치료. 충란은 환경 배출 약 6시간 후 감염형이 되고 자가·가족 감염이 가능하며, 유충에는 약효가 떨어져 장기 연속치료보다 반복치료가 중요하다고 설명했다.