
체중·숨참·붓기를 함께 기록하세요

심부전은 심장에 피가 차고 나가는 기능이나 구조의 문제로 숨참과 부종 등이 생기는 상태입니다.

숨참과 붓기는 몸에 물이 차는 변화와 연결됩니다



체중 변화와 숨참·붓기를 나란히 기록합니다

폐에 물이 차면 숨이 차고, 전신에 물이 차면 다리가 붓는 변화가 나타날 수 있습니다.

다음 진료에 가져갈 기록

1. 체중: 날짜와 체중을 적습니다. 퇴원할 때 안내받은 목표 체중 범위를 함께 적어 둡니다.
2. 숨참: 활동할 때의 숨참, 누웠을 때 숨이 더 차는지 적습니다.
3. 붓기: 다리 붓기와 그 변화를 적습니다. 체중 변화와 나란히 보면 진료에 도움이 됩니다.

체중 기록지

날짜 · 체중	_____
숨참 · 누울 때 변화	_____
다리 붓기 · 복용한 약	_____
안내받은 목표 체중	_____ ~ _____ kg

약 조절 계획도 함께 가져오세요

퇴원 뒤 이뇨제 용량은 체중 변화, 울혈과 증상을 보고 정합니다. 연자 Q&A에서는 퇴원할 때 개인별 목표 체중과 약 조절 범위를 교육한다고 설명했습니다. 진료실에서 받은 내 계획과 기록을 함께 준비하세요.

기록을 보고 치료를 맞춥니다

체중만 줄이는 것이 치료의 전부는 아닙니다. 증상과 신장 기능, 전해질 검사도 함께 살핍니다.

물의 변화와 약의 효과를 함께 봅니다

울혈을 줄이는 이뇨제

몸에 물이 차서 숨이 찬 경우에는 이뇨제가 증상 개선에 도움이 됩니다. 울혈이 나아져도 숨참이 그대로라면 다른 원인도 살핍니다.

체중이 너무 줄고 힘이 없다면

약을 쓰는 동안 체중이 많이 줄고 혈압이 떨어지며 힘이 없는 변화가 생기면, 함께 쓰는 이뇨제를 포함해 치료를 다시 조정하는 자료가 됩니다.

퇴원 뒤 추적 진료에서 보는 것

시기	연자 Q&A에서는 첫 외래를 퇴원 후 2주 안팎으로 잡아 약이 과하거나 부족하지 않은지 살핀다고 설명했습니다. 개인 예약일에 맞춰 방문합니다.
기록	체중 변화, 숨참과 붓기, 실제 복용한 이뇨제 양을 가져옵니다.
혈액검사	전해질, 요소질소(BUN), 크레아티닌(Cr), NT-proBNP 등을 함께 보고 용량을 정합니다.

내 진료 계획을 적어 두세요

1. 다음 진료일: _____
2. 목표 체중과 약 조절 안내: _____
3. 현재 복용약과 달라진 증상: _____

같은 숨참이라도 원인은 다를 수 있습니다

심장 기능이나 구조의 이상이 있는지, 그 이상이 폐와 전신에 물이 차는 현상과 증상을 설명하는지 함께 보아야 합니다. 체중·숨참·붓기를 같이 기록하는 이유입니다.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/cardio/asl28-heart-failure-home-record/