간 포충낭종 의심 시 — 노출력·영상 분류·의뢰

오래전 해외 노출력과 낭종의 숫자·격벽·위치·양상을 모아 전문 평가로 연결한다.

핵심 판단 한눈에

오래전 해외 노출
근무·거주 · ≥10년 전도

→

낭종 특성
숫자·격벽·위치·양상

→

전문 평가
관찰·수술·경피 중재

치료는 낭종의 숫자·격벽·위치·양상에 따라 경과관찰, 수술, 경피적 중재 중에서 결정한다.

연자 Q&A 119쪽 · 처음 묻고 모을 자료

확인 항목	연자 답변
노출력	해외 근무·거주 여부. E. granulosus 간 병변은 일반적으로 10년 이상 긴 잠복기를 가져 매우 오래전 노출도 질문
영상 정보	CT/US에서 낭종 숫자, 내부 septation, 위치와 양상, 이전 영상과 변화
치료 선택	경과관찰·수술·percutaneous injection and aspiration 중 결정. 항기생충제는 위치·양상에 따라 사용 여부 결정
진단·추적 상황	노출이 명확하지 않고 영상만 의심되는 경우, 진단 목적 흡인을 부담스러워하는 상황을 설명

파열·아나필락시스 설명

복부에 큰 충격을 피하도록 안내

연자는 큰 충격으로 낭종 파열(cyst rupture)과 아나필락시스(anaphylaxis)가 생길 가능성을 설명했다. 의심 영상과 노출력을 정리해 전문기관의 치료·중재 판단으로 연결한다.

연자 Q&A의 추적 의견

관찰을 선택하는 상황

노출이 명확하지 않고 진단 목적 흡인이 부담스러운 경우에는 수개월 간격 CT 또는 US로 변화를 보는 것이 일반적이라고 답변했다. 이 답변의 조건과 함께 추적 계획을 전달한다.

의뢰 체크

- [ ] 오래전 해외 체류 국가·기간, 원영상·판독·이전 영상, 낭종 특성을 함께 보낸다.
- [ ] 파열 위험 설명과 전문기관에서의 중재·약제 검토 내용을 기록한다.