콩팥병 단백질 식사, 밥의 몫도 합쳐 계산합니다

단백뇨를 동반한 당뇨병 또는 사구체여과율(eGFR) <60 mL/min/1.73m²인 경우에 소개된 식사 예시입니다.

60kg 성인의 하루 48g 계산

60kg × 0.8g = 48g / 일

밥 18g	반찬 약 30g



밥 1공기 6g × 3

반찬 1단위 8g → 약 4단위

4단위는 32g: 강의의 근사 계산

60kg × 0.8g/kg/일 = 단백질 48g/일. 밥 세 공기의 18g을 빼면 반찬에서 약 30g을 맞추는 예시입니다.

강의에서 제시한 계산의 단위

계산 항목	60kg 성인 만성콩팥병 예시
하루 단백질	**0.8g/kg/일 → 48g/일**
하루 열량	**30kcal/kg → 1,800kcal**
밥 한 공기	**210g · 300kcal · 단백질 6g**
어육류 1단위	**단백질 8g · 75kcal**

반찬 예시와 나의 목표를 구분하세요

밥 3공기 + 반찬 약 4단위의 예시

반찬은 약 **30g**이 필요하므로 1단위 8g인 반찬 약 **4단위(32g)**를 고르는 설명입니다. 교재 예: 아침 **어묵 50g**, 점심 **작은 동태 1토막**, 저녁 **소고기 80g(40g×2)**. 사진의 기준 접시는 지름 **16.5cm**입니다. 나의 몸무게·영양 상태에 맞는 목표를 진료에서 적습니다.

장재원 연자 Q&A: 남은 사구체가 많은 일을 하는 상태에서 필요 이상의 단백질은 부담을 더할 수 있어, 몸을 유지할 정도의 반찬을 설명했습니다.

광교바른내과 의원
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

단백질만큼, 인 섭취와 복용 시점도 봅니다

인은 뼈·치아를 이루는 성분입니다. 콩팥에서 배설이 줄면 혈액에 쌓일 수 있습니다.

인을 관리하는 이유

혈중 인의 정상 범위: 2.5~4.5 mg/dL

인이 많이 쌓이면 뼈에서 칼슘이 빠져 뼈가 약해질 수 있고, 강의에서는 관상동맥 문제도 설명했습니다. 검사 수치를 보면서 인이 많은 음식의 양을 조절합니다.

같은 식사에서도 선택을 바꿉니다

살필 음식·방법	강의의 식사 설명
지나친 어육류 단백질	필요 이상 많이 먹지 않습니다. 몸을 유지할 단백질은 식사에 포함합니다.
우유·유제품 · 견과류 · 잡곡	인이 많은 식품으로 소개되었습니다. 인 수치와 식사 목표에 맞춰 제한합니다.
가공식품 · 콜라 · 감자칩	보존제·식품첨가물 형태의 인이 있어 가공식품 섭취를 삼갑니다.
단백질이 필요하고 인이 높을 때	연자는 노른자 대신 **달걀흰자 2개**를 드는 예를 설명했습니다.
조리법	삶거나 찌는 조리법으로 인 섭취를 줄이는 방법을 설명했습니다.

인결합제를 처방받았다면

식사와 함께, 음식 속 인을 붙잡는 약

인결합제는 음식 속 인이 몸에 흡수되지 않고 대변으로 나가도록 돕습니다. 강의에서 설명한 복용 시점은 **식사 중 또는 식사 직후**입니다. 나의 약 이름과 식사별 복용법을 처방에 맞춰 적습니다.

나의 식사 계획

1. 기준 체중: _____kg · 하루 단백질: _____g
2. 밥·반찬을 합친 하루 식사 계획: _____

광교바른내과 의원

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560

평일(월–금) 08:30 – 18:30 (점심 13:00 – 14:00)
토요일 08:30 – 13:30 · 일요일·공휴일 휴진

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

본 자료는 일반 안내입니다. 약의 시작·용량·중단은 위험도와 검사 결과를 보고 진료실에서 정하며, 약은 임의로 끊지 마시고 상의해 주세요.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/renal/ckd-protein-phosphorus-asan28/