산디문 복용 중, 고지혈증약이 바뀐 이유


산디문(사이클로스포린)은 꼭 필요한 약이지만, 일부 고지혈증약의 혈중농도를 크게 올릴 수 있습니다. 그래서 **남은 약을 임의로 다시 먹지 말고**, 처방된 약과 검사 일정대로 안전하게 조절하는 것이 중요합니다.

핵심만 먼저 — 약별 정리

현재 방향: 상호작용이 낮은 스타틴 선택 + 병용약 모니터링

고지혈증약	산디문과 함께 쓸 때	우리 병원 방향
로수바스타틴	혈중 노출 **약 7배 ↑** (산디문 병용 시 보고)	병용 제한이 있을 수 있어 **임의로 다시 먹지 않습니다**
심바·로바·피타바스타틴	산디문과 **병용 제한**이 있을 수 있음	처방전 그대로만 복용합니다
프라바·플루바스타틴	상호작용이 상대적으로 낮은 스타틴	**상대적으로 안전한 선택지**로 우선 검토합니다
에제티미브	노출 **약 3.4배 ↑** — 신장기능 저하 시 더 클 수 있음	금기약은 아니며, 필요 시 **산디문 혈중농도·신장기능**을 확인합니다

왜 조심해야 하나요?



간 입구 통로가 막히면 약이 혈액에 쌓입니다

1. **산디문이 통로를 막음** — 약을 간으로 들여보내는 통로(수송체)와 일부 대사 경로가 억제됩니다.
2. **스타틴 농도 상승** — 일부 스타틴은 혈중농도가 크게 올라 근육 부작용 위험이 커집니다.
3. **약을 골라서 사용** — 프라바스타틴·플루바스타틴 등 상대적으로 안전한 선택지를 우선 검토합니다.

오늘부터 지킬 것

남은 고지혈증약을 임의로 재복용하지 마세요
특히 **로수바스타틴·심바스타틴·로바스타틴·피타바스타틴** 계열은 산디문과 병용 제한이 있을 수 있습니다. 처방전 그대로만 복용하세요.

새 약·항생제·건강기능식품은 먼저 알려주세요
산디문은 상호작용이 많은 약입니다. 다른 병원 처방, 약국 일반약, 보충제를 시작하기 전 **산디문 복용 중**이라고 말해 주세요.

에제티미브는 사용 가능하지만 검사와 함께 갑니다
에제티미브는 금기약은 아니지만 산디문 농도와 에제티미브 노출이 함께 오를 수 있어, 필요 시 **산디문 혈중농도·신장기능**을 확인합니다.

검사 일정은 약효 확인과 안전 확인을 같이 봅니다
LDL 콜레스테롤 반응, 간수치, 신장기능, 근육 증상 여부를 함께 봅니다. 증상이 있으면 CK(근육 효소) 검사를 추가할 수 있습니다.

이런 증상은 바로 병원에 연락하세요

증상	이런 모습	증상	이런 모습
새로운 근육통	허벅지·어깨가 이유 없이 아프거나 눌러도 아픔	**힘 빠짐**	계단 오르기·의자에서 일어서기가 갑자기 힘듦
진한 갈색 소변	콜라색 소변, 소변량 감소, 붓기 동반	**열·심한 몸살감**	근육 증상과 함께 열, 극심한 피로가 있으면 즉시 상담

근육통·갈색뇨는 횡문근융해(근육이 심하게 손상되는 상태)를 의심하는 신호입니다. **진한 갈색(콜라색) 소변과 함께 소변량이 줄거나 근육통이 심하면 기다리지 말고 응급실로 가세요.**

다음 진료 전 체크리스트

1. **복용 중인 약 사진**을 모두 찍어 오세요. 타 병원 처방과 보충제도 포함합니다.
2. **근육통·소변색·붓기**가 있었는지 날짜와 함께 적어 오세요.
3. 검사 전에는 산디문 복용 시간과 채혈 시간을 **의료진 안내대로** 맞춥니다.
4. 목표 LDL에 못 미치면 증량보다 **PCSK9 억제제(주사형 콜레스테롤 약) 등 상호작용 적은 옵션**을 검토할 수 있습니다.

핵심은 **산디문을 안전하게 유지하면서 LDL을 낮추는 것**입니다. 약을 스스로 끊거나 예전 약으로 되돌리면 산디문 농도·근육 부작용·신장 기능에 문제가 생길 수 있습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

스타틴 부작용 일반 설명(진료실 슬라이드): **edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/statin-side-effects/**

근거 — FDA CRESTOR/ZETIA prescribing information(2023) · AHA Scientific Statement on statin drug interactions(2016) · UK EMC Rosuvastatin SmPC · 약학정보원 cyclosporine/ezetimibe 상호작용

본 안내문은 일반 교육자료이며, 실제 약 선택·용량·검사 간격은 환자별 신장기능·산디문 농도·심혈관 위험도에 따라 달라집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/cyclosporine-statin-ezetimibe-safety/