
에페리손 복용, 졸림과 비틀거림에 주의하세요

조재환 연자의 Q&A를 바탕으로 정리했습니다. 에페리손(eperisone) 같은 근이완제의 사용 상황과 복용 중 주의점을 설명합니다.

복용 뒤 졸림·무력감·비틀거림이 생길 수 있습니다



어떤 경우에 사용하는 약인가요

연자는 급성 염좌(acute strain)로 생긴 급성 허리 통증에서 소염제와 함께 사용하면 통증 경감에 도움이 될 수 있다고 답했습니다. 모든 허리 통증에 같은 목적으로 쓰는 약은 아닙니다.

처방 전에 알려야 할 내용

살필 내용	내용과 행동
약 과민증·중증근무력증	연자 Q&A에서는 이 약에 과민증이 있거나 중증근무력증이 있는 환자를 금기로 설명했습니다. 해당 병력이 있으면 복용 전에 처방 의료진에게 알려주세요.
간장애	간장애가 있는 경우 신중하게 투여해야 한다고 답했습니다. 간질환 병력을 알려주세요.

증상이 생기면 이렇게 살핍니다

살필 내용	내용과 행동
졸림·무력감·비틀거림	운전에 영향을 줄 수 있어 미리 설명해야 하는 이상반응입니다. 이런 증상이 생기면 운전을 피하고 처방 의료진과 상의하세요.
고령 환자	낙상 위험이 커질 수 있어 연자는 감량하거나 단기간 쓰는 방법을 제안했습니다. 용량·기간을 진료에서 정하세요.
심한 알레르기 반응	드물게 쇼크·아나필락시스가 보고된다고 답했습니다. 이런 중한 반응이 생기면 즉시 진료받으세요.

광교바른내과 · 031-893-4560
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 허리 통증의 진단과 치료(조재환)

개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.

집에서 다시 보기