비만 주사(위고비·마운자로) 시작·증량 안내


일주일에 한 번 정한 요일에 맞고(식사와 상관없이), 최소 4주씩 한 단계 올립니다.

용량은 이렇게 올립니다 — 4주마다 한 단계

기간	위고비 (주 1회)	마운자로 (주 1회)
1~4주	**0.25 mg** 시작	**2.5 mg** 시작 — 적응용(유지 용량 아님)
5~8주	**0.5 mg**	**5 mg** — 계속 맞을 수 있는 유지 용량
9~12주	**1.0 mg**	더 올릴지는 **진료에서 정해요.** 올린다면 **최소 4주** 간격으로 **2.5 mg씩**: **7.5 → 10 → 12.5 → 15 mg**(최대)
13~16주	**1.7 mg**	
17주부터	**2.4 mg** 유지 용량(최대)	
속이 많이 불편하면 **올리지 않고 그 단계에 머무르거나 한 단계 낮춥니다** — 진료에서 함께 정해요.		

원장님 한마디 — 위고비는 한 달에 한 단계씩만 올릴 수 있어서 첫 석 달쯤은 별 느낌이 없을 수 있어요. **초반에 약에 적응하면서 운동을 시작하세요.**

어디에 맞나요 — 배꼽에서 5cm 띄워 좌우 번갈아



1. **배꼽 둘레 5cm 안(그림의 원)은 피하세요.** 혈관이 많아 아플 수 있어요.
2. **배꼽 높이 양옆(그림의 두 점)이 가장 덜 아파요.** 이번 주 오른쪽, 다음 주 왼쪽처럼 같은 자리를 피해 번갈아요.
3. **멍·붉어짐·딱딱한 곳·흉터**는 피하세요.
4. **허벅지 앞쪽**도 됩니다(마운자로는 위팔 뒤쪽을 다른 사람이 놓아 줄 때만). 처음엔 **제품 사용설명서**를 꼭 읽어 주세요.

주사를 잊었거나 요일을 바꿀 때 · 피임과 임신

이럴 때는	위고비	마운자로
주사를 잊은 날부터	**5일 안**이면 바로 맞기	**4일 안**이면 바로 맞기
그보다 늦었으면	건너뛰고 **원래 요일에 1회분만**(몰아 맞지 않기). **2번 이상** 빠졌으면 먼저 연락.	
요일 바꿀 때 간격	**3일(72시간) 넘게**	**3일(72시간) 이상**
먹는 피임약을 쓰면	그대로 써도 됩니다	처음 4주와 올린 뒤 4주는 **콘돔도 함께**
임신을 계획하면	**2개월 전** 중단 — 미리 상의	**1개월 전** 중단 — 미리 상의
임신이 되면 주사를 멈추고 바로 알려 주세요(임신 중에는 맞지 않습니다).		

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

뒷면에 부작용·식사 요령·바로 연락할 증상이 이어집니다.

흔한 부작용 — 기름진 걸 먹은 날 더 심해져요

흔히 느끼는 것	이렇게 하세요
더부룩함 · 일찍 배부름	**한 번에 조금씩, 천천히** 드세요.
울렁거림 · 메스꺼움	**기름지거나 매운 음식**은 줄이기
설사 (사람에 따라 변비)	**물을 자주** 드세요. 평소 괜찮던 음식에도 날 수 있어요.
대개 **용량을 올린 직후에 심하고 시간이 지나며 줄어듭니다.** 점점 심해지면 알려 주세요.	

원장님 한마디 — 이런 반응을 이용해서 덜 먹을 수 있게 만드는 거라 **부작용이기도 한데 효과이기도 해요.** 심해지지 않나만 살펴보세요.

용량을 올린 첫 주 — 담백하게, 그리고 산책 15분부터



담백하게 · 살짝 아쉬울 때 수저 내려놓기



산책 15분부터

1. **올린 첫 주는 2·3주차보다 특히 담백하게.** 조금 덜 담고 **살짝 아쉬울 때 수저를 내려놓아** 보세요. 생각보다 배가 덜 고프실 거예요.
2. 끼니를 건너뛰거나 과자·음료로 때우지 말고, **단백질·채소가 든 식사**로 드세요.
3. **운동은 산책 15분부터.** 무리하면 무릎이 아플 수 있어요. 식사량이 본격적으로 줄면 그때는 운동을 시작하기 어려우니 **적응하는 초반에 습관을 만드세요.**

⚠ 이럴 때는 다음 주사를 맞지 말고 바로 연락하세요

1. **멈추지 않는 심한 복통** — 등으로 뻗치거나 구토가 함께 올 수 있습니다.
2. **구토가 계속됨** — 물도 못 넘기거나 소변이 줄고 어지러우면 더 서두르세요.
3. **윗배 통증과 열**, 또는 **눈·피부가 노랗게** 변함
4. **얼굴·입술·목이 붓거나 숨이 참** — 바로 119

진료 시간이 아니거나 통증이 심하면 **응급실**로 가세요.

내시경·수술(수면·마취)을 예약할 때는 **마지막으로 주사 맞은 날**을 꼭 알려 주세요.

구토·설사로 먹거나 마시기 어렵다면 증량하지 말고 연락합니다. 갑작스럽거나 통증 없는 시력 저하는 즉시 안과 평가를 받습니다. 병용 인슐린·설포닐우레아와 저혈당도 확인합니다. (아산28 정창희·민세희)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 위고비·마운자로 식약처 허가사항(의약품안전나라, 2026-10 조회) · 위고비 미국 사용설명서(주사 부위 5cm) · Postgrad Med 2022 위장관 부작용 관리 권고 · 본원 진료 설명

교육·참고용 안내문입니다. 용량과 올리는 속도는 담당 의사와 상의해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/glp1-start-titration-guide/