집에서 재는 혈압, 이렇게 재세요

병원에는 가끔 오지만 사는 곳은 집입니다. 그래서 집에서 잰 **평소 혈압**이 약을 정하는 중요한 기준입니다.

① 언제 재나요 — 하루 두 번

아침	저녁
일어나서 **1시간 안**, 소변을 본 뒤, **아침 식사와 혈압약 먹기 전**	**잠자리에 들기 전 1시간 안** — 아침과 같은 방법으로 잽니다

② 어떻게 재나요 — 앉아서 5분 쉬고 2번



1. 재기 **30분 전**부터 담배·술·커피·운동·목욕은 피합니다
2. **등받이 의자**에 앉아 다리를 꼬지 않고 발바닥을 바닥에 붙입니다
3. 팔은 탁자 위에. 팔에 감는 띠(**커프**)는 맨 팔(얇은 옷은 괜찮음)에 **심장 높이**로, 아래 끝이 팔꿈치 접히는 곳보다 2~3cm 위
4. **5분 쉬고, 1분 간격으로 2번** 재고 두 번 다 적습니다. 재는 동안 말하지 않습니다
5. 위팔에 감는 **자동혈압계**로(손목·손가락형은 피하기)

팔둘레에 맞는 검증된 위팔 혈압계를 사용하고 측정 중 휴대폰을 보지 않습니다. 맥박과 불규칙 표시도 확인해 알려 주세요.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

③ 며칠 재나요 · ④ 어떤 숫자가 기준인가요

기록표대로 1~2분 간격으로 2회 측정해 모두 적습니다.

아산 28회 연수강좌 — 2026 고혈압 치료 update: 진료실에서 바로 적용하는 최신 전략(김대희)

7일 재세요 — 바쁘면 **적어도 5일**. 며칠을 재든 첫날은 연습으로 빼고 **2일째부터 평균**을 봅니다.

고혈압 기준	진료실에서 잴 때	집에서 잴 때
이 숫자 이상 위·아래 중 하나라도	**140/90** mmHg	**135/85** mmHg
이럴 땐	진료실에서만 높으면 **집 혈압으로** 판단	진료실이 정상이어도 집에서 넘으면 **알려 주세요**

근거 · 대한고혈압학회 2022 진료지침(가정혈압 측정법) · 가정혈압포럼 2022 권고

7일 혈압 기록표

잰 숫자는 골라 적지 말고 **모두** 적어 진료 때 가져오세요(혈압계 저장 기록도).

⑤ 기록표 — 한 칸에 위/아래 숫자(예: 128/82)

며칠째	날짜	아침 1번째	아침 2번째	저녁 1번째	저녁 2번째
1일째 (연습)		/	/	/	/
2일째		/	/	/	/
3일째		/	/	/	/
4일째		/	/	/	/
5일째		/	/	/	/
6일째		/	/	/	/
7일째		/	/	/	/
2~7일째 평균 ____ / ____ mmHg (어려우면 비워 오세요) · 메모:					

⑥ 진료실에서만 높을 때 약을 바로 안 쓰는 이유

안경은 시력을 정확히 잰 뒤에 도수를 맞추지요. 혈압약도 **집에서 잰 평소 혈압**을 기준으로 봅니다. 병원에서만 높은데 약을 쓰면 **집에서는 혈압이 너무 떨어질** 수 있습니다.

혈압약을 드시는 분은 집 혈압이 낮아도 약을 스스로 끊거나 줄이지 마세요(어지러우면 연락). **위 숫자가 180을 넘거나 아래 숫자가 120을 넘으면** 1분 뒤 다시 재고, 그래도 넘으면 증상이 없어도 **바로 병원에 연락**하세요. 이때 가슴 통증·숨참·등 통증·저림·시야 변화가 있으면 바로 119. **얼굴 한쪽 처짐·한쪽 팔다리 힘 빠짐·말이 어눌함**은 혈압 숫자와 관계없이 **바로 119**.

뇌동맥류가 있다면 혈압 목표는 130/80mmHg 미만입니다. 개인별 목표를 확인하고 금연·절주도 함께 관리합니다.

아산 28회 연수강좌 — 검진에서 발견된 뇌동맥류: 어떻게 추적하고 언제 치료할까?(박중철)

교육·참고용 안내문입니다. 약을 쓸지와 목표 혈압은 담당 의사와 상의해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/home-bp-card/