간수치 상승·지방간 결과 안내

간수치(AST·ALT·GGT) 상승은 흔하지만 원인은 다양합니다. 음주, 약·영양제, 바이러스간염, 근육 손상 등도 함께 확인하고 위험도에 따라 재검과 추가 검사를 정합니다.

검사 결과에서 보는 핵심 아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

항목	주로 어디서	올라가는 흔한 이유·읽는 법
ALT	간세포	간에 특이적인 염증 지표
AST	간·근육	운동 후도 상승 가능 — 근육 손상이면 CK(근육 효소)도 함께 오를 수 있음
GGT	음주·비만	단독 상승은 주로 음주·비만이 원인. 약물·다른 간담도 원인도 함께 살핍니다.

흔한 원인과 확인할 검사

흔한 원인

지방간 — 복부비만·당뇨·고중성지방과 동반

음주 — GGT(r-GTP) 단독 상승은 주로 음주·비만이 원인, AST가 ALT보다 높을 수 있음

약·영양제 — 진통제, 한약, 보충제 포함

운동·근육 손상 — AST·CK(근육 효소) 동반 상승 가능

추가 확인

간염 검사 — B형·C형 간염 여부

복부초음파 — ALT만 높다고 지방간은 아닙니다 — 지방간은 초음파 같은 영상으로 확인합니다(담석·간 종괴 확인)

대사 위험 평가 — 혈당, 지질, 혈압, 허리둘레

섬유화 평가 — 나이·간수치·혈소판으로 계산하는 점수(FIB-4), 필요하면 간 굳기를 재는 탄성도 검사

우르소데옥시콜산(우루사) 등 간장약 — 간수치는 내려도 지방간 자체는 그대로일 수 있음

지방간이라면 — 감량 목표 체중의 7~10%



건강한 간 vs 지방이 낀 간

지방간은 최근 '대사이상 지방간질환(MASLD)'으로도 불리며, 간 자체보다 심혈관질환·간 외 암 위험이 더 문제가 되는 경우가 많습니다.

체중 감량 폭	기대할 수 있는 효과
5% 이상	간 지방 감소
7~10%	간 염증 호전
10% 이상	섬유화(간이 굳는 변화) 호전 가능

생활 관리의 우선순위

먼저 줄일 것

술 — 지방간에 안전한 음주량은 없어 적을수록 좋습니다. 줄이는 것이 기본이고, 섬유화가 진행했거나 간경변이면 완전히 끊습니다. 재검 전 2~4주는 금주 권장

당 음료·과자 — 과당은 지방간 악화와 연관

과일주스·제로 음료 — 과일주스는 당 음료처럼 줄이고, 제로 음료도 물·보리차로 바꾸는 것이 좋음

야식·폭식 — 체중보다 복부지방 감소가 중요

불필요한 보충제 — 성분 불명 제품은 중단 상담

늘릴 것

주 150분 유산소 — 빠르게 걷기부터 시작

주 2회 근력운동 — 인슐린 저항성 개선

단백질·채소 중심 식사 — 흰쌀·면·빵 양 줄이기

3개월 재평가 — 간수치·체중·허리둘레 비교

빨리 진료가 필요한 신호

황달, 콜라색 소변, 심한 우상복부 통증, 발열, 멍·코피 증가, 복부 팽만, 원인 모를 체중 감소가 있으면 단순 지방간으로 넘기지 말고 빨리 진료를 보세요. **심한 우상복부 통증에 발열 또는 황달이 함께 있으면 응급실**로 가세요. 간수치가 정상이어도 지방간·섬유화가 있을 수 있어 위험요인에 따라 추적이 필요합니다.

함께 보기 — 지방간(대사이상 지방간질환, MASLD)의 단계·검사·치료 전체 설명은 진료실 슬라이드: edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/masld-fatty-liver/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한간학회 2025 대사이상 지방간질환 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO MASLD 진료지침 2024 · AASLD 2023 NAFLD Practice Guidance · ACG 간기능검사 지침 2017

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 원인과 추적 간격은 검사 수치, 음주량, 약물, 초음파 소견에 따라 달라집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/liver-enzyme-fatty-liver/