폐기능 검사 — 이렇게 해 주세요

검사 전 준비를 확인하시고, 검사실에서는 선생님 신호에 맞춰 4단계만 천천히 따라 하시면 됩니다.

검사 한눈에 보기

검사 시간	크게 부는 횟수	한 번 부는 시간	코집게
5~10	**3~8**	**6초+**	**꼭 필요**
분이면 끝나요	번 반복합니다	끝까지 부세요	코로 숨 새면 안 돼요

검사 전 준비 — 이것만 지켜 주세요

피할 것	검사 전 언제부터
담배·전자담배	**1시간 전부터 금지**
격렬한 운동	**1시간 전부터 금지**
술	**8시간 전부터 금지**
가슴·배를 조이는 옷	검사 날은 헐렁한 옷

흡입기 — 의사가 쉬라고 한 약만	쉬는 시간
숨찰 때 뿌리는 **속효성 확장제**	**4~6시간**
속효성 항콜린 흡입제	**12시간**
지속성 확장제(하루 2번 쓰는 약)	**24시간**
지속성 확장제(하루 1번 쓰는 약)	**36시간**
지속성 항콜린 흡입제	**36~48시간**

평소 쓰는 조절약(흡입 스테로이드 등)은 **의사가 따로 말하지 않으면 그대로** 쓰세요. 숨이 많이 차면 참지 말고 흡입기를 쓰신 뒤 **검사실에 알려 주세요**.

검사 전에 꼭 알릴 사항 최근 1개월 안의 심근경색, 최근 흉부 수술, 얼굴·가슴·배 통증이 있으면 시작 전에 알려 주세요. 검사 시행 여부와 시기를 먼저 판단합니다.

아산 28회 연수강좌 — 폐기능 검사 해석의 실제: 개원가에서 꼭 알아야 할 핵심 포인트(오연목)



코집게 · 입술로 꽉 · 처음부터 힘껏

검사 4단계 — 선생님 신호에 맞춰

STEP 01
자세 잡기
의자에 **등을 곧게 펴고** 편하게 앉아 주세요. 검사 선생님이 **코집게를 끼워 드립니다**.

STEP 02
마우스피스 물기
기구를 **입에 깊이 넣고 입술로 꽉 무신 뒤**, 평소처럼 편하게 **3~4번 호흡**합니다.

STEP 03
깊이 들이마시기
"들이마시세요" 신호에 **가슴이 가득 찰 때까지** 한 번에 크게. 어깨가 들썩여도 **괜찮습니다**.

STEP 04
힘껏 끝까지 부세요
"부세요!" 하면 **처음부터 강하고 빠르게**. 멈추지 말고 **6초 넘게 끝까지** 모든 숨을 내쉽니다.

호흡 요령 · 검사 중 알려 주세요

정확한 결과를 위한 다섯 가지

마우스피스를 입술로 꽉 — 옆으로 공기가 새면 다시 해야 해요
코집게는 단단히 — 코로 숨이 새면 결과가 낮게 나옵니다
들이마실 땐 가슴이 가득 찰 때까지 — 한 번에 크게 마셔요
내쉴 땐 천천히 X, 처음부터 강하게 O — 풍선 터뜨리듯
"그만" 하실 때까지 — 6초 넘게 멈추지 말고 부세요

아래 증상이 있으면 손을 들어 알려 주세요

어지럽거나 머리가 핑 돌 때
가슴이 답답하거나 아플 때
기침이 멈추지 않거나, 가래에 피가 섞일 때
속이 메스껍거나 식은땀이 날 때
평소보다 숨이 많이 차오를 때 — 잠시 쉰 뒤 다시 해도 괜찮아요

결과가 낮게 나와도 첫 1초 안의 기침·공기 누출·일찍 멈춤은 결과에 영향을 줍니다. 충분히 협조해 다시 검사한 뒤에도 이상하면 추가 검사를 판단합니다. 한 번의 낮은 수치만으로 병을 확정하지 않습니다.

아산 28회 연수강좌 — 폐기능 검사 해석의 실제: 개원가에서 꼭 알아야 할 핵심 포인트(오연목)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 수원시 영통구 광교중앙로 124, 8층 · ☎ 031-895-4560

근거 — ① 흡입기 약물 스테로이드 사용 중단 28일 · ERMAIS 메뉴얼 해석 2022 · 대한결핵및호흡기학회

함께 보기 — 검사 전 「폐기능검사」 edu.gwanggyobarun.com/decks/pulmo/pft/ · 결과지 받은 뒤 「결과 해석」 edu.gwanggyobarun.com/decks/pulmo/pft-interpretation/

흡입기를 멈출지·얼마나 멈출지는 진료실 안내가 우선입니다. 본 자료는 일반 안내이며 개인 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/respiratory/pulmonary-function-test-prep/