고지혈약(스타틴), 오해와 진실

스타틴은 참고 먹는 약도, 혼자 끊는 약도 아닙니다. 한 달 뒤 피검사로 효과를 확인하고, 부작용이 있으면 먼저 말씀해 주시면 약을 바꿉니다.

먹기 시작하면 이렇게 확인합니다



매일 같은 시간 복용 → 한 달 뒤 채혈

언제	무엇을 하나요
시작	매일 **같은 시간**에 드세요. 복용 시간은 **일정하게만 지키면 됩니다.**
한 달 뒤	**약효는 한 달쯤이면 거의 다 나타납니다.** 이때 채혈로 LDL이 얼마나 내려갔는지 확인합니다(공복이 아니어도 되며, 안내에 따릅니다). 간수치는 시작 전에 한 번 보고, 이후엔 증상이 있거나 필요할 때 함께 봅니다. 근육 증상도 여쭙습니다.
그 뒤	목표 LDL은 위험도에 따라 다르며 진료 때 알려 드립니다. 계속 먹을지, 약을 바꿀지는 검사 결과와 나의 위험도를 보고 함께 정합니다.

부작용, 이렇게 대처합니다

부작용	알아 둘 점	이렇게 하세요
근육통 · 쥐	실제 진료에서는 복용하는 분의 **약 7~29%**가 근육 증상을 말하지만, 가짜약과 비교한 대규모 분석에서는 **그중 90% 이상이 약 때문이 아니었습니다.**	가벼운 근육통·쥐는 **참지 말고, 약을 끊지 말고** 먼저 병원에 연락해 주세요. 원인을 확인하고 약을 바꿉니다. **심한 근육통·힘 빠짐·콜라색 소변·소변량 감소**는 약을 멈추고 바로 진료(진료시간 밖이면 응급실).
간수치 상승	조금 오를 수 있지만 대개 가볍습니다. **심한 간 손상은 드뭅니다.**	시작 전 수치와 비교하고, 필요할 때 채혈로 확인합니다. 많이 오르면 약을 조정합니다.
혈당 · 당화혈색소	당화혈색소를 **조금** 올립니다. 새로 당뇨 진단을 받는 분은 주로 원래 **당뇨 경계**에 있던 분입니다.	그 걱정 때문에 **필요한 약을 빼면 안 됩니다.** 혈관을 지키는 이득이 더 큽니다.

스스로 끊지 마세요. 부작용이 의심되면 먼저 말씀해 주시면 다른 스타틴·낮은 용량·다른 약으로 바꿉니다. 특히 **심근경색·스텐트·뇌경색**을 겪은 분은 임의로 끊으면 심장·혈관 사건 위험이 올라갑니다.

흔한 오해

자주 듣는 오해	바로 알기
"한번 먹으면 평생이라 무섭다"	혈관의 평생 누적 LDL 노출량을 줄이기 위해 꾸준히 드시는 것입니다. 무섭다고 혼자 끊기보다 **먼저 말씀해 주세요** — 위처럼 약을 바꾸는 방법이 있습니다.
"유튜브에서 나쁘다고 했다"	가짜약과 비교한 연구에서는 **가짜약을 먹은 사람도 근육통을 흔히 호소했습니다.**

자세한 근거는 진료실 설명 슬라이드에 있습니다 — **edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/statin-side-effects/** · 산디문(사이클로스포린) 복용 중이면: **edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/cyclosporine-statin-ezetimibe-safety/**

⚠ 이럴 때는 바로 진료를 받으세요

심한 근육통·힘 빠짐과 함께 소변이 콜라색이거나 소변량이 줄면 기다리지 말고 응급실로 가세요.

온몸 근육이 **심하게 아프거나 힘이 빠질 때** — 약을 멈추고 바로 진료(진료시간 밖이면 응급실)

눈이나 피부가 **노래질 때(황달)**

심한 피로·식욕 저하가 계속될 때

진료 때는 **먹는 약과 영양제·건강식품을 모두** 알려 주세요. 원인을 찾는 데 도움이 됩니다.

지방간만으로 필요한 스타틴을 끊지 않습니다. 간질환 단계와 처방 목적을 함께 봅니다. (아산28 최원묵)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 한국지질·동맥경화학회 이상지질혈증 진료지침 2022 · 2018 AHA/ACC Cholesterol Guideline · AHA Statin Safety Scientific Statement 2019 · Stroes, Eur Heart J 2015(스타틴 근육 증상 합의문) · CTT, Lancet 2022 스타틴 근육 증상 메타분석 · Daskalopoulou, Eur Heart J 2008(심근경색 후 스타틴 중단) · Lancet Diabetes Endocrinol 2024 스타틴·새 당뇨 메타분석

본 자료는 스타틴 복용을 안내하기 위한 일반 자료입니다. 목표 수치, 약의 종류·용량, 복용 기간은 나이, 기저질환, 심혈관 위험도에 따라 달라지니 진료 시 상의해 주세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/statin-myths-facts/