Zones de concentration des observations de grand dauphin en Iroise et chevauchement avec le trafic maritime

Exercice personnel d'analyse de données ouvertes, réalisé dans le cadre d'une candidature au projet Delfinu

Gwladys Helaine

20 octobre 2026

ℹ Synthèse

Objectif. Explorer ce que les données publiques permettent de dire de la répartition des grands dauphins dans le Parc, en particulier autour de l'île de Sein, et de leur chevauchement avec le trafic maritime.

Principaux résultats.

- **Localisation** : les observations se concentrent en deux zones distinctes, entre l'est de l'archipel de Molène et Le Conquet, et autour de l'île de Sein, en accord général avec les deux groupes côtiers résidents décrits par les suivis par photo-identification. Cette localisation est stable lorsque l'on modifie le découpage des secteurs ou la largeur de bande.
- **Surfaces** : selon la largeur de bande et le découpage, la zone centrale (isoplèthe 50 %) couvre de 105 à 274 km² à Molène et de 14 à 93 km² à Sein : ces surfaces ne sont pas des estimations fiables du domaine vital.
- **Habitat** : profondeur médiane de 13,5 m contre 68,4 m pour le milieu disponible, et distance médiane à la côte de 1,8 km contre 9,7 km.
- **Trafic maritime (hors pêche professionnelle)** : la densité médiane de navires équipés de l'AIS est 7,4 fois plus élevée dans les zones centrales que dans le reste du Parc pour la plaisance, 4,8 fois pour la voile et 4,7 fois pour les navires à passagers. Mais comparées aux autres eaux côtières, à distance de la côte équivalente, les zones centrales sont **moins** fréquentées par la plaisance et la voile (× 0,6 et × 0,4) ; seuls les navires à passagers y restent plus présents, sur les liaisons vers les îles.

Pour aller plus loin. Estimer le domaine vital du groupe de Sein et documenter ses interactions avec les activités humaines nécessiterait des données que les portails publics ne fournissent pas : l'effort d'observation (sorties, trajets, durée), l'identification des individus par photo-identification, des observations couvrant la partie ouest de la chaussée, et des données sur les petites embarcations absentes de l'AIS, recueillies selon un protocole commun et sur une même période. Les sources repérées au cours de cet exercice sont listées en annexe 2.

Analyse exploratoire fondée sur des observations publiques hétérogènes : les contours décrivent la densité des observations, qui dépend aussi de la répartition des observateurs, et non directement le domaine vital des groupes.

Contexte et objectif

Le projet Delfinu, co-porté par les parcs naturels marins d'Iroise et du Cap Corse et de l'Agriate, vise à comprendre et réduire les pressions humaines sur les grands dauphins (*Tursiops truncatus*) résidents. En mer d'Iroise, deux groupes côtiers résidents sont suivis par photo-identification : l'un dans l'archipel de Molène, l'autre sur la chaussée de Sein. Le **domaine vital** désigne l'espace utilisé habituellement par un individu ou un groupe pour ses activités (alimentation, repos, reproduction).

Cet exercice personnel explore ce que les données publiques permettent de dire de la répartition des grands dauphins dans le Parc. Il reprend, en l'enrichissant, la démarche d'un premier exercice réalisé sur le Parc du Cap Corse et de l'Agriate, et ne prétend pas se substituer aux suivis menés par le Parc et ses partenaires, qui reposent sur des données bien plus complètes. Il aborde trois questions :

1. **Où** les grands dauphins sont-ils observés dans le Parc, et ces zones correspondent-elles aux groupes connus ?
2. **Dans quel habitat** : les zones fréquentées diffèrent-elles du milieu disponible par la profondeur ou la distance à la côte ?
3. **Quel chevauchement avec le trafic maritime**, hors pêche professionnelle : plaisance, voile et navires à passagers ?

Il montre aussi la **bancarisation** des observations et des résultats dans une base PostgreSQL/PostGIS, interrogée en SQL et affichée dans QGIS.

Données et méthodes

Donnée	Source	Caractéristiques
Observations de *Tursiops truncatus*	Portails OBIS et GBIF (téléchargement automatisé sous R)	Données de présence, standard Darwin Core
Bathymétrie	NOAA ETOPO 2022	Résolution d'environ 480 m
Périmètre du Parc	PatriNat, base des espaces protégés (07/2026)	Polygone officiel
Densité de navires	EMODnet Human Activities	Données AIS, moyenne annuelle 2023, grille de 1 km ; tous navires, plaisance, voile, passagers

Toutes les couches sont projetées en **Lambert-93 (EPSG:2154)**, système métrique nécessaire au calcul des surfaces et des distances.

Nettoyage et contrôle qualité. Les enregistrements des deux portails ont été harmonisés puis filtrés, chaque étape étant tracée dans un journal. Sur 918 enregistrements bruts, 226 observations sont conservées dans l'emprise d'étude après nettoyage, dont 102 dans le Parc. Outre les filtres habituels (échouages, doublons exacts entre portails, dates antérieures à 2000, précision supérieure à 5 km, points à terre, agrégation à une observation par km² et par jour pour limiter la pseudo-réplication), deux contrôles ont été ajoutés après examen des données (règles et effectifs de chaque étape en annexe 1) :

- **Positions ramenées sur une grille** (82 enregistrements) : un jeu de données ancien ne fournit pas la position exacte des observations mais des positions ramenées au centre d'un quadrillage régulier, comme dans un atlas de répartition (par exemple 4°50′ O, 48°25′ N), jusqu'à 24 observations étant empilées sur un même point, avec une précision déclarée de 50 m manifestement erronée. Ces positions sont repérées automatiquement (longitude et latitude multiples exactes de 5 minutes d'arc), puis exclues après examen de la liste des points concernés (81 sur 82 proviennent du même jeu).
- **Doublons « floutés »** (28 enregistrements) : un inventaire national semble republier des observations d'autres jeux avec des coordonnées dégradées à 5 km : la plupart de ses enregistrements ont un équivalent le même jour, à quelques kilomètres, dans un autre jeu. Une donnée floutée est retirée lorsqu'une observation plus précise d'un autre jeu existe le même jour à moins de 10 km. Le détail des enregistrements exclus, par jeu et par position, est fourni avec le code.

102 observations sont retenues dans le Parc, de 2002 à 2026.

Zones de concentration des observations. La densité des observations est estimée par la **méthode des noyaux** (*kernel density estimation*, KDE ; Worton, 1989) : un noyau gaussien est centré sur chaque observation, et la somme des noyaux donne une surface continue de densité. La largeur du noyau est la **largeur de bande de référence** $h_{\text{ref}} = \sigma \times n^{-1/6}$, où σ est l'écart-type moyen des coordonnées et n le nombre d'observations. Les **isoplèthes** 50 % (zone centrale) et 95 % (zone étendue) délimitent les plus petites surfaces contenant 50 % et 95 % de la densité. Sur des observations opportunistes, ces contours décrivent la densité des observations, qui dépend à la fois de la présence des dauphins et de la répartition des observateurs : ils ne constituent qu'une approximation du domaine vital. En particulier, une isoplèthe 50 % ne signifie pas que les dauphins passent la moitié de leur temps dans la zone : elle contient la moitié de la densité estimée des observations.

Estimation par secteur. Une première estimation sur l'ensemble du Parc donne une largeur de bande de 7,0 km, une zone centrale de 707 km² et une zone étendue couvrant 81 % du Parc. La distribution des observations présente deux pics distincts, alors que la largeur de bande de référence n'est adaptée qu'aux distributions à un seul pic : elle surlisse alors la densité et surestime les surfaces (Worton, 1989 ; Seaman & Powell, 1996). Les observations ont donc été réparties en deux secteurs correspondant aux deux groupes côtiers décrits par les suivis par photo-identification (GECC, 2021 ; Buanic, 2021, 2022) : « Archipel de Molène – Le Conquet » et « Chaussée de Sein – Raz de Sein ». Les limites des secteurs ont été tracées après la première estimation ; leur influence a été testée en les réduisant puis en les élargissant de 5 km. Les deux concentrations apparaissent dès l'estimation sur l'ensemble du Parc, avant tout découpage : leur existence ne dépend donc pas des secteurs. En revanche, ceux-ci ayant été définis d'après les groupes connus, la correspondance entre les zones obtenues et ces groupes ne constitue pas une validation indépendante. La largeur de bande est recalculée dans chaque secteur, et l'estimation est répétée avec une largeur de bande divisée par deux. Les 23 observations du Parc situées hors des deux secteurs (au large ou entre les secteurs) ne sont pas utilisées pour ces estimations.

Habitat. L'habitat utilisé est comparé au milieu disponible selon un plan **utilisation / disponibilité** (Manly et al., 2002) : les 102 observations du Parc contre 1 020 points tirés aléatoirement dans sa partie marine (10 par observation). La

profondeur désigne ici la hauteur d'eau au point d'observation, c'est-à-dire la profondeur du fond lue sur la bathymétrie, et non la profondeur à laquelle nage l'animal, qui est observé en surface. La profondeur et la distance à la côte sont comparées par des **tests de Wilcoxon**, puis une **régression logistique** (présence = 1, disponibilité = 0) estime l'effet de la profondeur, transformée en logarithme puis centrée-réduite. La corrélation de Spearman entre profondeur et distance à la côte ($\rho = 0{,}84$) dépassant 0,7 en valeur absolue, seule la profondeur est conservée dans le modèle.

Trafic maritime. EMODnet calcule, pour chaque cellule de 1 km², le temps cumulé de présence des navires équipés de l'AIS (en heures par km² et par mois, moyenne de 2023). Conformément au périmètre de la mission, la pêche professionnelle est exclue des catégories analysées ; la catégorie « tous navires » l'inclut cependant. La **densité médiane** est comparée entre les zones centrales, les zones étendues (entre les isoplèthes 50 % et 95 %) et le reste du Parc, puis, dans chaque secteur, entre la zone centrale et le reste du secteur. Les **cellules de fort trafic** sont celles qui dépassent le troisième quartile des cellules du Parc (sensibilité testée avec la médiane et le 9ᵉ décile) ; leur part située dans les zones de concentration est comparée à la part de surface qu'elles occupent. Ces comparaisons sont descriptives : les cellules voisines n'étant pas indépendantes, aucun test statistique n'est appliqué.

Bancarisation. Les observations nettoyées, le périmètre du Parc, les contours estimés et des repères géographiques sont stockés dans une base **PostgreSQL / PostGIS** locale (schéma `iroise`), avec index spatiaux, une contrainte de cohérence sur les dates et des commentaires de tables. La base est interrogée en SQL (jointures et requêtes spatiales) et affichée directement dans QGIS.

Résultats

Localisation des zones de concentration

Table 1. – Estimation par secteur : effectifs et surfaces des isoplèthes

Secteur	n	Période	h	Centrale	Étendue	Centrale (h/2)
Molène	58	2002–2026	4,1	184	887	105
Sein	21	2002–2025	1,6	28	150	14

n = nombre d'observations ; h = largeur de bande (km) ; Centrale et Étendue = surfaces des isoplèthes 50 % et 95 % (km²) ; Centrale (h/2) = isoplèthe 50 % avec une largeur de bande divisée par deux.

Estimée secteur par secteur, la zone centrale mesure **184 km² à Molène** et **28 km² à Sein**, contre 707 km² pour l'estimation unique sur l'ensemble du Parc. La zone centrale de Molène est centrée entre l'est de l'archipel et Le Conquet (4,84° O ; 48,34° N) ; celle de Sein est centrée sur l'île (4,84° O ; 48,04° N). Avec 21 observations, l'estimation pour Sein reste indicative.




Figure 1. – Zones de concentration des observations, estimées dans chaque secteur

Lecture : fond bleu = profondeur ; pointillés = isobathe 50 m ; tirets = secteurs analysés ; contour rouge = zone centrale (isoplèthe 50 %) ; contour orange = zone étendue (isoplèthe 95 %) ; cercles = observations utilisées pour l'estimation ; triangles = observations du Parc hors secteur, utilisées seulement pour l'habitat.




Figure 2. – Secteur Chaussée de Sein – Raz de Sein : la zone centrale est centrée sur l'île, et presque aucune observation ne provient de la partie ouest de la chaussée, vers le phare d'Ar Men

La carte détaillée du secteur de Molène et les figures de sensibilité au découpage sont disponibles dans le dépôt du projet.

Sensibilité au découpage. Lorsque les secteurs sont réduits de 5 km, la zone centrale obtenue est comprise à 99,6 % (Molène) et 99,6 % (Sein) dans celle de l'analyse principale ; lorsqu'ils sont élargis de 5 km, elle recouvre 99,4 % et 99,7 % de celle-ci. Les zones sont donc emboîtées : **leur localisation ne dépend pas du découpage**. Leur surface en dépend en revanche fortement — de 106 à 274 km² pour Molène, de 17 à 93 km² pour Sein —, car élargir un secteur y fait entrer quelques observations éloignées qui augmentent la largeur de bande (de 1,6 à 3,6 km pour Sein). Avec le secteur élargi, une petite zone centrale supplémentaire apparaît aussi à l'est d'Ouessant.

Habitat

Les observations se situent à une profondeur médiane de **13,5 m** (intervalle interquartile : 7–53 m) contre 68,4 m pour le milieu disponible (37–102 m ; Wilcoxon, $p < 0{,}001$), et à **1,8 km de la côte** contre 9,7 km ($p < 0{,}001$). Dans le modèle logistique, le **rapport de cotes** associé à la profondeur est de **0,40** (IC 95 % : 0,33–0,47) : la cote d'observation diminue lorsque la profondeur augmente. Il s'agit d'une association entre la profondeur et la répartition des observations dans ce jeu de données, et non d'une mesure de sélection de l'habitat. La profondeur étant très corrélée à la distance à la côte, ce coefficient traduit aussi l'effet de la proximité de la côte et ne mesure pas un effet propre de la profondeur. Les observations proches dans l'espace n'étant pas indépendantes, les p-values et l'intervalle de confiance sont optimistes. Surtout, le milieu disponible est tiré dans tout le Parc, alors que l'effort d'observation n'est pas uniforme. Les jeux opportunistes (iNaturalist, Observation.org, observations rassemblées par l'Observatoire Pelagis, CardObs) sont concentrés dans les eaux peu profondes, avec des profondeurs médianes de 6 à 20 m selon le jeu ; le mode d'observation (depuis la terre ou depuis un bateau) n'y est pas renseigné. À l'inverse, le survol aérien de 2010, qui couvrait l'ensemble du Parc selon un protocole, a surtout détecté des dauphins au large, au-dessus de fonds d'environ 80 m en médiane, dont une partie appartient peut-être à d'autres populations que les groupes côtiers. Une partie de l'écart traduit donc la répartition de l'effort plutôt qu'une sélection de l'habitat par les dauphins, et l'analyse mélange les deux groupes côtiers et les observations du large.




Figure 3. – Profondeur et distance à la côte : observations et milieu disponible

Lecture : chaque violon représente la distribution des valeurs (plus il est large, plus les valeurs sont fréquentes) ; la boîte indique la médiane et l'intervalle interquartile ; axes en racine carrée.

Trafic maritime

Catégorie	Centrale	Étendue	Reste	Rapport	Q75	Q90
Tous navires*	3,37	1,46	1,20	× 2,8	38 %	45 %
Plaisance	0,31	0,10	0,04	× 7,4	37 %	44 %
Voile	0,78	0,36	0,16	× 4,8	34 %	42 %
Passagers	0,04	0,02	0,01	× 4,7	46 %	67 %

*Centrale, Étendue, Reste = densités médianes dans les zones centrales, les zones étendues et le reste du Parc, en heures de présence de navires par km² et par mois (AIS, 2023) ; Rapport = centrale / reste. Q75, Q90 = part des cellules de fort trafic (au-dessus du 3e quartile ou du 9e décile des cellules du Parc) situées dans les zones de concentration ; les zones de concentration (isoplèthes 95 %) couvrent 30,3 % du Parc : une part supérieure indique une surreprésentation. * Tous navires : pêche professionnelle incluse.*




Figure 4. – Densité de navires (AIS, tous navires, 2023) et zones de concentration des observations




Figure 5. – Densité de navires par zone et par catégorie

Lecture des résultats :

- **Un gradient régulier** : pour les quatre catégories, la densité médiane décroît des zones centrales vers les zones étendues, puis vers le reste du Parc. Le contraste est le plus marqué pour la plaisance (× 7,4) et la voile (× 4,8).
- **Par secteur** : la densité médiane de l'ensemble des navires est 2,4 fois plus élevée dans la zone centrale que dans le reste du secteur à Molène, et 4,3 fois à Sein, où l'écart atteint × 9,7 pour la plaisance et × 13,8 pour les navires à passagers. La carte situe ces secteurs : la route maritime entre Le Conquet et Molène, les abords de Camaret, le port de Sein et le Raz de Sein.
- **Effet de la proximité de la côte** : le trafic étant en général plus dense près des côtes, les zones centrales ont aussi été comparées à la seule partie du reste du Parc située à moins de 5,5 km de la côte (distance maximale de 90 % des cellules des zones centrales). L'écart devient × 0,6 pour l'ensemble des navires, × 0,6 pour la plaisance, × 0,4 pour la voile et × 17,8 pour les navires à passagers. Le contraste **s'inverse** pour la plaisance et la voile : à distance de la côte comparable, les zones centrales sont moins fréquentées que le reste de la bande côtière, qui comprend des secteurs très fréquentés comme la baie de Douarnenez et les abords de Brest et de Camaret. L'écart observé avec le reste du Parc tient donc à la proximité de la côte, et non à une fréquentation particulière des zones de concentration. Seuls les navires à passagers y restent nettement plus présents, ce qui correspond aux liaisons vers Molène, Ouessant et Sein.
- **Fort trafic** : par rapport à l'ensemble du Parc, les cellules de fort trafic sont légèrement surreprésentées dans les zones de concentration, surtout pour les navires à passagers avec le seuil le plus strict (67 % pour 30 % de la surface), ce qui correspond aux liaisons vers les îles.
- **Portée** : ces résultats décrivent un **chevauchement spatial** entre les observations et le trafic. Un rapport de 7 ne signifie pas que les dauphins sont 7 fois plus exposés : ces densités ne renseignent ni sur la distance entre navires et animaux, ni sur la vitesse, le bruit ou les réactions, et ne mesurent ni interaction ni impact. Les observations opportunistes étant concentrées dans les eaux côtières, là où circulent aussi les navires, une partie du recouvrement peut venir de l'effort d'observation lui-même.

Bancarisation et requêtes

Les requêtes du fichier `requetes.sql`, exécutées sur la base PostGIS, retrouvent les résultats de l'analyse R : 102 observations dans le Parc par jointure spatiale avec son périmètre, les mêmes surfaces de zones, et aucun doublon résiduel. Elles permettent aussi de répondre directement à des questions ponctuelles, par exemple : 25 observations sont situées à moins de 5 km de l'île de Sein (2004–2026), 47 % des observations du Parc tombent dans une zone centrale, et 23 km séparent les bords des deux zones centrales.

Comparaison avec les suivis existants

Les suivis par photo-identification décrivent deux groupes côtiers résidents. À Molène, la population est estimée entre 68 et 100 individus de 2014 à 2019, et à 139 individus en 2020 (IC 95 % : 105–192), estimation que les auteurs jugent à interpréter avec prudence ; les individus forment une seule communauté sociale (GECC, 2021). À Sein, 35 à 41 individus ont été identifiés en 2020–2021 ; le domaine vital est décrit comme « de petite taille », avec une forte fidélité à certains secteurs de la chaussée et de sa partie ouest, autour du phare d'Ar Men, et des groupes de passage sont observés près d'Ar

Men (Buanic, 2021, 2022). Dans l'Atlantique Nord-Est, grands dauphins côtiers et du large sont génétiquement distincts (Louis et al., 2014). Ces documents ne fournissant pas de surface de domaine vital, la comparaison porte sur la localisation.

- **Concordance** : les deux zones de concentration correspondent aux deux groupes connus, et la répartition côtière des observations est compatible avec un écotype côtier, sans le démontrer compte tenu de l'effort d'observation.
- **Molène** : la zone centrale, entre l'est de l'archipel et Le Conquet, est compatible avec l'archipel de Molène décrit par le suivi.
- **Sein** : la zone centrale est centrée sur l'île elle-même, à environ 11 km à l'est du phare d'Ar Men. Les données publiques ne comptent presque aucune observation sur la partie ouest de la chaussée, pourtant décrite comme fréquentée par le groupe. Ce décalage pourrait venir de l'effort d'observation, les observations opportunistes étant plus probables près du port et sur les routes fréquentées : 33 % des observations du secteur proviennent d'iNaturalist.
- **Au large** : l'estimation sur l'ensemble du Parc (zone étendue couvrant 81 % du Parc) réunit probablement les groupes résidents, des dauphins de passage et des dauphins du large, notamment ceux vus lors d'un survol aérien du Parc en 2010. Les données disponibles ne permettent pas de les distinguer.

Limites

- **Biais d'effort d'observation** : les observations proviennent de jeux hétérogènes (24 % issues du jeu « Suivi aérien des mammifères marins dans le périmètre du Parc naturel marin d'Iroise en 2010 »), sans information sur l'effort de prospection. Les contours reflètent autant la répartition de l'effort d'observation que l'usage réel de l'espace ; le mode d'observation (terre ou bateau) n'est pas renseigné dans les jeux opportunistes.
- **Surfaces peu robustes** : elles varient jusqu'à un facteur 5 selon le découpage des secteurs et la largeur de bande. Seule la localisation des zones est un résultat stable, et les tests de sensibilité ne permettent pas d'écarter l'hypothèse que ces concentrations reflètent en partie la répartition des observateurs.
- **Types de données mélangés** : suivis protocolés (survol aérien) et observations opportunistes n'ont ni le même protocole ni la même probabilité de détection ; les analyser séparément permettrait d'évaluer la sensibilité des résultats au type de données.
- **Absence d'identification individuelle** : sans photo-identification, il est impossible d'attribuer les observations à un groupe, de distinguer résidents et individus de passage, ou d'estimer un véritable domaine vital par groupe ; le découpage en secteurs n'en est qu'une approximation.
- **Hétérogénéité temporelle** : les observations couvrent 2002–2026 (32 % depuis 2014), alors que le trafic correspond à l'année 2023 ; la répartition des dauphins comme celle des observateurs a pu évoluer sur cette période.
- **Dépendance des observations** : l'agrégation à une observation par km² et par jour limite les répétitions, mais des observations proches dans l'espace ou répétées sur un même site peuvent concerner le même groupe ; la taille effective de l'échantillon est inférieure au nombre d'observations.
- **Trafic côtier sous-estimé** : l'AIS n'est obligatoire que pour une partie des navires ; les petites embarcations de plaisance et de pêche n'y figurent pas.
- **Résolution et effets de bord** : bathymétrie à environ 480 m, qui dessine grossièrement les petites îles, et trafic à 1 km. La densité estimée est limitée à la mer du Parc ou du secteur : la part du noyau qui tombe à terre ou hors de la zone est écartée, ce qui peut déformer les contours près des côtes et des limites.
- **Robustesse par source** : les concentrations n'ont pas été recalculées en excluant successivement les principaux jeux de données (survol aérien, iNaturalist, observations rassemblées par l'Observatoire Pelagis) ; ce test permettrait de vérifier qu'elles ne dépendent pas d'une seule source.

Conclusion

Cet exercice met en œuvre une chaîne d'analyse reproductible : téléchargement et contrôle qualité des données, bancarisation dans une base PostGIS, estimation des zones de concentration, analyse de l'habitat et croisement avec le trafic maritime. Le contrôle qualité a mis en évidence deux défauts des données publiques — positions ramenées sur une grille d'atlas et doublons aux coordonnées dégradées — qui déplaçaient notamment la zone centrale de Molène. À partir de 102 observations retenues sur 918 enregistrements bruts, les observations publiques se concentrent en deux secteurs côtiers, autour de l'archipel de Molène et de l'île de Sein, en accord général avec les zones connues par les suivis de terrain. Cette localisation est stable ; les surfaces estimées ne le sont pas, et ces données ne permettent pas à elles seules de délimiter le domaine vital des deux groupes, de démontrer une sélection de l'habitat ou de quantifier une exposition au trafic. Les observations sont nettement plus côtières et moins profondes que le milieu disponible, en partie du fait de la répartition des observateurs. La densité de navires équipés de l'AIS est plus élevée dans les zones de concentration que dans l'ensemble du Parc, mais cet écart tient à la proximité de la côte : comparées aux autres eaux côtières, les zones de concentration sont moins fréquentées par la plaisance et la voile, et seuls les navires à passagers, sur les liaisons vers les îles, y sont plus présents. Ce résultat illustre l'importance de contrôler les facteurs de confusion avant d'interpréter un chevauchement.

Les écarts avec les suivis par photo-identification, en particulier à Sein, montrent les limites des données opportunistes pour estimer un domaine vital. Le script a été conçu pour intégrer d'autres données : un fichier d'observations (longitude, latitude, date) déposé dans le dossier prévu suffit pour relancer l'ensemble de l'analyse.

Lexique

Terme	Définition
AIS	Système d'identification automatique : balise transmettant la position d'un navire, obligatoire pour une partie des navires seulement
Isoplèthe	Contour délimitant la plus petite surface qui contient une proportion donnée (50 %, 95 %) de la densité estimée
Largeur de bande	Paramètre fixant l'étalement de chaque noyau dans l'estimation par noyau
Photo-identification	Reconnaissance individuelle des animaux à partir de photographies de leurs marques naturelles (nageoire dorsale)
PostGIS	Extension de la base de données PostgreSQL permettant de stocker et d'interroger des données géographiques
Pseudo-réplication	Fait de traiter comme indépendantes des observations répétées d'un même groupe
Rapport de cotes	Facteur multiplicatif de la cote (probabilité / (1 – probabilité)) associé à une variation d'une unité de la variable explicative
Test de Wilcoxon	Test non paramétrique comparant les distributions de deux groupes à partir des rangs des valeurs

Références

- Buanic M. (2021). *Suivi photo-identification des grands dauphins de l'île de Sein – compte-rendu 2020*. OFB, Parc naturel marin d'Iroise.
- Buanic M. (2022). *Compte-rendu 2021 du suivi par photo-identification du groupe côtier de grands dauphins de la Chaussée de Sein*. OFB, Parc naturel marin d'Iroise.
- Couet P., Eloi D., Mauger G. (2021). *Étude de la population de grands dauphins de l'archipel de Molène – année 2020*. GECC, pour le Parc naturel marin d'Iroise et l'OFB.
- Louis M., Viricel A., Lucas T., Peltier H., Alfonsi E., Berrow S., Brownlow A., Covelo P., Dabin W., Deaville R., de Stephanis R., Gally F., Gauffier P., Penrose R., Silva M. A., Guinet C., Simon-Bouhet B. (2014). Habitat-driven population structure of bottlenose dolphins, *Tursiops truncatus*, in the North-East Atlantic. *Molecular Ecology*, 23(4), 857–874.
- Manly B. F. J., McDonald L. L., Thomas D. L., McDonald T. L., Erickson W. P. (2002). *Resource selection by animals: statistical design and analysis for field studies* (2e éd.). Kluwer Academic Publishers.
- Seaman D. E., Powell R. A. (1996). An evaluation of the accuracy of kernel density estimators for home range analysis. *Ecology*, 77(7), 2075–2085.
- Worton B. J. (1989). Kernel methods for estimating the utilization distribution in home-range studies. *Ecology*, 70(1), 164–168.

Sources de données (consultées en octobre 2026) : OBIS (obis.org) ; GBIF (gbif.org) ; NOAA National Centers for Environmental Information (2022), *ETOPO 2022 15 Arc-Second Global Relief Model*, doi:10.25921/fd45-gt74 ; EMODnet Human Activities, *Vessel density maps*, 2023 ; PatriNat (OFB, MNHN, CNRS, IRD), base des espaces protégés, juillet 2026.

Code, données nettoyées et résultats : https://github.com/gwladys-helaine/delfinu-iroise. Analyse entièrement reproductible, réalisée sous R (sf, terra, ggplot2), PostgreSQL/PostGIS, QGIS et Quarto.

Annexe 1 – Étapes du nettoyage des observations

Les filtres sont appliqués dans l'ordre du tableau : un enregistrement retiré à une étape n'est plus compté aux suivantes. Avant ces étapes, la requête au GBIF ne retient que les enregistrements géolocalisés et sans problème géographique signalé par le portail.

Étape	Règle appliquée	Retirés	Restant
Données de départ	Enregistrements OBIS et GBIF, réduits à dix colonnes communes	–	918
Coordonnées	Longitude et latitude présentes et dans les bornes possibles	0	918
Absences	Statut « absent » exclu	0	918
Spécimens	Spécimens de collection exclus	1	917
Échouages	Jeux dont le nom contient « échouage » ou « stranding » exclus	173	744
Doublons exacts	Une ligne par position (arrondie à environ 100 m) et par date	109	635
Dates	Date connue et année ≥ 2000	23	612
Précision	Incertitude déclarée ≤ 5 km ; enregistrements sans incertitude déclarée conservés	236	376
Positions sur grille	Longitude et latitude toutes deux multiples exacts de 5′ exclues	82	294
Points à terre	Altitude lue sur la bathymétrie de 20 m ou plus exclue	35	259
Doublons floutés	Incertitude ≥ 5 km exclue si un autre jeu donne, le même jour et à moins de 10 km, une position plus précise	28	231
Agrégation	Une observation par carré de 1 km et par jour	5	226
Parc	Observations situées dans la partie marine du Parc	124	102

Les observations situées hors du Parc ne sont pas des données erronées : elles sont conservées comme contexte sur les cartes.

Annexe 2 – Sources de données identifiées (liste non exhaustive)

Ce tableau rassemble les sources repérées au cours de cet exercice, à partir de documents publics consultés en octobre 2026. Il n'est pas exhaustif : d'autres données existent certainement, notamment au sein du Parc et de ses partenaires, et les informations sur les données non publiques ne sont données qu'à titre indicatif. Il indique pour chaque source si l'effort d'observation est connu, condition nécessaire pour distinguer la présence des dauphins de celle des observateurs.

Source (producteur)	Contenu	Effort	Accès	Apport pour le groupe de Sein
Photo-identification, groupe de Sein (Parc, OFB)	Sorties en mer ; données de domaine vital depuis 2014 d'après les comptes rendus	Oui	Interne ; comptes rendus publics	Source principale : domaine vital par groupe ou par individu
Photo-identification, groupe de Molène (GECC)	Catalogue depuis 2007 ; capture-recapture 2014–2020	Oui	Rapports publics ; données auprès du GECC	Comparaison entre groupes, échanges d'individus
Programme génétique Molène–Sein (Parc, OFB, MNHN)	Prélèvements non invasifs, 2021–2023	—	Partenaires	Liens entre côtiers, large et passage
OBSenMER (GECC)	Observations participatives, mode avec effort, activités humaines	Partiel	En ligne ; extraction auprès du GECC	Observations récentes avec effort ; usages hors AIS
Suivis aériens Pelagis, dont SAMM	Survols selon un protocole, 2002–2020	Non publié	Positions publiques (CC-BY-NC) ; effort sur demande	Répartition au large
Observations opportunistes (GBIF, OBIS)	Observations ponctuelles, 2002–2026	Non	Public	Présence seule ; utilisées dans cette note
OpenObs (SINP, PatriNat)	Agrégation nationale	Variable	Public, localisations parfois dégradées	Compléments à GBIF, à dédoublonner
Réseau national d'échouages (Pelagis)	Échouages, causes de mortalité	—	Bilans publiés ; données sur demande	Indices d'interactions, avec prudence
Densité de navires (EMODnet)	Trafic AIS par catégorie	—	Public	Utilisée dans cette note
Usages nautiques hors AIS	Plaisance légère, kayak, plongée, sorties d'observation	—	À rechercher	Pression non couverte par l'AIS
Bathymétrie HOMONIM (SHOM)	MNT à environ 111 m	—	Public (Licence Ouverte)	Habitat plus fin que ETOPO (~480 m)