

[별표 2] 중증도 분류 소아 [1단계: 15세미만 (B)]

2단계		3단계		4단계		등급
물질오용	A	물질오용/중독	A	중증 호흡곤란	AA	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	쇼크	AB	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
물질오용	A	물질오용/중독	A	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	열,면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	경증 호흡곤란	AJ	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
물질오용	A	물질오용/중독	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
물질오용	A	물질오용/중독	A	고위험 물질/알 수 없는 물질	CA	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
물질오용	A	물질오용/중독	A	알려진 저독성 물질	CC	4
물질오용	A	과다복용	B	중증 호흡곤란	AA	1
물질오용	A	과다복용	B	쇼크	AB	1
물질오용	A	과다복용	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
물질오용	A	과다복용	B	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	과다복용	B	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	과다복용	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
물질오용	A	과다복용	B	열,면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	과다복용	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
물질오용	A	과다복용	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
물질오용	A	과다복용	B	경증 호흡곤란	AJ	3
물질오용	A	과다복용	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
물질오용	A	과다복용	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
물질오용	A	과다복용	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
물질오용	A	과다복용	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
물질오용	A	과다복용	B	고위험 물질/알 수 없는 물질	CA	2
물질오용	A	과다복용	B	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
물질오용	A	과다복용	B	계획적인 자살시도	CC	2
물질오용	A	과다복용	B	구체적인 계획이 없는 자살관념	CD	3
물질오용	A	과다복용	B	과다복용	CE	4
물질오용	A	물질금단	C	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
물질오용	A	물질금단	C	쇼크	AB	1
물질오용	A	물질금단	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
물질오용	A	물질금단	C	중등도 호흡곤란	AD	2
물질오용	A	물질금단	C	혈역학적 장애	AE	2
물질오용	A	물질금단	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
물질오용	A	물질금단	C	열,면역억제 상태	AG	2
물질오용	A	물질금단	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
물질오용	A	물질금단	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
물질오용	A	물질금단	C	경증 호흡곤란	AJ	3
물질오용	A	물질금단	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
물질오용	A	물질금단	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃, 그리고 건강해 보임	AL	3
물질오용	A	물질금단	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
물질오용	A	물질금단	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
물질오용	A	물질금단	C	경련중	CA	1
물질오용	A	물질금단	C	최근발작, 발작 후 상태, 초조한 상태	CB	2
물질오용	A	물질금단	C	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CC	2
물질오용	A	물질금단	C	중증 불안/초조	CD	2
물질오용	A	물질금단	C	중등도 불안/초조	CE	3
물질오용	A	물질금단	C	경증 불안/초조	CF	4
정신건강	B	불안/상황위기	A	중증 불안/초조	CA	2
정신건강	B	불안/상황위기	A	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	불안/상황위기	A	중등도 불안/초조	CC	3
정신건강	B	불안/상황위기	A	경증 불안/초조	CD	4
정신건강	B	환각/망상	B	중등도 호흡곤란	AA	2
정신건강	B	환각/망상	B	혈역학적 장애	AB	2
정신건강	B	환각/망상	B	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
정신건강	B	환각/망상	B	열,면역억제 상태	AD	2
정신건강	B	환각/망상	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
정신건강	B	환각/망상	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
정신건강	B	환각/망상	B	경증 호흡곤란	AG	3
정신건강	B	환각/망상	B	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
정신건강	B	환각/망상	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
정신건강	B	환각/망상	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
정신건강	B	환각/망상	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
정신건강	B	환각/망상	B	급성 정신병, 중증 불안/초조, 도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CA	2
정신건강	B	환각/망상	B	중등도 불안/초조 또는 편집증(Paranoia)을 동반	CB	3
정신건강	B	환각/망상	B	경증의 불안/초조, 안정성	CC	4

2단계		3단계		4단계		등급
정신건강	B	환각/망상	B	만성적인 환각으로 인한 경증의 불안/초조	CD	5
정신건강	B	불면증	C	급성 불면증	CA	4
정신건강	B	불면증	C	만성 불면증	CB	5
정신건강	B	폭력/살인행위	D	자신 혹은 타인을 해치려는 구체적인 계획이 있거나 충동을 억제할 수 없는 상태	CA	1
정신건강	B	폭력/살인행위	D	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	폭력/살인행위	D	구체적인 계획이 없는 폭력적인 생각	CC	3
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	계획적인 자살시도	CA	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	뚜렷한 자살의도	CB	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CC	2
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	구체적인 계획이 없는 자살 관념	CD	3
정신건강	B	우울증/자살/자해	E	우울함, 자살 생각은 없음	CE	4
정신건강	B	사회문제	F	육체적 학대, 정신적 학대, 높은 감정적 스트레스	CA	2
정신건강	B	사회문제	F	대처할 수 없는 상태	CB	4
정신건강	B	사회문제	F	만성, 비급성 상태	CC	5
정신건강	B	기괴한 행동	G	중등도 호흡곤란	AA	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	혈역학적 장애	AB	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	열,면역억제 상태	AD	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	경증 호흡곤란	AG	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
정신건강	B	기괴한 행동	G	조절되지 않는 행동	CA	1
정신건강	B	기괴한 행동	G	도주의 가능성이나 안전에 대한 위험	CB	2
정신건강	B	기괴한 행동	G	조절되는 행동	CC	3
정신건강	B	기괴한 행동	G	해를 끼치지 않는 행동	CD	4
정신건강	B	기괴한 행동	G	만성, 비급성 상태	CE	5
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	다툼 또는 불안정한 상황	CA	1
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	도주의 가능성이나 학대가 반복될 위험	CB	2
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	육체적 폭행 또는 성폭행	CC	3
정신건강	B	환자의 복지에 대한 고려	H	학대의 병력/징후	CD	4
정신건강	B	소아의 파괴적 행동	I	도주의 가능성이나 안전에 대한	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
				위험/가족의 괴로움		
정신건강	B	소아의 파괴적 행동	I	타인이나 주변환경에 대해 급성으로 발생한 문제	CB	3
정신건강	B	소아의 파괴적 행동	I	지속적인 문제 행동	CC	4
정신건강	B	소아의 파괴적 행동	I	만성적이며 변하지 않는 행동	CD	5
신경과	C	의식수준의 변화	A	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	쇼크	AB	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	의식수준의 변화	A	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	의식수준의 변화	A	고위험성 사고기전	BA	2
신경과	C	의식수준의 변화	A	혈중 글루코스<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	CA	2
신경과	C	착란	B	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	착란	B	쇼크	AB	1
신경과	C	착란	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	착란	B	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	착란	B	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	착란	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	착란	B	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	착란	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	착란	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	착란	B	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	착란	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	착란	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	착란	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	착란	B	혈중 글루코스<54mg/dl 이고 관련증상을 동반	CA	2
신경과	C	착란	B	두통 또는 의식상태의 변화를 동반한 급성 착란	CB	2
신경과	C	착란	B	두통 또는 의식상태의 변화를 동반하지 않는 급성착란	CC	3
신경과	C	착란	B	만성, 평상시에 비해 변화없음	CD	4
신경과	C	현훈	C	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	현훈	C	쇼크	AB	1
신경과	C	현훈	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	현훈	C	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	현훈	C	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	현훈	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	현훈	C	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	현훈	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	현훈	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	현훈	C	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	현훈	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	현훈	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	현훈	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	현훈	C	자세변화에 의해 유발되지 않음 ± 신경학적 증상의 동반	CA	2
신경과	C	현훈	C	자세변화에 의해 발생, 다른 신경학적 증상 없음	CB	3
신경과	C	두통	D	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	두통	D	쇼크	AB	1
신경과	C	두통	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	두통	D	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	두통	D	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	두통	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	두통	D	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	두통	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	두통	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	두통	D	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	두통	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	두통	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	두통	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	두통	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
신경과	C	두통	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	두통	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
신경과	C	두통	D	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
신경과	C	두통	D	급성 경증 통증(<4)	BD	4
신경과	C	두통	D	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
신경과	C	두통	D	만성 경증 통증(<4)	BF	5
신경과	C	두통	D	급성,중증, 지금까지 경험했던 두통 중 가장 심함	CA	2
신경과	C	두통	D	시력장애 ± 안구통증	CB	2
신경과	C	두통	D	만성 또는 반복적인 두통	CC	5

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	발작	E	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	발작	E	쇼크	AB	1
신경과	C	발작	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	발작	E	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	발작	E	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	발작	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	발작	E	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	발작	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	발작	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	발작	E	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	발작	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	발작	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	발작	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	발작	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	발작	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
신경과	C	발작	E	발작 중	CA	1
신경과	C	발작	E	발작 후 상태	CB	2
신경과	C	발작	E	회복된 상태, 명료한의식	CC	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	쇼크	AB	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	보행장애/운동실조	F	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	보행장애/운동실조	F	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	보행장애/운동실조	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
신경과	C	보행장애/운동실조	F	발병시간<3시간	CA	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	쇼크	AB	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	발병시간<3시간	CA	2
신경과	C	사지약화/뇌졸중 증상	G	>3시간 또는 회복된 상태	CB	3
신경과	C	두부손상	H	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	두부손상	H	쇼크	AB	1
신경과	C	두부손상	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	두부손상	H	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	두부손상	H	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	두부손상	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	두부손상	H	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	두부손상	H	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	두부손상	H	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	두부손상	H	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	두부손상	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	두부손상	H	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	두부손상	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	두부손상	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
신경과	C	두부손상	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
신경과	C	두부손상	H	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
신경과	C	두부손상	H	고위험성 사고기전	BC	2
신경과	C	두부손상	H	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
신경과	C	두부손상	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
신경과	C	두부손상	H	급성 경증 통증(<4)	BF	4
신경과	C	두부손상	H	새로운 국소적 신경학적 증상	CA	2
신경과	C	두부손상	H	의식소실의 병력	CB	3
신경과	C	두부손상	H	장기간의 척추고정	CC	3
신경과	C	두부손상	H	의식소실의 병력이 없음	CD	4
신경과	C	떨림(Tremor)	I	중등도 호흡곤란	AA	2

2단계		3단계		4단계		등급
신경과	C	떨림(Tremor)	I	혈역학적 장애	AB	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	열,면역억제 상태	AD	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
신경과	C	떨림(Tremor)	I	경증 호흡곤란	AG	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
신경과	C	떨림(Tremor)	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
신경과	C	떨림(Tremor)	I	만성떨림	CA	4
신경과	C	감각상실/이상감각	J	새로 발병된 감각소실/이상감각	CA	3
신경과	C	감각상실/이상감각	J	만성 감각소실/이상감각	CB	4
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	중증 호흡곤란	AA	1
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	쇼크	AB	1
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	무의식(GCS 3-8)	AC	1
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	중등도 호흡곤란	AD	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	혈역학적 장애	AE	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	열,면역억제 상태	AG	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	경증 호흡곤란	AJ	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	머리를 지탱할 수 없음, 근긴장도가 없음	CA	2
신경과	C	축 늘어진 소아(Floppy child)	K	예상보다 제한적인 근육 혹은 예상보다	CB	3

2단계		3단계		4단계		등급
		child)		적은 근육		
안과	D	화학물질 노출,눈	A	화학물질 노출,눈	CA	2
안과	D	이물질,눈	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	이물질,눈	B	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	이물질,눈	B	급성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	이물질,눈	B	이물질의 안구 관통	CA	2
안과	D	이물질,눈	B	급성 또는 갑작스런 시력변화	CB	2
안과	D	이물질,눈	B	급성 말초성 경증 통증	CC	5
안과	D	시력장애	C	급성 또는 갑작스런 시력장애	CA	2
안과	D	시력장애	C	만성/점진적 시력장애	CB	4
안과	D	눈통증	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈통증	D	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
안과	D	눈통증	D	만성 중증 통증(8-10)	BD	3
안과	D	눈통증	D	급성 경증 통증(<4)	BE	4
안과	D	눈통증	D	만성 중등도 통증(4-7)	BF	4
안과	D	눈통증	D	만성 경증 통증(<4)	BG	5
안과	D	눈통증	D	급성 또는 갑작스런 시력변화	CA	2
안과	D	눈충혈,분비물	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈충혈,분비물	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	눈충혈,분비물	E	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
안과	D	눈충혈,분비물	E	급성 경증 통증(<4)	BD	4
안과	D	눈충혈,분비물	E	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
안과	D	눈충혈,분비물	E	만성 경증 통증(<4)	BF	5
안과	D	눈충혈,분비물	E	눈충혈/분비물, 급성	CA	4
안과	D	눈충혈,분비물	E	눈충혈/분비물, 만성	CB	5
안과	D	눈부심	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈부심	F	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	눈부심	F	급성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	눈부심	F	눈부심	CA	4
안과	D	복시	G	급성발병	CA	3
안과	D	복시	G	만성 복시	CB	4
안과	D	안외주위 부종	H	중등도 호흡곤란	AA	2
안과	D	안외주위 부종	H	혈역학적 장애	AB	2
안과	D	안외주위 부종	H	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
안과	D	안외주위 부종	H	열,면역억제 상태	AD	2
안과	D	안외주위 부종	H	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
안과	D	안외주위 부종	H	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
안과	D	안외주위 부종	H	경증 호흡곤란	AG	3
안과	D	안외주위 부종	H	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
안과	D	안외주위 부종	H	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
안과	D	안외주위 부종	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
안과	D	안와주위 부종	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
안과	D	안와주위 부종	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	안와주위 부종	H	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	안와주위 부종	H	급성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	안와주위 부종	H	안와주위 부종	CA	5
안과	D	눈 외상	I	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈 외상	I	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
안과	D	눈 외상	I	고위험성 사고기전	BC	2
안과	D	눈 외상	I	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
안과	D	눈 외상	I	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
안과	D	눈 외상	I	급성 경증 통증(<4)	BF	3
안과	D	눈 외상	I	관통 손상이나 화학, 직접적인 고열에 의한 손상	CA	2
안과	D	눈 외상	I	둔상에 의한 시력소실	CB	2
안과	D	눈 외상	I	급성/갑작스런 시력변화	CC	2
안과	D	눈 외상	I	분류담당자가 눈을 확인할 수 없는 상태	CD	2
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 경증 통증(<4)	BC	4
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	급성 또는 갑작스런 시력변화	CA	2
안과	D	눈의 재검(Re-check)	J	눈의 재확인	CB	5
코질환	E	코피	A	중증 호흡곤란	AA	1
코질환	E	코피	A	쇼크	AB	1
코질환	E	코피	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
코질환	E	코피	A	중등도 호흡곤란	AD	2
코질환	E	코피	A	혈역학적 장애	AE	2
코질환	E	코피	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
코질환	E	코피	A	열,면역억제 상태	AG	2
코질환	E	코피	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
코질환	E	코피	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
코질환	E	코피	A	경증 호흡곤란	AJ	3
코질환	E	코피	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
코질환	E	코피	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
코질환	E	코피	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
코질환	E	코피	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
코질환	E	코피	A	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
코질환	E	코피	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
코질환	E	코피	A	적절한 압박에도 멈추지 않는 코피, 또는 관련된 내과적 기저질환이 있는	CA	2

2단계		3단계		4단계		등급
				경우		
코질환	E	코피	A	압박으로 지혈된 코피	CB	3
코질환	E	코피	A	급성코피, 두드러진 출혈은 없음	CC	4
코질환	E	코피	A	주기적/반복적이며 두드러지지 않은 출혈	CD	5
코질환	E	코막힘/건초열	B	코막힘/건초열	CA	5
코질환	E	이물질,코	C	중등도 호흡곤란	AA	2
코질환	E	이물질,코	C	경증 호흡곤란	AB	3
코질환	E	이물질,코	C	정상 범위 밖의 활력징후	AC	3
코질환	E	이물질,코	C	3-36 개월, $T < 32-35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 건강해 보임	AD	3
코질환	E	이물질,코	C	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AE	3
코질환	E	이물질,코	C	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AF	4
코질환	E	이물질,코	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
코질환	E	이물질,코	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
코질환	E	이물질,코	C	급성 경증 통증(<4)	BC	4
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	중등도 호흡곤란	AA	2
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	경증 호흡곤란	AB	3
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	정상 범위 밖의 활력징후	AC	3
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	3-36 개월, $T < 32-35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 건강해 보임	AD	3
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AE	3
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AF	4
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	급성 경증 통증(<4)	BC	4
코질환	E	상기도감염 증상 호소	D	건강해보임, 열 없음	CA	5
코질환	E	코외상	E	중등도 호흡곤란	AA	2
코질환	E	코외상	E	혈역학적 장애	AB	2
코질환	E	코외상	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
코질환	E	코외상	E	열,면역억제 상태	AD	2
코질환	E	코외상	E	<3 개월, $T < 36^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$	AE	2
코질환	E	코외상	E	3-36 개월, $T < 32^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파보임	AF	2
코질환	E	코외상	E	경증 호흡곤란	AG	3
코질환	E	코외상	E	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
코질환	E	코외상	E	3-36 개월, $T < 32-35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 건강해 보임	AI	3
코질환	E	코외상	E	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AJ	3
코질환	E	코외상	E	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AK	4
코질환	E	코외상	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
코질환	E	코외상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한)	BB	2

2단계		3단계		4단계		등급
				출혈)		
코질환	E	코외상	E	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
코질환	E	코외상	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
코질환	E	코외상	E	급성 경증 통증(<4)	BE	4
코질환	E	코외상	E	적절한 지혈에도 멈추지 않는 코피	CA	2
코질환	E	코외상	E	코외상	CB	5
귀질환	F	이통(Earache)	A	중등도 호흡곤란	AA	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	혈역학적 장애	AB	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	열,면역억제 상태	AD	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	경증 호흡곤란	AG	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
귀질환	F	이통(Earache)	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
귀질환	F	이통(Earache)	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5
귀질환	F	이물질,귀	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
귀질환	F	이물질,귀	B	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
귀질환	F	이물질,귀	B	급성 경증 통증(<4)	BC	4
귀질환	F	청력소실	C	청력소실, 급성 발병	CA	3
귀질환	F	청력소실	C	청력소실, 서서히 발병	CB	5
귀질환	F	이명	D	아스피린 복용 가능성 있음	CA	2
귀질환	F	이명	D	이명	CB	4
귀질환	F	삼출물,귀	E	열,면역억제 상태	AA	2
귀질환	F	삼출물,귀	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AB	2
귀질환	F	삼출물,귀	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AC	2
귀질환	F	삼출물,귀	E	경증 호흡곤란	AD	3
귀질환	F	삼출물,귀	E	정상 범위 밖의 활력징후	AE	3
귀질환	F	삼출물,귀	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AF	3
귀질환	F	삼출물,귀	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AG	3
귀질환	F	삼출물,귀	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AH	4
귀질환	F	귀손상	F	중등도 호흡곤란	AA	2

2단계		3단계		4단계		등급
귀질환	F	귀손상	F	혈역학적 장애	AB	2
귀질환	F	귀손상	F	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
귀질환	F	귀손상	F	열,면역억제 상태	AD	2
귀질환	F	귀손상	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
귀질환	F	귀손상	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
귀질환	F	귀손상	F	경증 호흡곤란	AG	3
귀질환	F	귀손상	F	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
귀질환	F	귀손상	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
귀질환	F	귀손상	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
귀질환	F	귀손상	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
귀질환	F	귀손상	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
귀질환	F	귀손상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
귀질환	F	귀손상	F	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
귀질환	F	귀손상	F	급성 경증 통증(<4)	BD	4
귀질환	F	귀손상	F	절단	CA	2
귀질환	F	귀손상	F	창백하거나 청색증을 동반한 동상, 중증	CB	3
귀질환	F	귀손상	F	색 변화를 동반하지 않은 동상, 경증	CC	4
귀질환	F	귀손상	F	봉합이 필요한 열상	CD	4
귀질환	F	귀손상	F	봉합이 불필요한 열상/찰과상	CE	5
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	만성 중증 통증(8-10)	BD	3
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	급성 경증 통증(<4)	BE	4
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	만성 중등도 통증(4-7)	BF	4
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	만성 경증 통증(<4)	BG	5
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	치아박리(최근 발생하였으며 온전한 치아가 존재)	CA	2
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	활력징후가 정상이며 기저 질환이 없는 잇몸출혈	CB	4
이비인후과-입,인 후,경부	G	치아/잇몸문제	A	치아/잇몸문제, 경증문제	CC	5
이비인후과-입,인 후,경부	G	안면외상	B	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과-입,인 후,경부	G	안면외상	B	쇼크	AB	1
이비인후과-입,인	G	안면외상	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1

2단계		3단계		4단계		등급
후,경부						
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	열,면역억제 상태	AG	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	경증 호흡곤란	AJ	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	고위험성 사고기전	BA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면외상	B	급성 경증 통증(<4)	BE	4
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	쇼크	AB	1
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	열,면역억제 상태	AG	2
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	경증 호흡곤란	AJ	3
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	급성 경증 통증(<4)	BD	4
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	만성 경증 통증(<4)	BF	5
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	침흘림 또는 협착음	CA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	입술, 혀, 입인두의 명백한 부종/부기	CB	2
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	연하장애	CC	3
이비인후과-입,인후,경부	G	인후통	C	경증 인후통 ± 후두염	CD	5
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	쇼크	AB	1
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	열,면역억제 상태	AG	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	경증 호흡곤란	AJ	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3

2단계		3단계		4단계		등급
후,경부						
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	급성 경증 통증(<4)	BD	4
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	만성 경증 통증(<4)	BF	5
이비인후과-입,인후,경부	G	경부 부종/통증	D	경부강직/ 수막자극증 ±열	CA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	쇼크	AB	1
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	열,면역억제 상태	AG	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	경증 호흡곤란	AJ	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2

2단계		3단계		4단계		등급
후,경부						
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	고위험성 사고기전	BC	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	급성 경증 통증(<4)	BF	4
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	이상감각, 신경 징후	CA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	경부외상	E	목 씌소리와 언어장애	CB	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	중증 호흡곤란	AA	1
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	쇼크	AB	1
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	중등도 호흡곤란	AD	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	혈역학적 장애	AE	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	열,면역억제 상태	AG	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	경증 호흡곤란	AJ	3
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	침흘림 또는 협착음	CA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	연하장애/연하곤란	F	이물질의 가능성	CB	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	중등도 호흡곤란	AA	2

2단계		3단계		4단계		등급
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	혈역학적 장애	AB	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	열,면역억제 상태	AD	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	경증 호흡곤란	AG	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	급성 경증 통증(<4)	BD	4
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
이비인후과-입,인후,경부	G	안면통증(비-외상성/비-치아성)	G	만성 경증 통증(<4)	BF	5
호흡기	H	숨참	A	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	숨참	A	쇼크	AB	1
호흡기	H	숨참	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	숨참	A	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	숨참	A	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	숨참	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	숨참	A	열,면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	숨참	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
호흡기	H	숨참	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	숨참	A	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	숨참	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	숨참	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	숨참	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	숨참	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4

2단계		3단계		4단계		등급
				보입		
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 40%미만인 알려진 천식(중증)	CA	2
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 40-60%인 알려진 천식(중등도)	CB	3
호흡기	H	숨참	A	예측 FEV1 혹은 PEER이 60%이상인 알려진 천식(경증)	CC	4
호흡기	H	숨참	A	숨참, 호흡곤란 없음	CD	4
호흡기	H	호흡정지	B	호흡정지	CA	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	쇼크	AB	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	과다호흡증후군	C	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	열,면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보입	AI	2
호흡기	H	과다호흡증후군	C	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	과다호흡증후군	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
호흡기	H	과다호흡증후군	C	회복된 과다호흡증후군, 건강해보임	CA	4
호흡기	H	객혈	D	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	객혈	D	쇼크	AB	1
호흡기	H	객혈	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	객혈	D	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	객혈	D	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	객혈	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	객혈	D	열,면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	객혈	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
호흡기	H	객혈	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보입	AI	2
호흡기	H	객혈	D	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	객혈	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	객혈	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	객혈	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	객혈	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
호흡기	H	객혈	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	객혈	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
호흡기	H	객혈	D	객혈, 건강해보임	CA	4
호흡기	H	기침/코막힘	E	중등도 호흡곤란	AA	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	혈역학적 장애	AB	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	열,면역억제 상태	AD	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
호흡기	H	기침/코막힘	E	경증 호흡곤란	AG	3
호흡기	H	기침/코막힘	E	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
호흡기	H	기침/코막힘	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
호흡기	H	기침/코막힘	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
호흡기	H	기침/코막힘	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
호흡기	H	기침/코막힘	E	만성기침/코막힘, 정상 활력징후	CA	5
호흡기	H	호흡기 이물질	F	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	쇼크	AB	1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	호흡기 이물질	F	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	열,면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	급성 경증 통증(<4)	BC	4
호흡기	H	호흡기 이물질	F	침흘림 또는 협착음	CA	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	목선소리와 언어장애	CB	2
호흡기	H	호흡기 이물질	F	호흡곤란 없는 연하장애	CC	3
호흡기	H	호흡기 이물질	F	호흡기 이물질, 경증통증, 호흡곤란 없음	CD	4
호흡기	H	알레르기 반응	G	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	알레르기 반응	G	쇼크	AB	1
호흡기	H	알레르기 반응	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	알레르기 반응	G	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	열,면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
호흡기	H	알레르기 반응	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
호흡기	H	알레르기 반응	G	급성 경증 통증(<4)	BC	4
호흡기	H	알레르기 반응	G	중증 반응의 기왕력	CA	2
호흡기	H	알레르기 반응	G	코 막힘을 동반한 건초열	CB	5
호흡기	H	협착음	H	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	협착음	H	쇼크	AB	1
호흡기	H	협착음	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	협착음	H	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	협착음	H	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	협착음	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	협착음	H	열,면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	협착음	H	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
호흡기	H	협착음	H	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	협착음	H	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	협착음	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	협착음	H	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	협착음	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	협착음	H	기도장애	CA	1
호흡기	H	협착음	H	현저한 협착음이 들림	CB	2
호흡기	H	협착음	H	협착음이 청진됨	CC	3
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	쇼크	AB	1
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	열,면역억제 상태	AG	2

2단계		3단계		4단계		등급
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	내원 시 무호흡 발생	CA	1
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	영아 <7일 미만	CB	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	최근의발작이무호흡또는호흡장애와일치 한다.	CC	2
호흡기	H	영아의 무호흡 발작	J	무호흡증과 발작이 일치하는 과거력	CD	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	중증 호흡곤란	AA	1
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	쇼크	AB	1
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	무의식(GCS 3-8)	AC	1
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	중등도 호흡곤란	AD	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	혈역학적 장애	AE	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	열,면역억제 상태	AG	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	경증 호흡곤란	AJ	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
호흡기	H	천명음-다른 증상 호소 없음	K	천명음 - 기타 증상 호소	CA	3
심혈관	I	심정지(비-외상성)	A	심정지(비외상성)	CA	1
심혈관	I	심정지(외상성)	B	심정지(외상성)	CA	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	쇼크	AB	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	흉통(심인성)	C	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	흉통(심인성)	C	열,면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
심혈관	I	흉통(심인성)	C	심인성 흉통	CA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	쇼크	AB	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	열,면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	정상범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	급성 경증 통증(<4)	BD	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	만성 경증 통증(<4)	BF	5
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	기타 중요한 가슴 통증(잡아쥘, 찢어지는 통증)	CA	2
심혈관	I	흉통(비 심인성)	D	가슴통증, 비 심인성	CB	5
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	쇼크	AB	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	열,면역억제 상태	AG	2

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	정상범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	심인성 가슴통증	CA	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	치명적일 수 있는 부정맥의 병력이나 의무기록	CB	2
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	급성발병, 지속되는 증상	CC	3
심혈관	I	심계항진/불규칙 심장박동	E	심계항진의 병력, 현재는 회복된 상태	CD	4
심혈관	I	전신쇠약	F	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	전신쇠약	F	쇼크	AB	1
심혈관	I	전신쇠약	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	전신쇠약	F	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	전신쇠약	F	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	전신쇠약	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	전신쇠약	F	열,면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	전신쇠약	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
심혈관	I	전신쇠약	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
심혈관	I	전신쇠약	F	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	전신쇠약	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	전신쇠약	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
심혈관	I	전신쇠약	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	전신쇠약	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
심혈관	I	전신쇠약	F	중증 탈수	CA	1
심혈관	I	전신쇠약	F	중등도 탈수	CB	2
심혈관	I	전신쇠약	F	갑자기 보행이 어려움	CC	3
심혈관	I	전신쇠약	F	경증탈수	CD	3
심혈관	I	전신쇠약	F	탈수의 가능성 있음	CE	4
심혈관	I	전신쇠약	F	만성쇠약	CF	4
심혈관	I	실신/전-실신	G	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	실신/전-실신	G	쇼크	AB	1
심혈관	I	실신/전-실신	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	실신/전-실신	G	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	실신/전-실신	G	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	열,면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	새로 발병한 부정맥, 불규칙 맥박/맥박수의 변화	CA	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	전구증상 없음	CB	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	운동 중 발생함	CC	2
심혈관	I	실신/전-실신	G	전구증상 동반 또는 급격한 자세변화 시 발병	CD	3
심혈관	I	실신/전-실신	G	정상 활력, 증상회복	CE	4
심혈관	I	전신성 부종	H	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	전신성 부종	H	쇼크	AB	1
심혈관	I	전신성 부종	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	전신성 부종	H	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	전신성 부종	H	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	전신성 부종	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	전신성 부종	H	열,면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	전신성 부종	H	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
심혈관	I	전신성 부종	H	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
심혈관	I	전신성 부종	H	경증 호흡곤란	AJ	3
심혈관	I	전신성 부종	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
심혈관	I	전신성 부종	H	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
심혈관	I	전신성 부종	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
심혈관	I	전신성 부종	H	전신성 부종, 정상 활력	CA	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	중등도 호흡곤란	AA	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	혈역학적 장애	AB	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	열,면역억제 상태	AD	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	경증 호흡곤란	AG	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3

2단계		3단계		4단계		등급
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	급성 경증 통증(<4)	BD	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	만성 경증 통증(<4)	BF	5
심혈관	I	양측성 다리부기/부종	I	부종/양측성 다리부기, 만성	CA	5
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	중증 호흡곤란	AA	1
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	쇼크	AB	1
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	무의식(GCS 3-8)	AC	1
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	중등도 호흡곤란	AD	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	혈역학적 장애	AE	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	열,면역억제 상태	AG	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
심혈관	I	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	J	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	CA	2
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	중등도 호흡곤란	AA	2
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	혈역학적 장애	AB	2
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	열,면역억제 상태	AD	2
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	경증 호흡곤란	AG	3
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
심혈관	I	일측성의 홍조 편	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3

2단계		3단계		4단계		등급
		뜨거운 사지				
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	>36 개월, T $\geq$ 38°C, 그리고 건강해 보임	AK	4
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	급성 경증 통증(<4)	BC	4
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	광범위한 염증	CA	3
심혈관	I	일측성의 홍조 편 뜨거운 사지	K	국소성 염증	CB	4
소화기	J	복통	A	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	복통	A	쇼크	AB	1
소화기	J	복통	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	복통	A	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	복통	A	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	복통	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	복통	A	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	복통	A	<3 개월, T<36°C 또는 $\geq$ 38°C	AH	2
소화기	J	복통	A	3-36 개월, T<32°C 또는 $\geq$ 38°C, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	복통	A	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	복통	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	복통	A	3-36 개월, T<32-35°C 또는 $\geq$ 38°C 그리고 건강해 보임	AL	3
소화기	J	복통	A	>36 개월, T $\geq$ 38°C, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	복통	A	>36 개월, T $\geq$ 38°C, 그리고 건강해 보임	AN	4
소화기	J	복통	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	복통	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	복통	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	복통	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	복통	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	복통	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	식욕부진	B	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	식욕부진	B	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	식욕부진	B	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	식욕부진	B	열,면역억제 상태	AD	2
소화기	J	식욕부진	B	<3 개월, T<36°C 또는 $\geq$ 38°C	AE	2
소화기	J	식욕부진	B	3-36 개월, T<32°C 또는 $\geq$ 38°C, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	식욕부진	B	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	식욕부진	B	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	식욕부진	B	3-36 개월, T<32-35°C 또는 $\geq$ 38°C	AI	3

2단계		3단계		4단계		등급
				그리고 건강해 보임		
소화기	J	식욕부진	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	식욕부진	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	식욕부진	B	중요한 체중감소	CA	3
소화기	J	식욕부진	B	식욕부진, 좋아 보임	CB	4
소화기	J	변비	C	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	변비	C	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	변비	C	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	변비	C	열,면역억제 상태	AD	2
소화기	J	변비	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
소화기	J	변비	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	변비	C	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	변비	C	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	변비	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
소화기	J	변비	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	변비	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	변비	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	변비	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	변비	C	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	변비	C	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	변비	C	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	변비	C	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	변비	C	단순변비	CA	5
소화기	J	직장내 이물질	D	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	직장내 이물질	D	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	직장내 이물질	D	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	직장내 이물질	D	열,면역억제 상태	AD	2
소화기	J	직장내 이물질	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
소화기	J	직장내 이물질	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	직장내 이물질	D	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	직장내 이물질	D	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	직장내 이물질	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
소화기	J	직장내 이물질	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	직장내 이물질	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	직장내 이물질	D	급성 경증 통증(<4)	BC	4
소화기	J	직장내 이물질	D	직장내 이물질	CA	5

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	열,면역억제 상태	AD	2
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	살고랑부위(Groin)통증/ 종괴	E	살고랑부위(Groin)통증/종괴	CA	5
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	쇼크	AB	1
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2

2단계		3단계		4단계		등급
		구역				
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	중증 탈수	CA	1
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	지속되는 상당량의 토혈	CB	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	중등도 탈수	CC	2
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	커피찌꺼기모양 구토/흑색변	CD	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	경증탈수	CE	3
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	탈수가 될 수 있음	CF	4
소화기	J	구토 그리고/ 또는 구역	F	만성구토/구역, 정상활력징후	CG	5
소화기	J	직장/회음부 통증	G	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	열,면역억제 상태	AD	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	직장/회음부 통증	G	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	직장/회음부 통증	G	만성 경증 직장/회음부 통증	CA	5

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	설사	H	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	설사	H	쇼크	AB	1
소화기	J	설사	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	설사	H	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	설사	H	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	설사	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	설사	H	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	설사	H	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
소화기	J	설사	H	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	설사	H	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	설사	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	설사	H	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
소화기	J	설사	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	설사	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
소화기	J	설사	H	중증 탈수	CA	1
소화기	J	설사	H	중등도 탈수	CB	2
소화기	J	설사	H	멈추지 않는 혈성 설사	CC	3
소화기	J	설사	H	경증탈수	CD	3
소화기	J	설사	H	만성설사, 정상 활력징후	CE	5
소화기	J	토혈	I	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	토혈	I	쇼크	AB	1
소화기	J	토혈	I	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	토혈	I	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	토혈	I	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	토혈	I	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	토혈	I	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	토혈	I	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
소화기	J	토혈	I	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	토혈	I	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	토혈	I	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	토혈	I	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
소화기	J	토혈	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	토혈	I	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
소화기	J	토혈	I	출혈성 질환(중등도나 정도의 출혈)	BB	3
소화기	J	토혈	I	두드러진 또는 많은 토혈	CA	2
소화기	J	토혈	I	커피찌꺼기 모양 구토/흑색변	CB	3
소화기	J	토혈	I	적은양, 정상 활력징후	CC	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	혈변/흑색변	J	쇼크	AB	1
소화기	J	혈변/흑색변	J	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	혈변/흑색변	J	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
소화기	J	혈변/흑색변	J	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	많은양의 흑색변 또는 직장출혈	CA	2
소화기	J	혈변/흑색변	J	중등도 양의 흑색변 또는 직장출혈	CB	3
소화기	J	혈변/흑색변	J	적은양의 직장출혈	CC	4
소화기	J	황달	K	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	황달	K	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	황달	K	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	황달	K	열,면역억제 상태	AD	2
소화기	J	황달	K	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
소화기	J	황달	K	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	황달	K	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	황달	K	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
소화기	J	황달	K	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
소화기	J	황달	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	황달	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	황달	K	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	황달	K	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	황달	K	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	황달	K	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	황달	K	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	황달	K	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	황달	K	황달, 건강해보임	CA	5
소화기	J	땀꼭질	L	열,면역억제 상태	AA	2
소화기	J	땀꼭질	L	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AB	2

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	탈꼭질	L	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AC	2
소화기	J	탈꼭질	L	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AD	3
소화기	J	탈꼭질	L	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AE	3
소화기	J	탈꼭질	L	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AF	4
소화기	J	탈꼭질	L	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	탈꼭질	L	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	탈꼭질	L	급성 경증 통증(<4)	BC	4
소화기	J	탈꼭질	L	탈꼭질, 만성, 힘들어 보이지 않음	CA	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	복부종괴/팽만	M	쇼크	AB	1
소화기	J	복부종괴/팽만	M	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	복부종괴/팽만	M	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	급성 경증 통증(<4)	BD	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 경증 통증(<4)	BF	5
소화기	J	복부종괴/팽만	M	지속적인 구토	CA	3
소화기	J	복부종괴/팽만	M	만성 복부 종괴/팽만, 건강해 보임	CB	5
소화기	J	항문/직장외상	N	중등도 호흡곤란	AA	2
소화기	J	항문/직장외상	N	혈역학적 장애	AB	2
소화기	J	항문/직장외상	N	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
소화기	J	항문/직장외상	N	열,면역억제 상태	AD	2
소화기	J	항문/직장외상	N	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
소화기	J	항문/직장외상	N	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
소화기	J	항문/직장외상	N	경증 호흡곤란	AG	3
소화기	J	항문/직장외상	N	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	항문/직장외상	N	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
소화기	J	항문/직장외상	N	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
소화기	J	항문/직장외상	N	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	항문/직장외상	N	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
소화기	J	항문/직장외상	N	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
소화기	J	항문/직장외상	N	급성 경증 통증(<4)	BE	4
소화기	J	항문/직장외상	N	항문/직장 외상	CA	5
소화기	J	구강/식도 이물질	O	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	구강/식도 이물질	O	쇼크	AB	1
소화기	J	구강/식도 이물질	O	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	구강/식도 이물질	O	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	<3 개월, TK36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	3-36 개월, TK32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	구강/식도 이물질	O	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	구강/식도 이물질	O	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
소화기	J	구강/식도 이물질	O	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	구강/식도 이물질	O	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
소화기	J	구강/식도 이물질	O	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
소화기	J	구강/식도 이물질	O	급성 경증 통증(<4)	BC	4
소화기	J	구강/식도 이물질	O	침흘림 또는 협착음	CA	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	목원소리와 언어장애	CB	2
소화기	J	구강/식도 이물질	O	지속적인 구토	CC	3
소화기	J	구강/식도 이물질	O	연하곤란이나 호흡곤란 없음	CD	4
소화기	J	신생아 연하곤란	P	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	신생아 연하곤란	P	쇼크	AB	1
소화기	J	신생아 연하곤란	P	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	신생아 연하곤란	P	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	<3 개월, TK36℃ 또는 ≥38℃	AH	2

2단계		3단계		4단계		등급
소화기	J	신생아 연하곤란	P	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	경증 호흡곤란	AJ	3
소화기	J	신생아 연하곤란	P	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
소화기	J	신생아 연하곤란	P	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
소화기	J	신생아 연하곤란	P	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
소화기	J	신생아 연하곤란	P	구강 섭취 거부	CA	2
소화기	J	신생아 연하곤란	P	감소된 구강섭취	CB	3
소화기	J	신생아 황달	Q	중증 호흡곤란	AA	1
소화기	J	신생아 황달	Q	쇼크	AB	1
소화기	J	신생아 황달	Q	무의식(GCS 3-8)	AC	1
소화기	J	신생아 황달	Q	중등도 호흡곤란	AD	2
소화기	J	신생아 황달	Q	혈역학적 장애	AE	2
소화기	J	신생아 황달	Q	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
소화기	J	신생아 황달	Q	열,면역억제 상태	AG	2
소화기	J	신생아 황달	Q	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
소화기	J	신생아 황달	Q	영아≤7일	CA	2
소화기	J	신생아 황달	Q	영아 > 7일	CB	3
산부인과	K	생리문제	A	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	생리문제	A	쇼크	AB	1
산부인과	K	생리문제	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	생리문제	A	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	생리문제	A	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	생리문제	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	생리문제	A	열,면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	생리문제	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
산부인과	K	생리문제	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
산부인과	K	생리문제	A	경증 호흡곤란	AJ	3
산부인과	K	생리문제	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
산부인과	K	생리문제	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
산부인과	K	생리문제	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
산부인과	K	생리문제	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
산부인과	K	생리문제	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	생리문제	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	생리문제	A	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	생리문제	A	생리문제	CA	4
산부인과	K	질내 이물질	B	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	질내 이물질	B	쇼크	AB	1
산부인과	K	질내 이물질	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	질내 이물질	B	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	질내 이물질	B	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	질내 이물질	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	질내 이물질	B	열,면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	질내 이물질	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
산부인과	K	질내 이물질	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
산부인과	K	질내 이물질	B	경증 호흡곤란	AJ	3
산부인과	K	질내 이물질	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
산부인과	K	질내 이물질	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
산부인과	K	질내 이물질	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
산부인과	K	질내 이물질	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	질내 이물질	B	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	질내 이물질	B	질내 이물질	CA	5
산부인과	K	질 분비물	C	중등도 호흡곤란	AA	2
산부인과	K	질 분비물	C	혈역학적 장애	AB	2
산부인과	K	질 분비물	C	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
산부인과	K	질 분비물	C	열,면역억제 상태	AD	2
산부인과	K	질 분비물	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
산부인과	K	질 분비물	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
산부인과	K	질 분비물	C	경증 호흡곤란	AG	3
산부인과	K	질 분비물	C	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
산부인과	K	질 분비물	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
산부인과	K	질 분비물	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
산부인과	K	질 분비물	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
산부인과	K	질 분비물	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질 분비물	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	질 분비물	C	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	질 분비물	C	경증인 경우	CA	5
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	질통증/가려움	D	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	질통증/가려움	D	질 통증, 가려움	CA	4
산부인과	K	질출혈	E	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	질출혈	E	쇼크	AB	1
산부인과	K	질출혈	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	질출혈	E	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	질출혈	E	혈역학적 장애	AE	2

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	질출혈	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	질출혈	E	열,면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	질출혈	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
산부인과	K	질출혈	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
산부인과	K	질출혈	E	경증 호흡곤란	AJ	3
산부인과	K	질출혈	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
산부인과	K	질출혈	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
산부인과	K	질출혈	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
산부인과	K	질출혈	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
산부인과	K	질출혈	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	질출혈	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	질출혈	E	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
산부인과	K	질출혈	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
산부인과	K	질출혈	E	급성 경증 통증(<4)	BE	4
산부인과	K	질출혈	E	임신과 관련된 다량의 질출혈	CA	1
산부인과	K	질출혈	E	임신과 관련없는 다량의 질출혈	CB	2
산부인과	K	질출혈	E	질출혈(정상활력징후)	CC	3
산부인과	K	질출혈	E	질출혈(경증/점상출혈)	CD	4
산부인과	K	음순부종	F	중등도 호흡곤란	AA	2
산부인과	K	음순부종	F	혈역학적 장애	AB	2
산부인과	K	음순부종	F	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
산부인과	K	음순부종	F	열,면역억제 상태	AD	2
산부인과	K	음순부종	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
산부인과	K	음순부종	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
산부인과	K	음순부종	F	경증 호흡곤란	AG	3
산부인과	K	음순부종	F	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
산부인과	K	음순부종	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
산부인과	K	음순부종	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
산부인과	K	음순부종	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
산부인과	K	음순부종	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	음순부종	F	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	음순부종	F	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	음순부종	F	음순부종	CA	5
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	쇼크	AB	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	열,면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	경증 호흡곤란	AH	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	정상 범위 밖의 활력징후	AI	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	고위험성 사고기전	BC	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	급성 경증 통증(<4)	BF	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	임신과 관련되거나 다른 원인으로 인한 다량의 질출혈	CA	2
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	질출혈(활력징후 정상)	CB	3
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	질출혈 (경증/점상출혈)	CC	4
산부인과	K	20주 미만의 임신	G	임신주수<20주	CD	4
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	중증호흡곤란	AA	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	쇼크	AB	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	열,면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	경증 호흡곤란	AH	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	정상 범위 밖의 활력징후	AI	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	고위험성 사고기전	BC	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	급성 경증 통증(<4)	BF	4
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	태아의 일부분이 보이거나 탯줄 탈출	CA	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신말기의 질출혈	CB	1
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	분만(자궁수축<2분)	CC	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 태동없음/태아심음의 소실	CD	2

2단계		3단계		4단계		등급
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 두통± 부종± 출혈성 질관± 통증±고혈압	CE	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	출산직후	CF	2
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	분만(자궁수축>2분)	CG	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주, 양수 누출 가능성	CH	3
산부인과	K	20주 이상의 임신	H	임신주수>20주	CI	4
산부인과	K	성폭행	I	중증 호흡곤란	AA	1
산부인과	K	성폭행	I	쇼크	AB	1
산부인과	K	성폭행	I	무의식(GCS 3-8)	AC	1
산부인과	K	성폭행	I	중등도 호흡곤란	AD	2
산부인과	K	성폭행	I	혈역학적 장애	AE	2
산부인과	K	성폭행	I	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
산부인과	K	성폭행	I	열,면역억제 상태	AG	2
산부인과	K	성폭행	I	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
산부인과	K	성폭행	I	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
산부인과	K	성폭행	I	경증 호흡곤란	AJ	3
산부인과	K	성폭행	I	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
산부인과	K	성폭행	I	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
산부인과	K	성폭행	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
산부인과	K	성폭행	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
산부인과	K	성폭행	I	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
산부인과	K	성폭행	I	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
산부인과	K	성폭행	I	급성 경증 통증(<4)	BC	4
산부인과	K	성폭행	I	<2시간	CA	2
산부인과	K	성폭행	I	≥ 2시간 또는 <12시간	CB	3
산부인과	K	성폭행	I	≥ 12시간, 손상없음	CC	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	열,면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	옆구리 통증	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	혈뇨	B	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	혈뇨	B	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	열,면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 중증 통증(8-10)	BD	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
비뇨기과	L	혈뇨	B	급성 경증 통증(<4)	BF	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 중등도 통증(4-7)	BG	4
비뇨기과	L	혈뇨	B	만성 경증 통증(<4)	BH	5
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	경증 호흡곤란	AA	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AC	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AD	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AE	4
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	만성 중증 통증(8-10)	BC	3

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	생식기의 분비물/환부	C	생식기의 분비물/피부병변	CA	5
비뇨기과	L	음경부종	D	중등도 호흡곤란	AA	2
비뇨기과	L	음경부종	D	혈역학적 장애	AB	2
비뇨기과	L	음경부종	D	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
비뇨기과	L	음경부종	D	열,면역억제 상태	AD	2
비뇨기과	L	음경부종	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
비뇨기과	L	음경부종	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
비뇨기과	L	음경부종	D	경증 호흡곤란	AG	3
비뇨기과	L	음경부종	D	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
비뇨기과	L	음경부종	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
비뇨기과	L	음경부종	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
비뇨기과	L	음경부종	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	음경부종	D	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	음경부종	D	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	음경부종	D	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	음경부종	D	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	음경부종	D	지속발기증	CA	2
비뇨기과	L	음경부종	D	감돈포경(안으로 말린 음경꺼풀, 정복되지 않음)	CB	2
비뇨기과	L	음경부종	D	음경 부종, 만성 경증 통증(<4)	CC	5
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	중등도 호흡곤란	AA	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	혈역학적 장애	AB	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	열,면역억제 상태	AD	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	경증 호흡곤란	AG	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	만성 중증 통증(8-10)	BC	3

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	고환통증/부종	E	고환 통증/부종	CA	5
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	열,면역억제 상태	AA	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AB	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AC	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AD	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AE	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AF	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	만성 경증	BF	4
비뇨기과	L	소변 배출장애	F	소변배출장애	CA	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	중등도 호흡곤란	AA	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	혈역학적 장애	AB	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	열,면역억제 상태	AD	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	경증 호흡곤란	AG	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	급성 경증 통증(<4)	BD	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성 경증 통증(<4)	BF	5
비뇨기과	L	요로감염 증상	G	만성, 경증 요로감염 증상호소/증상	CA	5
비뇨기과	L	핍뇨증	H	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	핍뇨증	H	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	핍뇨증	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	핍뇨증	H	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	열,면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	핍뇨증	H	급성 경증 통증(<4)	BC	4
비뇨기과	L	핍뇨증	H	핍뇨증	CA	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	다뇨증	I	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	혈역학적 장애	AE	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	열,면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
비뇨기과	L	다뇨증	I	급성 경증 통증(<4)	BC	4
비뇨기과	L	다뇨증	I	다뇨증	CA	4
비뇨기과	L	생식기 외상	J	중증 호흡곤란	AA	1
비뇨기과	L	생식기 외상	J	쇼크	AB	1
비뇨기과	L	생식기 외상	J	무의식(GCS 3-8)	AC	1
비뇨기과	L	생식기 외상	J	중등도 호흡곤란	AD	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	혈역학적 장애	AE	2

2단계		3단계		4단계		등급
비뇨기과	L	생식기 외상	J	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	열,면역억제 상태	AG	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	경증 호흡곤란	AJ	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
비뇨기과	L	생식기 외상	J	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
비뇨기과	L	생식기 외상	J	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	만성 중증 통증(8-10)	BD	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	급성 경증 통증(<4)	BF	4
비뇨기과	L	생식기 외상	J	성폭행, 안정되어 있음	CA	3
비뇨기과	L	생식기 외상	J	생식기의 외상, 통증 없음	CB	5
정형외과	M	요통	A	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	요통	A	쇼크	AB	1
정형외과	M	요통	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	요통	A	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	요통	A	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	요통	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	요통	A	열,면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	요통	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
정형외과	M	요통	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	요통	A	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	요통	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	요통	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
정형외과	M	요통	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	요통	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
정형외과	M	요통	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
정형외과	M	요통	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
정형외과	M	요통	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
정형외과	M	요통	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
정형외과	M	요통	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
정형외과	M	요통	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	요통	A	신경학적 손상± 장과 방광의 문제	CA	2
정형외과	M	요통	A	요통	CB	5
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	쇼크	AB	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	열,면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	고위험성 사고기전	BC	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	급성 경증 통증(<4)	BF	4
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	신경학적 손상± 장과 방광의 문제	CA	2
정형외과	M	외상성 등/척추 손상	B	외상성 등/척추 손상, 경증 중심성 통증	CB	4
정형외과	M	절단	C	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	절단	C	쇼크	AB	1
정형외과	M	절단	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	절단	C	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	절단	C	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	절단	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	절단	C	열,면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	절단	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
정형외과	M	절단	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	절단	C	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	절단	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	절단	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
정형외과	M	절단	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	절단	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	절단	C	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
정형외과	M	절단	C	고위험성 사고기전	BC	2
정형외과	M	절단	C	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	절단	C	사지의 외상성 절단	CA	1
정형외과	M	절단	C	손가락의 외상성 절단	CB	2
정형외과	M	절단	C	절단	CC	3
정형외과	M	상지 통증	D	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	상지 통증	D	쇼크	AB	1
정형외과	M	상지 통증	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	상지 통증	D	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	상지 통증	D	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	상지 통증	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	상지 통증	D	열,면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	상지 통증	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
정형외과	M	상지 통증	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	상지 통증	D	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	상지 통증	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	상지 통증	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
정형외과	M	상지 통증	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	상지 통증	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
정형외과	M	상지 통증	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	상지 통증	D	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
정형외과	M	상지 통증	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
정형외과	M	상지 통증	D	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
정형외과	M	상지 통증	D	만성 중증 통증(8-10)	BE	3
정형외과	M	상지 통증	D	급성 경증 통증(<4)	BF	4
정형외과	M	상지 통증	D	만성 중등도 통증(4-7)	BG	4
정형외과	M	상지 통증	D	만성 경증 통증(<4)	BH	5
정형외과	M	상지 통증	D	신경혈관장애	CA	2
정형외과	M	상지 통증	D	석고붕대가 딱 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CB	3
정형외과	M	상지 통증	D	석고붕대가 딱 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CC	4
정형외과	M	하지 통증	E	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	하지 통증	E	쇼크	AB	1
정형외과	M	하지 통증	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	하지 통증	E	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	하지 통증	E	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	하지 통증	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	하지 통증	E	열,면역억제 상태	AG	2

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	하지 통증	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
정형외과	M	하지 통증	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	하지 통증	E	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	하지 통증	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	하지 통증	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
정형외과	M	하지 통증	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	하지 통증	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
정형외과	M	하지 통증	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	하지 통증	E	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
정형외과	M	하지 통증	E	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
정형외과	M	하지 통증	E	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
정형외과	M	하지 통증	E	만성 중증 통증(8-10)	BE	3
정형외과	M	하지 통증	E	급성 경증 통증(<4)	BF	4
정형외과	M	하지 통증	E	만성 중등도 통증(4-7)	BG	4
정형외과	M	하지 통증	E	만성 경증 통증(<4)	BH	5
정형외과	M	하지 통증	E	석고붕대가 딱 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CA	3
정형외과	M	하지 통증	E	석고붕대가 딱 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CB	4
정형외과	M	상지 손상	F	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	상지 손상	F	쇼크	AB	1
정형외과	M	상지 손상	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	상지 손상	F	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	상지 손상	F	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	상지 손상	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	상지 손상	F	열,면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	상지 손상	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
정형외과	M	상지 손상	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	상지 손상	F	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	상지 손상	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	상지 손상	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
정형외과	M	상지 손상	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	상지 손상	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
정형외과	M	상지 손상	F	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	상지 손상	F	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
정형외과	M	상지 손상	F	고위험성 사고기전	BC	2
정형외과	M	상지 손상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	상지 손상	F	급성 중등도 통증(4-7)	BE	3

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	상지 손상	F	만성 중증 통증(8-10)	BF	3
정형외과	M	상지 손상	F	급성 경증 통증(<4)	BG	4
정형외과	M	상지 손상	F	만성 중등도 통증(4-7)	BH	4
정형외과	M	상지 손상	F	만성 경증 통증(<4)	BI	5
정형외과	M	상지 손상	F	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	CA	2
정형외과	M	상지 손상	F	명백한 변형	CB	3
정형외과	M	상지 손상	F	석고붕대가 딱 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CC	3
정형외과	M	상지 손상	F	석고붕대가 딱 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CD	4
정형외과	M	하지 손상	G	중증 호흡곤란	AA	1
정형외과	M	하지 손상	G	쇼크	AB	1
정형외과	M	하지 손상	G	무의식(GCS 3-8)	AC	1
정형외과	M	하지 손상	G	중등도 호흡곤란	AD	2
정형외과	M	하지 손상	G	혈역학적 장애	AE	2
정형외과	M	하지 손상	G	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
정형외과	M	하지 손상	G	열,면역억제 상태	AG	2
정형외과	M	하지 손상	G	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
정형외과	M	하지 손상	G	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
정형외과	M	하지 손상	G	경증 호흡곤란	AJ	3
정형외과	M	하지 손상	G	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
정형외과	M	하지 손상	G	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
정형외과	M	하지 손상	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
정형외과	M	하지 손상	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
정형외과	M	하지 손상	G	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	하지 손상	G	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
정형외과	M	하지 손상	G	고위험성 사고기전	BC	2
정형외과	M	하지 손상	G	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	하지 손상	G	급성 중등도 통증(4-7)	BE	3
정형외과	M	하지 손상	G	만성 중증 통증(8-10)	BF	3
정형외과	M	하지 손상	G	급성 경증 통증(<4)	BG	4
정형외과	M	하지 손상	G	만성 중등도 통증(4-7)	BH	4
정형외과	M	하지 손상	G	만성 경증 통증(<4)	BI	5
정형외과	M	하지 손상	G	개방성 골절 또는 신경혈관 장애	CA	2
정형외과	M	하지 손상	G	명백한 변형	CB	3
정형외과	M	하지 손상	G	석고붕대가 딱 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CC	3
정형외과	M	하지 손상	G	석고붕대가 딱 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CD	4
정형외과	M	관절 부종	H	중등도 호흡곤란	AA	2
정형외과	M	관절 부종	H	혈역학적 장애	AB	2

2단계		3단계		4단계		등급
정형외과	M	관절 부종	H	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
정형외과	M	관절 부종	H	열,면역억제 상태	AD	2
정형외과	M	관절 부종	H	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
정형외과	M	관절 부종	H	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
정형외과	M	관절 부종	H	경증 호흡곤란	AG	3
정형외과	M	관절 부종	H	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
정형외과	M	관절 부종	H	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
정형외과	M	관절 부종	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
정형외과	M	관절 부종	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
정형외과	M	관절 부종	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
정형외과	M	관절 부종	H	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
정형외과	M	관절 부종	H	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
정형외과	M	관절 부종	H	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
정형외과	M	관절 부종	H	급성 경증 통증(<4)	BE	4
정형외과	M	관절 부종	H	만성 중등도 통증(4-7)	BF	4
정형외과	M	관절 부종	H	만성 경증 통증(<4)	BG	5
정형외과	M	관절 부종	H	관절 부종	CA	5
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
정형외과	M	석고붕대 확인	I	급성 경증 통증(<4)	BC	4
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대가 딱 끼어 아프고, 신경혈관 장애를 동반함	CA	3
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대가 딱 끼어 아프지만, 신경혈관 장애는 없음	CB	4
정형외과	M	석고붕대 확인	I	석고붕대 체크 또는 석고붕대 교환	CC	5
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	열,면역억제 상태	AA	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AB	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AC	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AD	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AE	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AF	4
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행 시 통증	J	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행	J	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3

2단계		3단계		4단계		등급
		시 통증				
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행시 통증	J	만성 중증 통증(8-10)	BE	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행시 통증	J	급성 경증 통증(<4)	BF	4
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행시 통증	J	만성 중등도 통증(4-7)	BG	4
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행시 통증	J	만성 경증 통증(<4)	BH	5
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행시 통증	J	열을 동반한 다리를 저는 문제	CA	3
정형외과	M	소아의 보행장애/ 보행시 통증	J	보행에 어려움 호소	CB	4
외상	N	중증외상-관통상	A	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	중증외상-관통상	A	쇼크	AB	1
외상	N	중증외상-관통상	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	중증외상-관통상	A	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	중증외상-관통상	A	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	중증외상-관통상	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	중증외상-관통상	A	열,면역억제 상태	AG	2
외상	N	중증외상-관통상	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
외상	N	중증외상-관통상	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
외상	N	중증외상-관통상	A	경증 호흡곤란	AJ	3
외상	N	중증외상-관통상	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
외상	N	중증외상-관통상	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
외상	N	중증외상-관통상	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
외상	N	중증외상-관통상	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	중증외상-관통상	A	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	중증외상-관통상	A	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	중증외상-관통상	A	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
외상	N	중증외상-관통상	A	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	중증외상-관통상	A	신경학적 손상과 동반된 척추 골절, 두부의 관통상	CA	1
외상	N	중증외상-관통상	A	사지의 신경혈관 장애	CB	2
외상	N	중증외상-관통상	A	머리,가슴,복부의 관통상	CC	2
외상	N	중증외상-관통상	A	중증외상-관통상	CD	3
외상	N	중증외상-둔상	B	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	중증외상-둔상	B	쇼크	AB	1
외상	N	중증외상-둔상	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	중증외상-둔상	B	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	중증외상-둔상	B	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	중증외상-둔상	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	중증외상-둔상	B	열,면역억제 상태	AG	2

2단계		3단계		4단계		등급
외상	N	중증외상-둔상	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
외상	N	중증외상-둔상	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
외상	N	중증외상-둔상	B	경증 호흡곤란	AJ	3
외상	N	중증외상-둔상	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
외상	N	중증외상-둔상	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
외상	N	중증외상-둔상	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
외상	N	중증외상-둔상	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	중증외상-둔상	B	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	중증외상-둔상	B	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
외상	N	중증외상-둔상	B	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	중증외상-둔상	B	급성 경증 통증(<4)	BF	4
외상	N	중증외상-둔상	B	신경학적 손상과 동반된 척추 골절	CA	1
외상	N	중증외상-둔상	B	사지의 신경혈관 장애	CB	2
외상	N	중증외상-둔상	B	장기간의 척추고정	CC	3
외상	N	중증외상-둔상	B	중증외상-둔상	CD	4
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	쇼크	AB	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	열,면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 흉부외상-관통상	C	단독 흉부외상-관통상	CA	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	쇼크	AB	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	열,면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2

2단계		3단계		4단계		등급
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	경증 호흡곤란	AJ	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	급성 경증 통증(<4)	BF	4
외상	N	단독 흉부외상-둔상	D	단독 흉부외상-둔상(건강해보임)	CA	4
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	쇼크	AB	1
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	열,면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 복부외상-관통상	E	단독 복부외상 - 관통상	CA	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	중증 호흡곤란	AA	1
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	쇼크	AB	1
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	중등도 호흡곤란	AD	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	혈역학적 장애	AE	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	열,면역억제 상태	AG	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	경증 호흡곤란	AJ	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해	AN	4

2단계		3단계		4단계		등급
				보입		
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	고위험성 사고기전	BC	2
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BE	3
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	급성 경증 통증(<4)	BF	4
외상	N	단독 복부외상-둔상	F	단독복부외상 - 둔상	CA	4
환경손상	O	동상/냉 손상	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
환경손상	O	동상/냉 손상	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
환경손상	O	동상/냉 손상	A	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
환경손상	O	동상/냉 손상	A	급성 경증 통증(<4)	BD	4
환경손상	O	동상/냉 손상	A	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
환경손상	O	동상/냉 손상	A	만성 경증 통증(<4)	BF	5
환경손상	O	동상/냉 손상	A	사지 말단부위에 맥박이 없고 차가움	CA	2
환경손상	O	동상/냉 손상	A	피부가 창백함	CB	3
환경손상	O	동상/냉 손상	A	동상/냉손상	CC	5
환경손상	O	유해물질흡입	B	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	O	유해물질흡입	B	쇼크	AB	1
환경손상	O	유해물질흡입	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	O	유해물질흡입	B	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	O	유해물질흡입	B	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	O	유해물질흡입	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	O	유해물질흡입	B	경증 호흡곤란	AG	3
환경손상	O	유해물질흡입	B	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
환경손상	O	유해물질흡입	B	연기 흡입, 또는 다른 물질 흡입, 호흡 곤란 없음	CA	3
환경손상	O	유해물질흡입	B	유해물질을 흡입한 후 상당한 시간이 지남, 무증상	CB	4
환경손상	O	전기손상	C	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	O	전기손상	C	쇼크	AB	1
환경손상	O	전기손상	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	O	전기손상	C	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	O	전기손상	C	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	O	전기손상	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	O	전기손상	C	경증 호흡곤란	AG	3
환경손상	O	전기손상	C	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
환경손상	O	전기손상	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
환경손상	O	전기손상	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
환경손상	O	전기손상	C	명백한 피부손상	CA	2
환경손상	O	전기손상	C	명백한 피부손상 없음	CB	3
환경손상	O	화학물질 노출	D	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
환경손상	O	화학물질 노출	D	쇼크	AB	1
환경손상	O	화학물질 노출	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	O	화학물질 노출	D	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	O	화학물질 노출	D	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	O	화학물질 노출	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	O	화학물질 노출	D	체표면적 25% 이상의 중증 화상	CA	1
환경손상	O	화학물질 노출	D	손과 발, 살고랑 부위(Groin), 얼굴의 중증 화상	CB	2
환경손상	O	화학물질 노출	D	눈에 이물질이 튄 후 증상 있음	CC	2
환경손상	O	저체온증	E	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	O	저체온증	E	쇼크	AB	1
환경손상	O	저체온증	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	O	저체온증	E	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	O	저체온증	E	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	O	저체온증	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	O	저체온증	E	열,면역억제 상태	AG	2
환경손상	O	저체온증	E	<3 개월, T<35℃	AH	2
환경손상	O	저체온증	E	>3개월,T<32℃	AI	2
환경손상	O	저체온증	E	경증 호흡곤란	AJ	3
환경손상	O	저체온증	E	체온 이외에 정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
환경손상	O	저체온증	E	>3개월,T<32-35℃	AL	3
환경손상	O	저체온증	E	저체온증,중심체온<32℃	CA	2
환경손상	O	저체온증	E	중심체온 32-35℃	CB	3
환경손상	O	저체온증	E	동상없음, 정상 활력징후	CC	4
환경손상	O	익수	F	중증 호흡곤란	AA	1
환경손상	O	익수	F	쇼크	AB	1
환경손상	O	익수	F	무의식(GCS 3-8)	AC	1
환경손상	O	익수	F	중등도 호흡곤란	AD	2
환경손상	O	익수	F	혈역학적 장애	AE	2
환경손상	O	익수	F	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
환경손상	O	익수	F	열,면역억제 상태	AG	2
환경손상	O	익수	F	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
환경손상	O	익수	F	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
환경손상	O	익수	F	경증 호흡곤란	AJ	3
환경손상	O	익수	F	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
환경손상	O	익수	F	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
환경손상	O	익수	F	>36 개월, T32-35℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
환경손상	O	익수	F	저체온증,중심체온<32℃	CA	2
환경손상	O	익수	F	중심체온 32-35℃	CB	3
피부	P	물림(Bite)	A	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	물림(Bite)	A	쇼크	AB	1

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	물림(Bite)	A	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	물림(Bite)	A	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	물림(Bite)	A	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	물림(Bite)	A	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	물림(Bite)	A	열,면역억제 상태	AG	2
피부	P	물림(Bite)	A	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
피부	P	물림(Bite)	A	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	물림(Bite)	A	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	물림(Bite)	A	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	물림(Bite)	A	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
피부	P	물림(Bite)	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	물림(Bite)	A	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	물림(Bite)	A	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	물림(Bite)	A	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	물림(Bite)	A	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	물림(Bite)	A	중증 알레르기반응의 기왕력	CA	2
피부	P	물림(Bite)	A	경증물림	CB	5
피부	P	쏘임(Sting)	B	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	쇼크	AB	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	쏘임(Sting)	B	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	열,면역억제 상태	AG	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	쏘임(Sting)	B	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	쏘임(Sting)	B	중증 알레르기반응의 기왕력	CA	2
피부	P	쏘임(Sting)	B	쏘임	CB	5
피부	P	찰과상	C	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	찰과상	C	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	찰과상	C	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	찰과상	C	찰과상±출혈 동반	CA	4
피부	P	열상/천공	D	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	열상/천공	D	쇼크	AB	1
피부	P	열상/천공	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	열상/천공	D	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	열상/천공	D	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	열상/천공	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	열상/천공	D	열,면역억제 상태	AG	2
피부	P	열상/천공	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
피부	P	열상/천공	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	열상/천공	D	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	열상/천공	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	열상/천공	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
피부	P	열상/천공	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	열상/천공	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	열상/천공	D	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
피부	P	열상/천공	D	급성 중증 통증(8-10)	BB	2
피부	P	열상/천공	D	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BC	3
피부	P	열상/천공	D	급성 중등도 통증(4-7)	BD	3
피부	P	열상/천공	D	급성 경증 통증(<4)	BE	4
피부	P	열상/천공	D	신경혈관 장애를 동반한 복합창상	CA	2
피부	P	열상/천공	D	지속되고 있는 출혈	CB	3
피부	P	열상/천공	D	지혈되었거나 조절되고 있는 출혈	CC	4
피부	P	열상/천공	D	봉합 필요	CD	4
피부	P	열상/천공	D	봉합 필요 없음	CE	5
피부	P	화상	E	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	화상	E	쇼크	AB	1
피부	P	화상	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	화상	E	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	화상	E	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	화상	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	화상	E	열,면역억제 상태	AG	2
피부	P	화상	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
피부	P	화상	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	화상	E	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	화상	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	화상	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	화상	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	화상	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	화상	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	화상	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	화상	E	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	화상	E	체표면적 25% 이상의 화상	CA	1
피부	P	화상	E	손, 발, 얼굴, 회음부 부위의 2도 이상의 화상	CB	2
피부	P	화상	E	체표면적5-25%의 화상	CC	2
피부	P	화상	E	체표면적의 <5%인 3도 이상의 화상; 혹은 <10%의 2도 화상	CD	3
피부	P	화상	E	통증없는 경증 화상	CE	5
피부	P	혈액과 체액 노출	F	고위험 노출: 주사침 찔림, 속이 빈 주사바늘, 에이즈 혹은 간염 바이러스 보균자이거나 가능성 있음, 알고 있는 저위험 감염원이 아니면 고위험으로 간주	CA	2
피부	P	혈액과 체액 노출	F	저위험 노출: 속이 빈 주사바늘이 아닌 경우 또는 저위험 감염원에서 액체가 튼	CB	3
피부	P	이물질, 피부	G	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	이물질, 피부	G	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
피부	P	이물질, 피부	G	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AC	3
피부	P	이물질, 피부	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AD	3
피부	P	이물질, 피부	G	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AE	4
피부	P	이물질, 피부	G	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3
피부	P	이물질, 피부	G	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	이물질, 피부	G	이물질, 피부	CA	5
피부	P	상처 확인	H	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	상처 확인	H	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
피부	P	상처 확인	H	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AC	3
피부	P	상처 확인	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AD	3
피부	P	상처 확인	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AE	4
피부	P	상처 확인	H	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3
피부	P	상처 확인	H	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	상처 확인	H	상처확인	CA	5
피부	P	스टे이플/봉합사제거	I	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	스टे이플/봉합사제거	I	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
피부	P	스टे이플/봉합사제거	I	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AC	3
피부	P	스टे이플/봉합사제거	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AD	3
피부	P	스टे이플/봉합사제거	I	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AE	4

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	스테이플/봉합사제거	I	스테이플/봉합사제거	CA	5
피부	P	발진	J	중등도 호흡곤란	AA	2
피부	P	발진	J	혈역학적 장애	AB	2
피부	P	발진	J	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
피부	P	발진	J	열,면역억제 상태	AD	2
피부	P	발진	J	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
피부	P	발진	J	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
피부	P	발진	J	경증 호흡곤란	AG	3
피부	P	발진	J	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
피부	P	발진	J	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
피부	P	발진	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
피부	P	발진	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
피부	P	발진	J	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	발진	J	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	발진	J	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	발진	J	얼굴 연조직염, 안와주위부 포함	CA	2
피부	P	발진	J	자반성 또는 점 발진, 아파보임	CB	2
피부	P	발진	J	국소성 연조직염	CC	4
피부	P	발진	J	국소성 발진	CD	5
피부	P	유방의 발적/압통	K	중등도 호흡곤란	AA	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	혈역학적 장애	AB	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	열,면역억제 상태	AD	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	경증 호흡곤란	AG	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	유방의 발적/압통	K	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	유방의 발적/압통	K	유방의 발적/압통	CA	5
피부	P	국소성 부종/발적	L	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	국소성 부종/발적	L	쇼크	AB	1

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	국소성 부종/발적	L	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	국소성 부종/발적	L	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	열,면역억제 상태	AG	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	국소성 부종/발적	L	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	국소성 부종/발적	L	얼굴 연조직염, 특히, 안와주위	CA	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	자반성 또는 점 발진, 아파보임	CB	2
피부	P	국소성 부종/발적	L	국소성 연조직염	CC	4
피부	P	국소성 부종/발적	L	국소성 발진	CD	5
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	중등도 호흡곤란	AA	2
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	혈역학적 장애	AB	2
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	열,면역억제 상태	AD	2
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	경증 호흡곤란	AG	3
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	급성 경증 통증(<4)	BC	4
피부	P	혹,돌기,굳은살	M	혹,돌기,굳은살	CA	5
피부	P	감염 가능성 확인	N	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3
피부	P	감염 가능성 확인	N	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	감염 가능성 확인	N	감염 가능성 확인	CA	5
피부	P	청색증	O	중증 호흡곤란	AA	1

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	청색증	O	쇼크	AB	1
피부	P	청색증	O	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	청색증	O	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	청색증	O	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	청색증	O	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	청색증	O	열,면역억제 상태	AG	2
피부	P	청색증	O	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
피부	P	청색증	O	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	청색증	O	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	청색증	O	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	청색증	O	3-36개월, T32-35℃ 또는 38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
피부	P	청색증	O	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	청색증	O	청색증	CA	3
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	중증 호흡곤란	AA	1
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	쇼크	AB	1
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	무의식(GCS 3-8)	AC	1
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	중등도 호흡곤란	AD	2
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	혈역학적 장애	AE	2
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	열,면역억제 상태	AG	2
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	경증 호흡곤란	AJ	3
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
피부	P	외상없이 저절로 멍듦	P	외상없이 저절로 멍듦	CA	3
피부	P	소양증	Q	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3
피부	P	소양증	Q	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	소양증	Q	소양증	CA	5
피부	P	기타피부상태	R	경증 호흡곤란	AA	3
피부	P	기타피부상태	R	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
피부	P	기타피부상태	R	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AC	3
피부	P	기타피부상태	R	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AD	3
피부	P	기타피부상태	R	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AE	4
피부	P	기타피부상태	R	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3

2단계		3단계		4단계		등급
피부	P	기타피부상태	R	급성 경증 통증(<4)	BB	4
피부	P	기타피부상태	R	기타피부상태	CA	5
일반	Q	전염성 질환에 노출	A	전염성 질환에 노출	CA	5
일반	Q	열	B	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	열	B	쇼크	AB	1
일반	Q	열	B	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	열	B	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	열	B	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	열	B	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	열	B	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	열	B	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	열	B	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	열	B	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	열	B	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	열	B	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	열	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	열	B	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	열	B	점 발진	CA	2
일반	Q	열	B	열	CB	4
일반	Q	고혈당	C	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	고혈당	C	쇼크	AB	1
일반	Q	고혈당	C	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	고혈당	C	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	고혈당	C	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	고혈당	C	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	고혈당	C	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	고혈당	C	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	고혈당	C	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	고혈당	C	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	고혈당	C	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	고혈당	C	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	고혈당	C	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	고혈당	C	>324mg/dl, 증상 있음, 호흡곤란,탈수,쇠약	CA	2
일반	Q	고혈당	C	>324mg/dl, 무증상	CB	3
일반	Q	저혈당	D	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	저혈당	D	쇼크	AB	1
일반	Q	저혈당	D	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	저혈당	D	중등도 호흡곤란	AD	2

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	저혈당	D	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	저혈당	D	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	저혈당	D	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	저혈당	D	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	저혈당	D	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	저혈당	D	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	저혈당	D	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	저혈당	D	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	저혈당	D	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	저혈당	D	<54mg/dl 증상 있음, 의식혼미, 식은땀, 행동변화, 발작, 1살 미만 영아	CA	2
일반	Q	저혈당	D	<54mg/dl 무증상	CB	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	쇼크	AB	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
일반	Q	전문 진료를 위해서	E	급성 경증 통증(<4)	BD	4

2단계		3단계		4단계		등급
		의뢰된 환자				
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	만성 경증 통증(<4)	BF	5
일반	Q	전문 진료를 위해서 의뢰된 환자	E	전문진료를위해서의뢰된환자	CA	5
일반	Q	드레싱교체	F	경증 호흡곤란	AA	3
일반	Q	드레싱교체	F	정상 범위 밖의 활력징후	AB	3
일반	Q	드레싱교체	F	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AC	3
일반	Q	드레싱교체	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AD	3
일반	Q	드레싱교체	F	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AE	4
일반	Q	드레싱교체	F	급성 중등도 통증(4-7)	BA	3
일반	Q	드레싱교체	F	급성 경증 통증(<4)	BB	4
일반	Q	드레싱교체	F	드레싱교체	CA	5
일반	Q	영상학적 검사	G	영상학적 검사	CA	5
일반	Q	의료장비문제	H	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	의료장비문제	H	쇼크	AB	1
일반	Q	의료장비문제	H	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	의료장비문제	H	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	의료장비문제	H	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	의료장비문제	H	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	의료장비문제	H	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	의료장비문제	H	<3 개월, TK36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	의료장비문제	H	3-36 개월, TK32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	의료장비문제	H	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	의료장비문제	H	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	의료장비문제	H	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	의료장비문제	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	의료장비문제	H	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	의료장비문제	H	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	의료장비문제	H	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
일반	Q	의료장비문제	H	급성 경증 통증(<4)	BC	4
일반	Q	의료장비문제	H	의료장비문제 ‘증상없음’ 또는 ‘불편함이 없음’	CA	4
일반	Q	처방전/투약문의	I	처방전/투약문의	CA	5
일반	Q	반지제거	J	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AA	3
일반	Q	반지제거	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AB	3
일반	Q	반지제거	J	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AC	4

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	반지제거	J	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	반지제거	J	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
일반	Q	반지제거	J	급성 경증 통증(<4)	BC	4
일반	Q	반지제거	J	신경혈관장애	CA	2
일반	Q	반지제거	J	반지제거	CB	4
일반	Q	비정상 검사수치	K	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	쇼크	AB	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	비정상 검사수치	K	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	비정상 검사수치	K	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
일반	Q	비정상 검사수치	K	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	정상 활력징후, 위험 수치(critical value)	CA	3
일반	Q	비정상 검사수치	K	정상 활력징후, 위험하지 않은 검사치	CB	5
일반	Q	창백함/빈혈	L	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	창백함/빈혈	L	쇼크	AB	1
일반	Q	창백함/빈혈	L	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	창백함/빈혈	L	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	창백함/빈혈	L	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
일반	Q	창백함/빈혈	L	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
일반	Q	창백함/빈혈	L	창백함/빈혈	CA	4
일반	Q	수술 후 합병증	M	중등도 호흡곤란	AA	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	혈역학적 장애	AB	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	열,면역억제 상태	AD	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AF	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	경증 호흡곤란	AG	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	3-36 개월, T<32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AI	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AJ	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AK	4
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BB	2
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 중등도 통증(4-7)	BC	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BD	3
일반	Q	수술 후 합병증	M	급성 경증 통증(<4)	BE	4
일반	Q	수술 후 합병증	M	정상 활력징후, 통증없음, 정기적인 체크	CA	4
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	쇼크	AB	1
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	<3 개월, T<36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	3-36 개월, T<32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3

2단계		3단계		4단계		등급
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	달랠 수 없는 영아 - 비정상 활력징후	CA	2
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	달랠 수 없는 영아 - 활력징후는 안정적인	CB	3
일반	Q	영아의 달랠 수 없는 울음	N	보체지만 달랠 수 있는 영아	CC	4
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	쇼크	AB	1
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	중등도 호흡곤란	AD	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	혈역학적 장애	AE	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	의식변화(GCS 9-13)	AF	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	열,면역억제 상태	AG	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	<3 개월, TK36℃ 또는 ≥38℃	AH	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	3-36 개월, TK32℃ 또는 ≥38℃, 그리고 아파보임	AI	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	경증 호흡곤란	AJ	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	정상 범위 밖의 활력징후	AK	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	3-36 개월, TK32-35℃ 또는 ≥38℃ 그리고 건강해 보임	AL	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	>36 개월, T≥38℃, 그리고 아파 보임	AM	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	>36 개월, T≥38℃, 그리고 건강해 보임	AN	4
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	출혈성 질환(생명이나 사지에 위급한 출혈)	BA	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	출혈성 질환(중등도나 경증의 출혈)	BB	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	빠른악화 가능성 또는 즉시 치료의 필요성이 있는 상태이거나 확인할 수 있는 프로토콜이 필요한 상황일 때	CA	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	유전 대사 질환으로 인한 구토/설사, 1형 당뇨병 또는 부신 기능 부전증	CB	2
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	치료를 필요한지 보호자가 확인하고 싶은 경우	CC	3
일반	Q	소아의 선천적 문제	O	잠재적인 문제가 있는 선천적 질환을 가진 안정적인 상태의 소아	CD	4
일반	Q	경증 호소	P	중등도 호흡곤란	AA	2
일반	Q	경증 호소	P	혈역학적 장애	AB	2
일반	Q	경증 호소	P	의식변화(GCS 9-13)	AC	2
일반	Q	경증 호소	P	열,면역억제 상태	AD	2
일반	Q	경증 호소	P	<3 개월, TK36℃ 또는 ≥38℃	AE	2
일반	Q	경증 호소	P	3-36 개월, TK32℃ 또는 ≥38℃,	AF	2

2단계		3단계		4단계		등급
				그리고 아파보임		
일반	Q	경증 호소	P	경증 호흡곤란	AG	3
일반	Q	경증 호소	P	정상 범위 밖의 활력징후	AH	3
일반	Q	경증 호소	P	3-36 개월, $T < 32-35^{\circ}\text{C}$ 또는 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 그리고 건강해 보임	AI	3
일반	Q	경증 호소	P	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 아파 보임	AJ	3
일반	Q	경증 호소	P	>36 개월, $T \geq 38^{\circ}\text{C}$, 그리고 건강해 보임	AK	4
일반	Q	경증 호소	P	급성 중증 통증(8-10)	BA	2
일반	Q	경증 호소	P	급성 중등도 통증(4-7)	BB	3
일반	Q	경증 호소	P	만성 중증 통증(8-10)	BC	3
일반	Q	경증 호소	P	급성 경증 통증(<4)	BD	4
일반	Q	경증 호소	P	만성 중등도 통증(4-7)	BE	4
일반	Q	경증 호소	P	만성 경증 통증(<4)	BF	5
일반	Q	경증 호소	P	경증 증상호소, 비특이적	CA	5
일반	Q	3개월 미만의 영아	Q	중증 호흡곤란	AA	1
일반	Q	3개월 미만의 영아	Q	쇼크	AB	1
일반	Q	3개월 미만의 영아	Q	무의식(GCS 3-8)	AC	1
일반	Q	3개월 미만의 영아	Q	신생아	CA	2