

Probablemente ya sabes que cuando estás embarazada, compartes todo con tu bebé. Eso significa que cuando te vacunas, no solo te proteges a ti misma, sino que también le das a tu bebé una protección temprana.

### **Vacuna contra la Tos Ferina (TDAP)**

La tos ferina (o pertussis) puede ser grave para cualquiera, pero para tu recién nacido, puede ser mortal. Hasta 20 bebés mueren cada año en Estados Unidos debido a la tos ferina. Alrededor de la mitad de los bebés menores de 1 año que contraen tos ferina necesitan tratamiento en el hospital. Cuanto más joven sea el bebé cuando contraiga la tos ferina, más probable es que necesite ser tratado en un hospital. Puede ser difícil para ti saber si tu bebé tiene tos ferina porque muchos bebés con esta enfermedad no tosen en absoluto. En cambio, puede hacer que dejen de respirar y se pongan azules. Cuando te vacunas contra la tos ferina durante tu embarazo, tu cuerpo creará anticuerpos protectores y pasará algunos de ellos a tu bebé antes del nacimiento. Estos anticuerpos proporcionarán a tu bebé una protección temprana y a corto plazo contra la tos ferina. La TDAP se administra al entrar en el tercer trimestre.

Aprende más en [www.cdc.gov/pertussis/pregnant/](http://www.cdc.gov/pertussis/pregnant/).

### **Vacuna contra la Gripe**

Los cambios en tus funciones inmunológicas, cardíacas y pulmonares durante el embarazo te hacen más propensa a enfermarte gravemente de la gripe. Contraer la gripe también aumenta tus posibilidades de problemas graves para tu bebé en desarrollo, incluyendo parto prematuro y nacimiento. Vacúnate contra la gripe si estás embarazada durante la temporada de gripe, es la mejor manera de protegerte a ti y a tu bebé durante varios meses después del nacimiento de complicaciones relacionadas con la gripe.

Las temporadas de gripe varían en su momento de una temporada a otra, pero los CDC recomiendan vacunarse a finales de octubre, si es posible. Este momento ayuda a protegerte antes de que la actividad de la gripe comience a aumentar.

Encuentra más sobre cómo prevenir la gripe visitando [www.cdc.gov/flu/](http://www.cdc.gov/flu/).

### **¿Debo vacunarme contra el VRS durante el embarazo?**

ACOG recomienda la vacuna Pfizer RSV si estás de 32 a 36 semanas de embarazo de septiembre a enero. La vacuna crea anticuerpos que pasan a tu feto. Esto significa que el bebé tendrá algunos anticuerpos para protegerse del VRS durante los primeros 6 meses después del nacimiento.

El VRS, o virus sincitial respiratorio, es un virus que se propaga en otoño e invierno. El VRS puede ser peligroso para bebés y niños pequeños. Es la principal causa de hospitalización entre los bebés en Estados Unidos.

Hay varias vacunas contra el VRS aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA). La única vacuna contra el VRS aprobada por la FDA para su uso en el embarazo es la fabricada por Pfizer, llamada Abrysvo.

Puedes recibir la vacuna Pfizer RSV al mismo tiempo que otras vacunas recomendadas durante el embarazo. Los efectos secundarios comunes de la vacuna contra el VRS incluyen dolor en el brazo, dolor de cabeza, dolor muscular y náuseas, similares a otros efectos secundarios de las vacunas. Los efectos secundarios son normales y no son motivo de preocupación.

Encuentra más en <https://www.cdc.gov/vaccines/vpd/rsv/public/pregnancy.html>.