KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V BRNĚ

JEŘÁBKOVA 4, 602 00 BRNO

TISKOVÁ ZPRÁVA

ze dne 10. července 2020

Klíšťová encefalitida v Jihomoravském kraji:

K dnešnímu dni je v Jihomoravském kraji zaznamenáno 21 případů.

Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se jedná o vzestup - v r. 2019 to bylo 18 případů. Velká aktivita klíšťat v těchto dnech souvisí s příznivým počasím pro aktivitu klíšťat a přináší aktuálně **zvýšené riziko nákazy.**

Aktivitu klíšťat lze sledovat na webu ČHMÚ:

http://portal.chmi.cz/predpovedi/predpovedi-pocasi/ceska-republika/predpoved-aktivity-klistat


Typickými lokalitami pro výskyt klíšťat jsou okraje lesů, mýtiny, lesy s podrostem, travnaté porosty na okrajích lesů, okolí vodních toků, potoků a tůní, ale i městské parky a zahrady s neposečenou trávou.

Klíšťová encefalitida je onemocnění, kterému lze snadno předcházet ochrannými opatřeními včetně očkování, přesto v posledních letech evidujeme nárůst počtu případů.

Případy boreliózy evidujeme rovněž, dochází k mírnému nárůstu v porovnáním se stejným obdobím předchozích roků. K dnešnímu dni je zaznamenáno 118 případů, v r. 2019 to bylo 100 případů. Borelióza není tak citlivá na sezonalitu a korelaci s aktivitou klíšťat. Je to onemocnění s dlouhou inkubační dobou, které je hlášeno celoročně včetně zimy tak, jak se objeví příznaky a poté, co se onemocnění laboratorně potvrdí. Aktuální situace se tak může odrazit až za několik měsíců.

Klíšťová encefalitida je na rozdíl od boreliózy onemocnění mnohem závažnější, bez možnosti specifické cílené léčby, proto je nutné upozorňovat na její riziko mnohem důrazněji.

Klíšťová encefalitida v Jihomoravském kraji, 2014-2019:



Postup při odstraňování klíšťat:

Co nejdříve po návratu je doporučeno zkontrolovat kůži celého těla a pokud nalezneme klíšťata, ihned je odstraníme. Správný postup je následující:

- před manipulací s klíštětem nejprve místo dezinfikujeme (nejlépe přípravkem s obsahem jodu), tím klíště usmrtíme
- klíštěte se nikdy nedotýkáme rukama
- k odstranění klíštěte je nejvhodnější použít pinzetu, kterou uchopíme klíště těsně při kůži a opatrně vikláme, dokud se klíště nepustí
- s klíštětem manipulujeme velmi jemně, nemačkáme, dbáme o to, abychom klíště nepřetrhli
- > po vyjmutí klíštěte místo opět dezinfikujeme jodovým preparátem

Zarudnutí, které se v místě přisátí tvoří bezprostředně, představuje jen dráždivou reakci a během 1-3 dnů vymizí. Pokud se naopak za několik dnů po odstranění klíštěte objeví červená skvrna, případně se v době od 1 do 2 týdnů po odstranění klíšťat dostaví chřipkové příznaky spojené s bolestí hlavy a celkovou únavou, je nutné vyhledat lékaře.

Přehled situace COVID-19 v Jihomoravském kraji:

Počet osob indikovaných k vyšetření (od 29. 1. dosud): 11233

Počet pozitivních kumulativně: 685

Kumulativní incidence za celé období: 57,5/100 000 obyvatel Počet vyléčených (po prodělaném onemocnění): 605 (88 %)

Počet úmrtí: 20 (průměrný věk 76 let)

Počet aktuálně hospitalizovaných: 8 osob s lehkým a středním průběhem Počet aktuálně pozitivních: 80 osob, nemocnost 6,7/100 0000 obyvatel

Kumulativní počet případů dle okresů

ramalativiii peeet pripada die ektesa	
Okres	Počet případů
Brno-město	289
Brno-venkov	85
Blansko	38
Břeclav	132
Hodonín	16
Vyškov	43
Znojmo	82
JMK celkem	685

Kumulativní počet případů dle věku

Věková skupina	Počet případů
0-4	9
5-9	6
10-14	24
15-19	25
20-24	39
25-34	138
35-44	108
45-54	124
55-64	91
65-74	60
75 a starší	61
JMK celkem	685

Počet nových případů za posledních 7 dnů: 25 případů

Počet nových případů hlášených za posledních 24 hodin: 5 případů

Aktuální případy jsou z okruhu těsných a dlouhodobých rodinných kontaktů, nadále s maximem výskytu ve věkové skupině 25-34 let.

V naprosté většině se jedná o případy se zcela minimálními příznaky, bez jakýchkoliv závažnějších problémů a komplikací.

Počet osob po prodělaném onemocnění dle okresů

Okres	Počet vyléčených
Brno-město	250
Brno-venkov	69
Blansko	37
Břeclav	115
Hodonín	15
Vyškov	40
Znojmo	79
JMK celkem	605

Pozn.: Od 8.7. se u pacientů s onemocněním COVID-19 s lehkým nebo asymptomatickým průběhem neprovádí kontrolní PCR vyšetření. Pacient je po uplynutí 14denní izolace, pokud minimálně 4 dny nemá žádné klinické potíže, považován za neinfekčního.

 $\frac{https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Ukon\%C4\%8Den\%C3\%AD-izolace-pacientas-benefit (a.g., a.g., b.g., b.g$

V Brně, 10. července 2020 MUDr. Radka Boháčová