
실습 보고서

[실습번호: 09]

[실습제목: 6 장 벡터(6.6 절) 및 7 장 선형변환]



과 목 명	선형대수
교 수 명	이 선 우
학 번	20237107
작 성 자	하 태 영
제 출 일	2025.11.14

한림대학교

가. 6 장 연습문제 풀기

(1) 연습문제 풀기

6장 연습문제

$$\begin{aligned} 59. \quad f(x_1, x_2) &= 3x_1^2 + 2x_2^2 - 4x_1x_2 & \nabla f &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2} \right) = (6x_1 - 4x_2, 4x_2 - 4x_1) \\ & & \frac{\partial f}{\partial x_1} &= 6x_1 - 4x_2, \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 4x_2 - 4x_1 & \nabla f(1, 2) &= \underset{6-8}{(6 \cdot 1 - 4 \cdot 2)} \underset{8-4}{(4 \cdot 2 - 4 \cdot 1)} = \boxed{(-2, 4)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 60. \quad F(x_1, x_2) &= \begin{pmatrix} 3x_1^2 + 2x_1x_2 \\ 4x_1x_2^2 + x_2^3 \end{pmatrix} & J_F &= \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}, \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}, \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x_1 + 2x_2 & 4x_2^2 \\ 2x_1 & 8x_1x_2 + 2x_2^2 \end{pmatrix} \\ & \frac{\partial f_1}{\partial x_1} = 6x_1 + 2x_2, \quad \frac{\partial f_1}{\partial x_2} = 4x_2^2 & J_F(1, 2) &= \begin{pmatrix} 6 \cdot 1 + 2 \cdot 2 & 4 \cdot 2^2 \\ 2 \cdot 1 & 8 \cdot 1 \cdot 2 + 2 \cdot 2^2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 10 & 16 \\ 2 & 20 \end{pmatrix}} \\ & \frac{\partial f_2}{\partial x_1} = 2x_1, \quad \frac{\partial f_2}{\partial x_2} = 8x_1x_2 + 2x_2^2 \end{aligned}$$

가. 6 장 연습문제 풀기

(2)프로그래밍 실습

2번

```
1 import numpy as np
2
3 def angle2vectors(v, w): # 두 벡터의 사잇각 계산
4     vnorm = np.linalg.norm(v)
5     wnorm = np.linalg.norm(w)
6     vwdot = np.dot(v.T, w)
7     angle = np.arctan(vwdot/(vnorm*wnorm))*360/np.pi
8     return angle
9
10 def orthProj(u, x):
11     xu_dot = np.dot(x.T, u)
12     uu_dot = np.dot(u.T, u)
13     projux = (xu_dot/uu_dot)*u
14     return projux
15
16 A = np.array([[2], [4], [1]])
17 B = np.array([[1], [-1], [3]])
18 angle = angle2vectors(A, B)
19 projAB = orthProj(B, A)
20 print("A와 B의 사잇각 : ", angle)
21 print("A의 B 위로의 정사영 : \n", projAB)
```

```
A와 B의 사잇각 : [[7.52871961]]
A의 B 위로의 정사영 :
[[ 0.09090909]
 [-0.09090909]
 [ 0.27272727]]
```

3번

```
1 import numpy as np
2
3 def tripleProduct(u, v, w): # 스칼라 삼중적  $u * (v \times w)$  계산
4     M = np.zeros((3,3))
5     M[0:] = u
6     M[1:] = v
7     M[2:] = w
8     val = np.linalg.det(M) # 행벡터가 u, v, w인 행렬의 행렬식 계산
9     return val
10
11 A = np.array([1, 2, 3])
12 B = np.array([0, 5, 2])
13 C = np.array([2, 2, 4])
14 D = np.array([2, 4, 1])
15 u = B-A
16 v = C-A
17 w = D-A
18 val = tripleProduct(u, v, w)
19 print("부피 : ", np.absolute(val))
```

부피 : 9.0000000000000002

4번

```
1 import numpy as np
2
3 def distPt2Pl(A, W, P):
4     num = np.dot((P-A).T, W)
5     deno = np.linalg.norm(W)
6     val = np.absolute(num)/deno
7     return val
8
9 A = np.array([2, 3, 4])
10 W = np.array([1, 2, 3])
11 P = np.array([0, 1, 2])
12 print("거리 : ", distPt2Pl(A, W, P))
```

거리 : 3.2071349029490928

나 7 장 연습문제 풀기

(1) 연습문제 풀기

7장 연습문제

$$3.(a) \mathcal{L}(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 2x_2)$$

$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ 사상, } u = (u_1, u_2), v = (v_1, v_2)$$

1. 가산성 확인

$$u + v = (u_1 + v_1, u_2 + v_2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(u+v) &= \mathcal{L}(u_1 + v_1, u_2 + v_2) = ((u_1 + v_1) + (u_2 + v_2), 2(u_2 + v_2)) \\ &= (u_1 + u_2 + v_1 + v_2, 2u_2 + 2v_2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(u) + \mathcal{L}(v) &= (u_1 + u_2, 2u_2) + (v_1 + v_2, 2v_2) \\ &= (u_1 + u_2 + v_1 + v_2, 2u_2 + 2v_2) \end{aligned}$$

$$\mathcal{L}(u+v) = \mathcal{L}(u) + \mathcal{L}(v) \quad \text{가산성 성립}$$

2. 동차성 확인

$$cu = (cu_1, cu_2)$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(cu) &= \mathcal{L}(cu_1, cu_2) = (cu_1 + cu_2, 2(cu_2)) \\ &= (c(u_1 + u_2), c(2u_2)) \end{aligned}$$

$$c\mathcal{L}(u) = c(u_1 + u_2, 2u_2) = (c(u_1 + u_2), c(2u_2))$$

$$\mathcal{L}(cu) = c\mathcal{L}(u) \quad \text{동차성 성립}$$

$\therefore \mathcal{L}$ 은 선형변환입니다.

$$3.(c) \mathcal{L}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2, x_2 + 3x_3, x_1 + 4x_3)$$

$\mathcal{L}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ 사상, 각 성분이 입력 변수들의 상수항이 없는 원자 결합으로 표현되므로, 선형변환입니다.

$$\mathcal{L} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$\therefore \mathcal{L}$ 은 선형변환입니다.

3.(e)

$$\mathcal{L} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{L}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ 사상}$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 에 의한 곱셈 $\mathcal{L}(x) = Ax$ 형태로 주어집니다.

$$\mathcal{L}(u+v) = A(u+v) = Au + Av = \mathcal{L}(u) + \mathcal{L}(v) \quad (\text{가산성})$$

$$\mathcal{L}(cu) = A(cu) = c(Au) = c(\mathcal{L}u) \quad (\text{동차성})$$

$\therefore \mathcal{L}$ 은 선형변환입니다.

7장 선형대수

5. (a) $\mathcal{L}(x_1, x_2) = (-3x_1, 2x_2)$

$\rightarrow A(\mathcal{L}(e_1), \mathcal{L}(e_2)) \rightarrow e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{L}(1, 0) = (-3 \cdot 1, 2 \cdot 0) = (-3, 0) \quad \mathcal{L}(0, 1) = (-3 \cdot 0, 2 \cdot 1) = (0, 2)$$

(b) $\mathcal{L}(x_1, x_2) = (x_1 + x_2, 3x_1 - 4x_2)$

$\rightarrow A(\mathcal{L}(e_1), \mathcal{L}(e_2)) \rightarrow e_1 = (1, 0), e_2 = (0, 1)$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{L}(1, 0) = (1 + 0, 3 \cdot 1 - 4 \cdot 0) = (1, 3)$$

$$\mathcal{L}(0, 1) = (0 + 1, 3 \cdot 0 - 4 \cdot 1) = (1, -4)$$

(c) $\mathcal{L}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 - 4x_3)$

$\rightarrow A(\mathcal{L}(e_1), \mathcal{L}(e_2), \mathcal{L}(e_3)) \rightarrow e_1 = (1, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0), e_3 = (0, 0, 1)$

$$\mathcal{L}(1, 0, 0) = (2 \cdot 1 + 0 + 0, 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0) = (2, 0)$$

$$\mathcal{L}(0, 1, 0) = (2 \cdot 0 + 1 + 0, 2 \cdot 1 - 4 \cdot 0) = (1, 2)$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{L}(0, 0, 1) = (2 \cdot 0 + 0 + 0, 2 \cdot 0 - 4 \cdot 1) = (0, -4)$$

(d) $\mathcal{L}(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 + x_3, 2x_2 - 4x_3)$

$$\mathcal{L}(1, 0, 0) = (2 \cdot 1 + 0 + 0, 2 \cdot 0 - 4 \cdot 0) = (2, 0)$$

$$\mathcal{L}(0, 1, 0) = (2 \cdot 0 + 1 + 0, 2 \cdot 1 - 4 \cdot 0) = (1, 2)$$

$$\therefore A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{L}(0, 0, 1) = (2 \cdot 0 + 0 + 1, 2 \cdot 0 - 4 \cdot 1) = (1, -4)$$

6. (a) $\mathcal{L}(1, 2, 3) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = (2+4+3, 3+2-3) = (9, 2)$

$2 \times 3 \quad 3 \times 1$

(b) $\mathcal{L}(1, 0, -1) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = (2+0-1, 3+0-1) = (1, 2)$

(c) $\mathcal{L}(2, 3, 1) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} = (4+6+1, 6+3-1) = (11, 8)$

(d) $\mathcal{L}(x, y, z) \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (2x+2y+z, 3x+y-z)$

7장 연습문제

$$7(a) \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - 4x_2 \\ x_1 - x_3 \\ -x_2 + 3x_3 \end{pmatrix} \quad (b) \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 - 2x_2 \\ x_1 + 4x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

$$10. \quad t_x = 2, \quad t_y = 3 \rightarrow T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

13. 회전변환

$$\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

반사변환

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$19. \quad L_1(x, y) = (2x + y, x + 2y), \quad L_2(x, y) = (-x + y, 2y)$$

$$u_1 = 2x + y, \quad u_2 = x + 2y \quad L_2(u_1, u_2) = (-u_1 + u_2, 2u_2)$$

$$L_2(L_1(x, y)) = (-2x - y + x + 2y, 2x + 4y)$$

$$\therefore L_2 \circ L_1(x, y) = (-x + y, 2x + 4y)$$

$$20. \quad L_2 \circ L_1 \text{의 표준행렬} = BA$$

$$BA = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+2 & -3+8 \\ 6+1 & 9+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 7 & 13 \end{pmatrix}$$

7장 연속문제

21. (a) 1. $\exists \gamma$ (norm)

$$\|a_1\|^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

$$\|a_2\|^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{4}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

$$\|a_3\|^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9} + \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{9}{9} = 1$$

2. 직교성

$$a_1 \cdot a_2 = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} + -\frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9} - \frac{4}{9} + \frac{2}{9} = 0$$

$$a_2 \cdot a_3 = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + \frac{2}{3} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{4}{9}$$

직업이 성립하기 안으로 느부터 성형자가 아입니다.

(b) 1.371

$$\|a_1\| = 1^2 + 0^2 + 0^2 = 1$$

$$\|a_2\| = 0^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 + \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

$$\|a_3\| = 0^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} = 1$$

2. 작성성

$$a_1 \cdot a_2 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + 0 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = 0$$

$$a_2 \cdot a_3 = 0 \cdot 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

$$a_3 \cdot a_1 = 0 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 0 = 0$$

$\therefore A$ 는 $\frac{2}{3}$ 로 $\frac{1}{3}$ 로 실패할 확률이 있다.

7장 연습문제

29. (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 4 \\ -3 & -6 & -12 & -12 \\ 3 & 4 & 8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 4 \\ 0 & -2 & -4 & -12 \\ 3 & 4 & 8 & 0 \end{pmatrix} \therefore \text{rank}(A) = 2$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -2 & -4 & -6 \\ 2 & 3 & 5 \\ 3 & 4 & 7 \\ 4 & 5 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ -2 & -6 & -9 \\ 3 & 4 & 7 \\ 4 & 5 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \\ -7 & -8 & -12 \\ 4 & 5 & 9 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 4R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - 3R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\therefore \text{rank}(A) = 2$

30. (a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 2 & 4 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & -5 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ -2 & -4 & -2 & -10 \\ 2 & 4 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & -10 \\ 2 & 4 & -3 & 0 \\ -3 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & -10 \\ 0 & 7 & 5 & 14 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_4 \leftarrow -\frac{1}{2}R_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -5 & -10 \\ 0 & 7 & 5 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + 5R_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 7 & 5 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \leftrightarrow R_4 \\ R_2 \leftrightarrow R_3 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 7 & 5 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{rank}(A) = 3 \\ \text{nullity}(A) = 4 - 3 = 1 \\ \therefore \text{rank}(A) = 3, \text{nullity}(A) = 1 \end{matrix}$

(b) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 6 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \text{rank}(A) = 2 \\ \text{nullity}(A) = 3 - 2 = 1 \\ \therefore \text{rank}(A) = 2, \text{nullity}(A) = 1 \end{matrix}$

7장 연습문제

31 (a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -6 \\ -2 & -4 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 행렬의 가: $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\text{rank}(A)=1$

$x_1 + 2x_2 - 6x_3 = 0 \rightarrow x_1 = -2x_2 + 6x_3$, x_1 : 기본 변수, x_2, x_3 : 자유 변수 $x_2 = s, x_3 = t$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2s+6t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow$ 영공간의 가: $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$, $\text{nullity}(A)=2$

\therefore 행렬의 가: $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$, 영공간의 가: $\left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

(b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 행렬의 가: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\text{rank}(A)=1$

$x_1 + x_2 = 0 \rightarrow x_1 = -x_2$, x_1 : 기본 변수, x_2, x_3 : 자유 변수 $x_2 = s, x_3 = t$

$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -s \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 영공간의 가: $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

\therefore 행렬의 가: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 영공간의 가: $\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

33 (a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 3 & 0 & -9 & -6 \\ -3 & 1 & 6 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ -3 & 1 & 6 & 3 \\ 2 & -2 & -1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 + 3R_1, R_4 \leftarrow R_4 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & -2 & 5 & 3 \end{array} \right)$

$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_4 \leftarrow R_4 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow -R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & -3 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + 3R_3, R_4 \leftarrow R_4 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 3R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) x_1=7, x_2=7, x_3=3$

\therefore 해는 유일하다.

7장 연습문제

$$33(b) \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ -2 & 4 & -6 & 12 \\ 2 & -5 & 6 & -5 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & -3 & -4 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \\ 0 & -1 & 0 & 7 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \leftarrow -\frac{1}{3}R_2 \\ R_3 \leftarrow -R_3 \end{array}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -7 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & -20 \\ 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 3R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -17 \\ 0 & 1 & 0 & -7 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \quad x_1 = -17, x_2 = -7, x_3 = -1 \quad \therefore x \text{는 유일하다.}$$

$$36. A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{열공간 기저: } \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

x_1 : 기본 변수, x_2, x_3 : 자유 변수 $x_2 = s, x_3 = t$


$$2x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \rightarrow 2x_1 = 2x_2 - 4x_3 \rightarrow x_1 = x_2 - 2x_3$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} s - 2t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \text{열공간 기저: } \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$


7장 연습문제

36.

행렬 가: $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c \\ c \end{pmatrix} \rightarrow \begin{matrix} x=2c \\ y=c \end{matrix} \rightarrow x=2y \rightarrow y=\frac{1}{2}x$



행렬 가: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ $\begin{matrix} 1 & 1 & 0 \\ x & -2 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{matrix} \rightarrow x-y+2z=0$ $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$



7장 연습문제

$$41. \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 1 \\ -4 & -4 & 2 & -2 \\ 4 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & -3 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & -3 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow -\frac{1}{4}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 4 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 6 & -3 & 4 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 6R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{array} \right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow \frac{1}{3}R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & -1 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 + R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{array} \right) \xrightarrow{R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{6} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{4}{3} \end{array} \right)$$

∴ 행방정식의 해는 유일하다