
실습 보고서

[실습번호: 07]

[실습제목: 6 장 벡터/vector 파트 2]



과 목 명	선형대수
교 수 명	이 선 우
학 번	20237107
작 성 자	하 태 영
제 출 일	2025.11.05

한림대학교

가. 6 장 연습문제 풀기

12. $x_1 a_1 + x_2 a_2 = b$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ 2 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_2 = a \\ 3x_1 + 4x_2 = 2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 0 \times (-3) & x_1 + 2(-1) = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 = 2 & x_1 = 2 \\ + -3x_1 - 6x_2 = 0 & \\ \hline -2x_2 = 2 & x_2 = -1 \end{cases} \therefore x_1 = 2, x_2 = -1$$

$$2x_1 - x_2 = a \rightarrow 2 \cdot 2 - (-1) = a \quad \therefore a = 5$$

13. $a_1 x_1 + a_2 x_2 = b$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} -5 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix} x_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ h \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x_1 - 5x_2 = 3 \\ 3x_1 - 8x_2 = -5 \\ -x_1 + 2x_2 = h \end{cases}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 15x_2 = 9 \\ -3x_1 - 8x_2 = -5 \\ \hline -7x_2 = 14 \end{cases} \quad \begin{cases} x_2 = -2 \\ x_1 = -7 \end{cases}$$

$$-x_1 + 2x_2 = h \rightarrow 7 + 2 \cdot (-2) = h \rightarrow h = 3$$

14. $v_1 x_1 + v_2 x_2 = y$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix} x_2 = \begin{pmatrix} h \\ -3 \\ -5 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 = h \\ x_2 = -3 \\ -2x_1 + 7x_2 = -5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = h \rightarrow -8 - 2 \cdot (-3) = h \rightarrow h = -2 \\ -2x_1 + 7x_2 = -5 \rightarrow -2x_1 + 7 \cdot (-3) = -5 \rightarrow -2x_1 - 21 = -5 \rightarrow -2x_1 = 16 \rightarrow x_1 = -8 \end{cases} \therefore x_1 = -8, x_2 = -3$$

15. (a) $\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 = 2 \\ -2x_1 = -3 \\ 8x_1 - 9x_2 = 8 \end{cases}$ (b) $\begin{cases} 3x_1 + 7x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$

16. (a) $x_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 3 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ -8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

19. 다음 문장이 참인지 거짓인지 판별하고, 거짓인 경우 그 이유를 설명하라.

(a) 노름이 0인 벡터는 영벡터뿐이다. 참

(b) 정방행렬 A 의 열벡터가 선형독립이면, A 의 역행렬이 항상 존재한다. 참

(c) 두 벡터를 내적한 결과가 0이라면, 두 벡터는 서로 직교한다. 참

(d) 사잇각이 θ 인 두 개의 단위 벡터를 내적하면 $\cos\theta$ 값을 얻는다. 참

(e) 내적공간에 있는 두 벡터의 내적은 항상 0 이상의 값을 갖는다. 거짓

→ 두 벡터의 내적 값은 음수일 수 있다. $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} : u \cdot v = 1 \cdot (-1) + 0 \cdot 0 = -1$

$$20 \text{ (a)} \quad \|v\| = \sqrt{3^2 + (-4)^2} = \sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5 \quad \therefore \|v\| = 5 \quad u = \frac{v}{\|v\|} = \begin{pmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

$$(b) \quad \|v\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{9+16+25} = \sqrt{50} \quad u = \frac{v}{\|v\|} = \begin{pmatrix} \frac{3}{\sqrt{50}} \\ \frac{4}{\sqrt{50}} \\ \frac{5}{\sqrt{50}} \end{pmatrix}$$

$$21. \text{ (a)} \quad \|v\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$$

$$(b) \quad \|v\| = \sqrt{4^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{16+4+9} = \sqrt{29}$$

$$22. \text{ (a)} \quad u \cdot v = (2 \cdot 1) + (-2 \cdot 3) = 2 - 6 = -4$$

$$(b) \quad u \cdot v = (2 \cdot (-2)) + ((-2) \cdot 1) + (3 \cdot 3) = -4 - 2 + 9 = 3$$

$$(c) \quad u \cdot v = (1 \cdot 2) + (2 \cdot (-3)) + ((-1) \cdot 1) + (3 \cdot 4) = 2 - 6 - 1 + 12 = 7$$

$$(d) \quad u \cdot v = (2 \cdot (-1)) + ((-2) \cdot 1) + (4 \cdot 1) = -2 - 2 + 4 = 0$$

$$23 \text{ (a)} \quad u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos\theta$$

$$u \cdot v = (2 \cdot 1) + (4 \cdot (-1)) + (1 \cdot 3) = 2 - 4 + 3 = 1$$

$$\|u\| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 1^2} = \sqrt{4+16+1} = \sqrt{21}$$

$$\|v\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{1+1+9} = \sqrt{11}$$

$$1 = \sqrt{21} \cdot \sqrt{11} \cos\theta$$

$$1 = \sqrt{231} \cos\theta$$

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{231}}$$