Tutorial Tambahan GC-Ex 0.24

Klasifikasi keyakinan sumber daya · Topografi & orthofoto resolusi tinggi
Data latihan simulasi baru: array vein en-echelon ber-*ore shoot*

Pelengkap *Tutorial Modelling & Estimasi* dan *Tutorial Block Model*. Semua gambar di dokumen ini dihitung langsung dari model dan berkas data latihan, bukan tangkapan layar, sehingga angkanya selalu cocok dengan data yang Anda terima. Disusun otomatis 31 October 2026.

Isi


1. Data latihan simulasi baru — model geologi & daftar berkas
2. Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan
3. Klasifikasi keyakinan sumber daya di Reporting BM
4. Topografi & orthofoto resolusi sangat tinggi
5. Bagian tutorial lama yang perlu disesuaikan

1. Data latihan simulasi baru

Data latihan GC-Ex diganti dengan endapan yang jauh lebih besar dan jauh lebih taat kaidah geologi. Tujuannya satu: setiap latihan punya **jawaban yang diketahui**, sehingga Anda bisa menilai apakah hasil pemodelan Anda sendiri sudah masuk akal.

Endapannya emas **epitermal *low-sulphidation*** yang dikontrol zona geser. Semuanya fiktif — dihitung dari rumus di `make_sim_data.py`, tanpa nama perusahaan, Hole ID, koordinat, atau hasil lab proyek nyata.

Unsur model	Isi
Zona geser	strike 45°, dip 70° ke azimuth 135° (bidang acuan)
Array vein	4 lensa sigmoidal **en-echelon** *right-stepping* + 1 splay hangingwall
Ore shoot	**pitch 55°** dari garis strike, di dalam bidang vein, sama untuk semua lensa
Zona dilatan	tebal **dan** kadar maksimum dikontrol satu struktur yang sama (*jog* dilatan = ore shoot) — inilah sebabnya GT punya satu arah kemenerusan terbaik
Zonasi vertikal	paleo-muka air tanah RL 250 m: zona didih bertekstur *colloform* (bonanza), Ag/Au naik ke atas, Pb–Zn naik ke bawah, As penanda vein
Pelapukan	tudung tercuci 15 m teratas, selimut pengayaan supergen tepat di atas muka air tanah, zona transisi, batuan segar
Sesar	pasca-mineralisasi, strike 110°, dip 65°, offset dip-slip 12 m, panjang ±150 m — hanya memotong lensa 2 & 3, lensa 1 & 4 tetap utuh
Efek nugget	5% sampel Au dilonjakkan (emas kasar) → variogram Au bernugget tinggi, Ag jauh lebih jinak



Gambar 1. Jejak permukaan keempat lensa vein, collar bor, dan sesar pasca-mineralisasi. Perhatikan pola *en-echelon*: tiap lensa berpindah ke sisi hangingwall, bukan satu vein menerus.


Ukuran dan berkas

Berkas	Isi
`SIM_collar/survey/assay/geologi.csv`	kampanye resource: **610 bor**, **76.069 baris assay** dengan Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As, SG; logging Lith, Alt, Ox, Texture, RQD, Recovery
`SIM_gc_*.csv`	kampanye **grade control**: 459 bor tegak per bench pola 7 m, 22.361 baris assay
`SIM_kecil_*.csv`	subset untuk latihan cepat sebelum memakai data penuh
`SIM_upsert_*.csv`, `SIM_upsert2_*.csv`	bor baru tahap 1 & 2 → latihan estimasi ulang sebagian
`SIM_split_*.csv` + `SIM_split_BM_GC.csv`	vein bercabang (lensa 2 + splay) dengan block model 2,5 m
`SIM_rusak_*.csv`	database dengan 9 kesalahan sengaja → latihan menu Validasi data bor
`SIM_qaqc.csv`	CRM 3 standar, duplikat, blank
`SIM_struktur.csv`, `SIM_pickup_survey.csv`, `SIM_sesar.csv`	pengukuran struktur (Dip, Dip_Azimuth, Plunge, Trend), pick-up permukaan, bidang sesar
`SIM_topo_xyz.csv`, `SIM_topo_xyz_nov.csv`	topografi dua versi (survei berikutnya area tambang turun s/d 7 m) → latihan versi topografi & volume sisa
`SIM_BM_GC.csv`	block model kosong 10 × 10 × 5 m di sekitar array vein
`SIM_LAT_*.csv`	endapan laterit berlapis untuk Geomodeller Stratified-Laterite
`QV_Lensa2_Leapfrog.obj`	wireframe contoh untuk uji import solid
`JAWABAN_MODEL.txt`	**kunci jawaban**: parameter model + angka hasil ukur

> **Membuat ulang datanya.** `python make_sim_data.py [folder]` (hasil selalu sama karena benihnya tetap). Tambahkan `--kecil` untuk latihan cepat, atau `--besar` untuk uji beban ±300.000 baris assay seperti skala produksi.

2. Latihan terpandu: menemukan kembali geometri endapan

Inti latihan ini: data bor dibuat dari geometri yang sudah ditentukan, jadi Anda bisa memeriksa apakah cara kerja Anda benar-benar mengembalikan geometri itu.



Gambar 2. Bidang vein lensa 2 dibentangkan. Kiri: tebal vein. Kanan: GT model (tebal × kadar relatif). Keduanya memanjang searah garis putus-putus, yaitu sumbu ore shoot ber-pitch 55°. Satu struktur mengontrol keduanya.


Latihan 2a — orientasi bidang vein

Setelah *flagging* domain, pasang bidang terbaik pada seluruh intersep vein. Hasil yang seharusnya Anda dapat: **dip ≈ 66°, dip-azimuth ≈ 139°**.


> **Jangan bingung bila bukan 70°.** Bidang acuan model memang 70°/135°, tetapi permukaan vein **sigmoidal** (melengkung). Bidang rata-rata dari bagian yang terbor memang lebih landai, yaitu sekitar 66°. Inilah perbedaan antara bidang acuan struktur dan bidang terbaik data — dua hal yang berbeda, dan keduanya benar.

Latihan 2b — pitch ore shoot

1. Hitung **GT = kadar × tebal**, **dijumlah per bor** (bukan per sampel). Menu **Ore Geometry** melakukan ini sendiri.
2. Proyeksikan GT tiap bor ke bidang vein, lalu cari arah kemenerusan terbaiknya (kipas variogram).
3. **Gabungkan keempat lensa** — kontrol strukturnya satu. Satu lensa saja datanya terlalu sedikit untuk menembus efek nugget Au.



Gambar 3. GT per bor di bidang vein. Kiri (lensa utuh): pemusatan GT jelas memanjang searah sumbu ore shoot. Kanan (lensa yang dipotong sesar): polanya pecah, karena blok yang turun menggeser bagian vein sejauh 12 m.




Gambar 4. Kipas variogram. Lembah terdalam = arah paling menerus. GT jatuh di 55° dan tebal intersep di 55°, berbanding pitch model 55°.

Pakai hasil itu untuk **orientasi elipsoid pencarian** saat estimasi: sumbu *major* searah pitch ≈ 55° di dalam bidang vein, *semi* searah strike, *minor* tegak lurus bidang vein; nisbah kira-kira 3 : 2 : 1.

Latihan 2c — pemulihan sesar lebih dulu

Di **Sesar 3D**, masukkan bidang dari `SIM_sesar.csv` (strike 110°, dip 65°, offset 12 m, *post*-mineralisasi) dan jalankan pemulihan sebelum pemodelan. Bandingkan domain lensa 2 & 3 sebelum dan sesudah: tanpa pemulihan, domainnya pecah dan arah ore shoot-nya kacau (Gambar 3 kanan). Lensa 1 & 4 tidak terpengaruh karena sesarnya terbatas ±150 m.


Latihan 2d — zonasi vertikal



Gambar 5. Zonasi vertikal terhadap paleo-muka air tanah RL 250 m. Kadar Au memuncak di sekitar RL 250 m bersamaan dengan tekstur *colloform*; Ag/Au naik dari ≈4.3 di bawah menjadi ≈19.0 di atas; Pb+Zn naik ke bawah.

Pelajaran praktisnya: **jangan menginterpolasi menembus batas zona**. Zona didih, zona base-metal, dan tudung tercuci adalah populasi kadar yang berbeda. Kalau dicampur dalam satu domain estimasi, variogramnya menjadi campuran dan hasil estimasi di kedua zona ikut salah.

Latihan 2e — top-cut



Gambar 6. Sebaran Au di dalam vein: rata-rata 5.5 g/t, median 2.29 g/t, CV 1.91, maksimum 174.2 g/t. 1% sampel teratas sudah memuat 14.5% logam — itulah alasan top-cut.


Cobalah beberapa nilai top-cut dan lihat pengaruhnya pada rata-rata domain serta hasil estimasi. Catat juga: Ag **tidak** perlu top-cut seagresif Au, karena efek nuggetnya jauh lebih kecil — top-cut ditentukan per unsur, bukan satu angka untuk semua.

3. Klasifikasi keyakinan sumber daya di Reporting BM

Baru di 0.24: *Reporting BM* dapat mengusulkan kelas Measured / Indicated / Inferred per blok, lalu melaporkan tonase dan kadar per kelas.

Kelas dihitung dari atribut yang sudah dihasilkan **Model Estimation**:

Atribut	Arti
`est_pass`	pass pencarian sampel: 1 = radius penuh (data rapat), 2–3 = radius diperbesar
`est_nsamp`	jumlah komposit yang dipakai blok itu
`est_sor` / `est_ke`	slope of regression atau kriging efficiency (dapat dipilih)



Gambar 7. Alur penentuan kelas. Blok diuji berurutan dari syarat terketat; yang tidak memenuhi turun ke kelas berikutnya.

Langkah

1. Jalankan **Model Estimation** seperti biasa.
2. Buka **Reporting BM** › bagian ① **Atribut**. Di bawahnya ada kotak **Klasifikasi keyakinan**.
3. Pilih ukuran keyakinan (SoR atau KE) dan sesuaikan ambangnya bila perlu.
4. Klik **Hitung klasifikasi**. Hasilnya menjadi atribut kategori `klasifikasi`.
5. Jalankan **Hitung reporting** dengan grup **Per atribut kategori → klasifikasi**.
6. Di bagian ③ **Hasil** muncul tabel tonase & kadar per kelas, ditambah **kurva grade × tonase bertumpuk per kelas**.

Atribut `klasifikasi` juga bisa diwarnai di tampilan 3D dan ikut ter-export ke CSV. Bila estimasi dijalankan ulang, klasifikasinya ikut dihitung ulang.

> **Ambang ini usulan geostatistik, bukan keputusan klasifikasi.** Penetapan Measured / Indicated / Inferred tetap wewenang **Competent Person** sesuai KCMI / JORC, yang juga menimbang spasi bor, kemenerusan geologi, kualitas QAQC dan kelayakan penambangan. Dua hal yang **belum** dipakai sebagai syarat otomatis: **spasi bor** dan **jumlah bor berbeda** per blok — keduanya belum direkam saat estimasi.

Latihan. Pada data simulasi, bagian dalam endapan (lebih dari ±140 m menurun dip) hampir tidak terbor — hanya tiap sayatan ke-3 yang punya bor dalam. Jalankan klasifikasi dan periksa: bagian itu seharusnya jatuh ke **Inferred**, dan bagian yang terbor rapat di dekat permukaan ke **Measured**. Kalau hasilnya tidak begitu, ambang Anda terlalu longgar.

4. Topografi & orthofoto resolusi sangat tinggi

Juga baru di 0.24, di **kedua** aplikasi: orthofoto dan topografi resolusi tinggi kini bisa ditampilkan tanpa membuat tampilan tersendat.

Yang berubah di dalam: orthofoto disusun menjadi **piramida LOD** (tiap tingkat merata-ratakan 2 × 2 piksel), lalu warna diambil dari tingkat yang sepadan dengan kerapatan tampilan. Resolusi **dan** luas mesh ortho sekarang mengikuti luas area yang sedang terlihat, jadi zoom masuk otomatis makin detail pada jumlah titik yang sama. Di menu **Peta (Mapping)**, orthofoto dipotong sesuai tampilan dan dikirim setajam layar — saat zoom dekat itu berarti resolusi aslinya. Topografi tidak lagi didesimasi sekali di awal, melainkan diambil satu titik per sel dari seluruh data di dalam tampilan.

	Sebelum	Sesudah
Mesh ortho, tampilan 400 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	0,91 m/titik · 193.000 titik · 525 ms
Mesh ortho, zoom 40 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	**0,1 m/titik** · 215.000 titik · 136 ms
Mesh ortho, zoom 10 m	1 m/titik · 160.000 titik · 592 ms	**0,1 m/titik** · 13.700 titik · **3 ms**
Gambar ortho Peta 2D, zoom 10 m	2.666 × 2.666 px @ 0,15 m · 255 ms · 3,1 MB	**220 × 220 px @ 0,05 m** · 6 ms · 9 KB
Titik topografi di jendela 10 m (anggaran 15.000)	15	**172**
200.000 pembacaan elevasi	512 ms	**14 ms**
Warna ortho pada mesh kasar	titik tunggal (berkerlip)	rata-rata area (anti-alias)

Yang perlu Anda ketahui saat memakainya: kotak **Resolusi (m)** di panel orthofoto sekarang berfungsi sebagai **batas paling halus**, bukan resolusi tetap. Tampilan disegarkan kira-kira 0,3 detik setelah gerakan zoom/geser berhenti (bukan tiap frame), dan mesh dibuat sedikit lebih luas dari layar supaya geseran kecil tidak menyisakan tepi kosong. Klik ganda / autoscale mengembalikan tampilan ke seluruh area.

> **Hasil laporan tidak berubah.** Grid elevasi yang cepat itu dipakai **hanya untuk tampilan** (menempelkan warna ortho ke topografi). Semua perhitungan *Reporting BM*, estimasi dan validasi tetap memakai fungsi elevasi aslinya. Pada uji 300 titik acak, selisih kedua jalur itu rata-rata 4 mm dan paling besar 3,8 cm pada permukaan dengan relief 30 m.

Latihan. Import `SIM_topo_xyz.csv` sebagai topografi, lalu `SIM_topo_xyz_nov.csv` sebagai versi berikutnya. Di **Data Spasial** bergantilah antar versi, lalu hitung volume sisa di *Reporting BM* dengan batas **di bawah topografi aktif** untuk kedua versi — bedanya adalah material yang sudah tergali.

5. Bagian tutorial lama yang perlu disesuaikan

Dua tutorial bergambar yang lama masih berlaku untuk alur kerjanya, tetapi beberapa nama dan angkanya mengikuti data simulasi versi sebelumnya:

Di tutorial lama	Sekarang
Domain `QV_Utama` dan `QV_HW1` (2 vein)	`QV_Lensa1` … `QV_Lensa4` + `QV_Splay_HW` (array 4 lensa en-echelon)
`QV_Utama_Leapfrog.obj`	`QV_Lensa2_Leapfrog.obj`
Kolom assay: Au, Ag, SxS	Au, Ag, Cu, Pb, Zn, S, As_ppm, SG
Kolom geologi: Lith, Alt, Ox	+ Texture, RQD, Recovery
±33 bor, ±2.500 baris assay	610 bor resource + 459 bor grade control, ±98 ribu baris assay
Tebal vein 1–3,2 m	median 1.0 m, p90 3.5 m (endapan vein sempit, dengan pembengkakan di zona dilatan)

Langkah-langkah menu, urutan kerja dan penjelasan konsep di kedua tutorial itu tidak berubah. Yang perlu Anda sesuaikan hanya nama domain yang diketik dan angka yang muncul di layar.