

펫불런스 응급도 구분 정책

(25.12.01) 수정

본 정책은 사용자가 입력하거나 업로드한 사진 + 텍스트를 기반으로 응급 상황 가능성을 '상/중/하' 단계로 분류하는 **비진단적 안내 기능**에 대한 내부 기준입니다.

※ 본 응급도 분류는 **의료행위·수의학적 진단이 아니며**, 정확한 건강 상태는 반드시 **수의사의 진료를 통해 확인**해야 합니다.

1. 목적

- 특수동물 보호자가 응급 상황에서 빠르게 대처 방향을 판단할 수 있도록 돕는 목적의 우선순위 분류(트리아지) 기능 제공
- 사진 및 텍스트 기반으로 위험 가능성을 평가하여 아래 3단계로 안내
 -  **상(Severe):** 즉시 병원 방문 권장
 -  **중(Moderate):** 빠른 관찰 및 단기 내 내원 권장
 -  **하(Mild):** 경미한 증상으로 보이며 단기 관찰 가능

2. 전체 응급도 분류 플로우

사용자가 사진+텍스트를 입력하면 아래 응급도에 따라 분류된 증상과 매치하여 응급도를 판단한다.

응급도 중(Moderate) 리스트

- 설사(지속형)
- 눈염증·눈곱
- 탈수
- 피부염
- 혹·종양
- 보행 이상(절뚝거림)
- 활동·식욕 감소(경미)

1. 응급도 상

1. 아래 신호 중 하나라도 해당하면 즉시 '상'으로 분류한다.

- 호흡곤란(입벌림 호흡, 펄핑, 혈떡임)
- 신경계 이상(발작, 전신 경직, 의식 저하)
- 기립 불가(쓰러짐, 움직임 현저히 저하)
- 심한 탈수/쇼크 의심
- 장폐색 의심(48h 이상 무배변 + 복부 팽창)
- 젖은꼬리증(지속 물변 + 항문 젖음 + 활력 저하)
- 괴사·검은 부위·심부 감염 의심
- 지속 출혈 또는 출혈량 증가

2. 응급도 상(Severe) 리스트

- a. 출혈(앵무새 외상)
- b. 젖은꼬리증
- c. 호흡곤란(입벌림, 펄핑)
- d. 경련·떨림
- e. 기립 불가·심한 기력 저하
- f. 장폐색(48h 무배변+복부팽창)
- g. 괴사·검은 부위
- h. 지속 출혈·출혈량 증가

2. 응급도 중

1. 아래 신호 중 하나라도 해당하면 '중'으로 분류한다.

- 활동 감소(둔함, 은신 증가)
- 식욕 감소(24-72h)
- 물 섭취 감소
- 반응성 저하

2. 응급도 중(Moderate) 리스트

- a. 설사(지속형)
- b. 눈염증·눈곱
- c. 탈수

- d. 피부염
- e. 흑·종양
- f. 보행 이상(절뚝거림)
- g. 활동·식욕 감소(경미)

3. 응급도 하

1. 증상이 경미하거나 일시적이면 '하'로 분류한다.

2. 응급도 하(Mild) 리스트

- a. 경미한 설사 1회
- b. 가벼운 눈물·눈 자극
- c. 일시적 피부 건조
- d. 일시적 절뚝거림
- e. 단기 스트레스에 의한 행동 변화

3. 증상 카테고리별 세부 분류 기준

A. 호흡

조건	응급도
입벌림 호흡, 펄핑, 혈떡임	상
콧물·재채기 + 활동 정상	중
호흡 이상 24h 지속 + 활동 저하	상

B. 신경계(떨림·발작)

조건	응급도
발작·경직·비틀림·의식 저하	상
일시적 가벼운 떨림 + 활동 정상	중

C. 활동·기력

조건	응급도
거의 움직이지 않음 / 쓰러짐	상
은신 증가 + 식욕 감소	중
환경 변화 직후 단기 스트레스	하

D. 배변·소화기(설사/변비)

증상	응급도
젖은꼬리증: 지속 물변 + 항문 젖음 + 활력 저하	상
물설사 + 활동 저하/탈수 의심	상
가벼운 설사(1~2회) + 활력 정상 + 젖은꼬리 아님	중
지속적 설사 24~48h (활력 정상)	중
규칙성 있는 묽은 변 1회 + 회복 경향	하

E. 눈·안구(눈곱·충혈)

조건	응급도
노란 고름, 못 뜸, 심한 부종	상
눈곱·충혈·불편감	중
가벼운 눈물, 일시적 자극	하

F. 피부/깃털/탈피

조건	응급도
괴사색·심부 상처·지속 출혈	상
탈피 불량, 피부염, 부분 탈모	중
얇은 껍힘, 경미한 각질	하

G. 보행·다리·날개·꼬리

조건	응급도
다리/날개 사용 불가, 부종 심함	상
절뚝거림, 날개 처짐, 꼬리 손상	중

조건	응급도
일시적 빠깃, 경미한 통증	하

H. 식욕·체중 < (시연 대응 업데이트 완료)

조건	응급도
24h 이상 거의 먹지 않음 + 기력 저하	상
3일 이상 식욕 감소 또는 체중 감소	중
경미한 식욕 감소 + 활동/반응 정상	하
환경 변화 직후 단기 식욕 감소	하

➡ 시연 케이스(도마뱀 식욕저하=하)가 자연스럽게 연동됨.

4. 최종 의사결정 구조

1. 레드 플래그 발견 → 즉시 '상'
2. 전신 상태 저하 + 위험 증상 → 중 또는 상
3. 전신 정상 + 중등도 증상 → 중
4. 경미·일시적 증상 + 정상 활동 → 하

추가 보완 (시연 일관성 유지)

- "가벼운 설사 + 활력 정상 → 중"
- "경미한 식욕 감소 + 활동 정상 → 하"

5. 시연 대응 예시 3종 (부록)

✓ A. 앵무새 출혈 → 상

- 깃표면 및 깃대 주변에서 출혈 확인
- 지속적으로 피가 고이거나 젖음 발생
→ 레드 플래그(출혈 지속) → 상

✓ B. 햄스터 설사 → 중

- 묶은 번 1~2회
 - 항문 건조, 젖은꼬리 아님
 - 활력·식욕 큰 변화 없음
- "경미한 설사 + 활력 정상 → 중"
-

✓ C. 도마뱀 식욕 저하 → 하

- 먹이 섭취량 약간 감소
 - 반응성·활동성 정상
 - 최근 환경 변화 있음
- "경미한 식욕 감소 → 하"
-