BULLETIN HEBDOMADAIRE · CENTRE DE CARDIOLOGIE DE RODEZ

PAUSE CARDIO ❤

Nouveautés de la semaine du 7 novembre 2026

1 nouveauté cette semaine — aucune ne modifie la pratique dans l'immédiat.

INTERVENTIONNEL & STRUCTUREL · À connaître · Analyse groupée d'essais randomisés · PARTNER 3, Evolut Low Risk, NOTION

Transcatheter aortic valve implantation vs surgical replacement in low-risk aortic stenosis: time-dependent late mortality in a pooled analysis of trials

Eur Heart J · 4 novembre 2026 · Analyse groupée d'essais randomisés · EACTS 2026

Cette analyse groupée réunit PARTNER 3, Evolut Low Risk et NOTION, les trois essais randomisés qui ont comparé le TAVI et le remplacement valvulaire aortique chirurgical chez 2 644 patients à bas risque chirurgical. Les temps de survie ont été reconstruits à partir des courbes publiées, chaque essai disposant d'un suivi d'au moins 7 ans. Présentée au congrès EACTS 2026, elle rapporte une mortalité toutes causes à 7 ans de 26,9 % après TAVI contre 23,7 % après chirurgie, sans différence significative sur l'ensemble du suivi (HR 1,14). Les courbes se croisent cependant : la mortalité est plus faible après TAVI pendant la première année, à la limite de la significativité (HR 0,61 ; IC95 % 0,38–1,00), puis nettement plus élevée entre 5 et 7 ans (HR 1,64 ; IC95 % 1,27–2,12). Le résultat ne se maintient pas lorsque l'essai Evolut Low Risk est retiré de l'analyse.

> **En pratique :** cette analyse ne modifie pas les recommandations en vigueur, et son signal reste fragile : données reconstruites, hypothèse des risques proportionnels non respectée, résultat qui ne tient plus sans Evolut Low Risk. Elle rappelle en revanche que le bénéfice précoce du TAVI chez le patient à bas risque ne préjuge pas de sa survie à long terme, et que les essais pris un à un n'avaient pas la puissance de répondre à cette question. Chez le patient jeune à bas risque, dont l'espérance de vie dépasse largement sept ans, elle plaide, en équipe cœur, pour une décision partagée qui ne se limite pas aux résultats à un an. Les suivis prolongés de ces essais, avec la mortalité par cause et par type de valve, diront si ce signal se confirme.

Article original · Analyse TCTMD

Fiches rédigées à l'aide de l'IA — résumés à valider par le lecteur avant toute application clinique, se reporter aux articles originaux.