

Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Situación Epidemiológica de las Arbovirosis en Guatemala 2026

Hasta la semana epidemiológica No. 35-2026*

(Finalizó el 05 de septiembre del 2026)

***Datos preliminares, sujetos a cambios según el análisis y confirmación de las unidades de salud.**

https://epidemiologia.mspas.gob.gt

Arbovirosis: Casos sospechosos y confirmados por DDRISS, SE-35 2026

Chikungunya		
DDRISS	Sosp.	Conf.
Escuintla	4	0
San Marcos	3	1
Guatemala Central	1	0
Guatemala Nor Occidente	1	0
Guatemala Sur	1	0
Huehuetenango	1	0
Sololá	1	0
Chiquimula	1	0
Alta Verapaz	1	0
Petén Norte	1	0
Petén Sur Oriental	1	0
Total país	**16**	**1**

Zika		
DDRISS	Sosp.	Conf.
Alta Verapaz	1	0
Petén Norte	1	0
Total país	**2**	**0**

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala

Dirección de
Epidemiología y
Gestión del Riesgo


Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social

Situación actual: dengue

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

Casos e incidencia histórica de dengue en SE-35, Guatemala, 2018 a 2026

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social



Hasta la **SE-35 2026**, el número de casos acumulados notificados:


- 40% menor que en 2025
- 87% menor que 2024 (año epidémico).

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo


Dengue Total. Corredor Endémico Semanal de 2026 Históricos de 7 años: 2017 a 2025 (excluyendo 2024)

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social



Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala

Dengue. Actividad semanal por lugar de residencia según DDRISS. 2019 a 2026 (excluyendo 2024)



Para **SE-34**


- Zona de brote: 2 DDRISS (7 %)
- Zona de alerta: 10 DDRISS (34 %)
- Zona de seguridad: 13 DDRISS (45 %)
- Zona de éxito: 2 DDRISS (7 %)
- Sin notificación de casos: 2 DDRISS (7 %)

Exito Seguridad Alerta Brote Sin notificación

Fuente: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala

	DDRISS	Casos	Incidencia*	%
1	Petén Norte	882	442,0	7
2	Petén Sur Occidental	923	386,6	7
3	Quetzaltenango	1.738	178,3	14
4	Jalapa	698	161,4	5
5	Chiquimula	748	157,0	6
6	Retalhuleu	547	136,2	4
7	El Progreso	226	112,8	2
8	Petén Sur Oriental	228	100,0	2
9	Escuintla	813	95,2	6
10	Jutiapa	542	93,3	4
11	Sacatepéquez	319	74,8	3
12	Suchitepéquez	481	74,4	4
13	Ixcán	89	74,3	1
14	Alta Verapaz	879	59,3	7
15	San Marcos	649	51,0	5
16	Sololá	235	46,3	2
17	Izabal	218	45,9	2
18	El Quiché	381	43,7	3
19	Baja Verapaz	156	43,3	1
22	Zacapa	119	41,9	1
21	Santa Rosa	185	39,2	1
22	Guatemala Nor Oriente	197	37,0	2
23	Guatemala Nor Occidente	300	30,8	2
24	Guatemala Sur	294	29,2	2
25	Huehuetenango	414	27,0	3
26	Guatemala Central	233	18,8	2
27	Chimaltenango	144	17,8	1
28	Totonicapán	8	1,5	0
29	Ixil	2	1,1	0
	Desconocido	51		0
	Total País	**12,699**	**69,3**	**100**

Casos e incidencia por DDRISS de Residencia (datos MSPAS).
Guatemala, 2026 (hasta SE-35)



Se presentan únicamente datos de casos notificados en red de servicios de MSPAS
Incidencia *100,000 habs

Fuente: DTI / Departamento de vigilancia y control

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo


Casos e incidencia de dengue por grupo de edad

Guatemala, 2026 Hasta SE-35

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Grupo de Edad	Casos	%	% acum
Menores de 1 año	367	3%	3%
De 1 a 4 años	1,128	9%	12%
De 5 a 9 años	1,930	15%	27%
De 10 a 14 años	1,792	14%	41%
De 15 a 19 años	1,444	11%	52%
De 20 a 24 años	1,191	9%	62%
De 25 a 39 años	2,830	22%	84%
De 45 a 49 años	895	7%	91%
De 50 a 59 años	548	4%	95%
De 60 a 64 años	172	1%	97%
De 65 a 69 años	150	1%	98%
Mayores de 70 años	252	2%	100%
Total	12,699	100%	

Incidencia por grupos de edad y género (MSPAS)



	Hombres	Mujeres
Casos	5,923	6,776
Incidencia	66.6	73.8

Incidencia *100,000 habs

Fuente: DTI / Departamento de vigilancia y control, MSPAS

Dirección de
Epidemiología y
Gestión del Riesgo

Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social

Integración de vigilancia: MSPAS e IGSS

Dengue total. Casos e incidencia acumulada por DDRISS de Residencia. Integración de datos MSPAS e IGSS. Guatemala, hasta SE-35

Casos a la SE-35: 24,155
Reportados por MSPAS: 12,699
Reportados por IGSS (SE-34): 11,456


Incidencia acumulada nacional: 131.9 *100,000 hab

	DDRISS	IGSS	MSPAS	Total Casos	Incidencia
1	Sacatepéquez	2,450	319	2,769	649.5
2	Petén Norte	58	882	940	471.1
3	Petén Sur Occidental	69	923	992	415.5
4	Retalhuleu	938	547	1,485	369.8
5	Escuintla	1,833	813	2,646	309.8
6	Jutiapa	728	542	1,270	218.7
7	Quetzaltenango	332	1,738	2,070	212.4
8	Chiquimula	89	748	837	175.7
9	Jalapa	48	698	746	172.5
10	Suchitepéquez	537	481	1,018	157.4
11	Guatemala Sur	1,258	294	1,552	153.9
12	Izabal	381	218	599	126.2
13	El Progreso	18	226	244	121.7
14	Petén Sur Oriental	12	228	240	105.3
15	Guatemala Central	1,066	233	1,299	104.6
16	Zacapa	158	119	277	97.6
17	Guatemala Nor Occidente	536	300	836	85.9
18	San Marcos	377	649	1,026	80.7
19	Ixcán	0	89	89	74.3
22	Alta Verapaz	88	879	967	65.2
21	Guatemala Nor Oriente	119	197	316	59.4
22	Santa Rosa	66	185	251	53.2
23	Baja Verapaz	23	156	179	49.6
24	Sololá	14	235	249	49.1
25	El Quiché	12	381	393	45.0
26	Chimaltenango	214	144	358	44.3
27	Huehuetenango	27	414	441	28.8
28	Totonicapán	3	8	11	2.1
29	Ixil	0	2	2	1.1

Fuente: DTI / Departamento de vigilancia y control, MSPAS
Sección de Epidemiología, Departamento de Medicina Preventiva, IGSS

Clasificación de casos de Dengue por DDRISS de residencia de paciente.

Guatemala 2026, Hasta SE-35



Clasificación del caso	Casos notificados	%
Dengue sin signos de alarma (DSSA)	21,840	90.4%
Dengue con signos de alarma (DCSA)	2,270	9.4%
Dengue grave (DG)	45	0.2%

Fuente: DTI / Departamento de vigilancia y control, MSPAS
Sección de Epidemiología, Departamento de Medicina Preventiva, IGSS

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo


Casos e incidencia de dengue por grupo de edad (MSPAS e IGSS)

Guatemala, 2026 Hasta SE-35

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Grupo de Edad	Casos	%	% acum
Menores de 1 año	480	2.5%	2.5%
De 1 a 4 años	1,657	8.6%	11.0%
De 5 a 9 años	1,950	10.1%	21.1%
De 10 a 14 años	1,480	7.6%	28.7%
De 15 a 19 años	1,423	7.3%	36.1%
De 20 a 24 años	2,221	11.5%	47.6%
De 25 a 39 años	6,097	31.5%	79.1%
De 45 a 49 años	1,824	9.4%	88.5%
De 50 a 59 años	1,069	5.5%	94.0%
De 60 a 64 años	325	1.7%	95.7%
De 65 a 69 años	274	1.4%	97.1%
Mayores de 70 años	564	2.9%	100.0%
Total	19,364		

Incidencia por grupos etarios y género



	Hombres	Mujeres
Casos	11,772	12,390
Incidencia	132.4	134.9

Fuente: DTI / Departamento de vigilancia y control, MSPAS
Sección de Epidemiología, Departamento de Medicina Preventiva, IGSS

Dirección de
Epidemiología y
Gestión del Riesgo


Ministerio de
Salud Pública
y Asistencia
Social

Vigilancia laboratorial: arbovirosis

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

Circulación de serotipos de Dengue por semana epidemiológica Guatemala, SE-35, 2026

N = 216 (Muestras procesadas para serotipificación)
DENV-1: 19%
DENV-2: 8%
DENV-3: 74%
DENV-4: 0%



Fuente: Laboratorio Nacional de Salud


Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

Resultados de muestras de dengue recibidas en LNS (por DDRISS de notificación)

Guatemala, SE-35, 2026

Resultado	Cantidad
Positivas PCR	432
Positivas NS1	69
Positivas IgM	362
Negativas	3,906
Positivas	893
Total	4,827
% **Positivos**	18.5%

Fuente: Laboratorio Nacional de Salud



Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

Conclusiones

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

- Hasta la SE-35 de 2026, la notificación acumulada de dengue se mantiene por debajo de lo observado en 2025 y considerablemente por debajo del año epidémico 2024; sin embargo, continúa la transmisión activa con diferencias importantes entre territorios.
- La actividad de dengue es heterogénea: para SE-34, dos DDRISS se encuentran en zona de brote y diez en zona de alerta. Las mayores incidencias integradas MSPAS–IGSS se observan en Sacatepéquez, Petén Norte, Petén Sur Occidental, Retalhuleu y Escuintla.
- DENV-3 continúa siendo el serotipo de mayor circulación. Posterior a la alerta emitida en SE-30 por el incremento en la detección de DENV-1, no se evidencia hasta SE-35 un incremento sostenido de este serotipo ni un desplazamiento de DENV-3. No obstante, el aumento de detecciones de DENV-1 observado nuevamente en SE-35 requiere mantener vigilancia intensificada.
- Los territorios con elevada incidencia, positividad laboratorial y actividad superior a la esperada deben considerarse prioritarios para las acciones de vigilancia y control, especialmente cuando coinciden varios de estos indicadores.
- Se mantiene circulación de otras arbovirosis, con un caso confirmado de chikungunya en San Marcos y sin casos confirmados de Zika hasta la SE-35.

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

Recomendaciones

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

- Mantener vigilancia epidemiológica de dengue, integrando tendencia de casos, incidencia, comportamiento en el corredor endémico, positividad laboratorial, severidad y distribución territorial.
- Fortalecer la vigilancia de la circulación de serotipos para identificar oportunamente cambios en su frecuencia o distribución geográfica, incluyendo seguimiento particular de la señal de DENV-1 que motivó la alerta de SE-30, sin limitar el análisis a este serotipo.
- Priorizar las intervenciones de vigilancia, control vectorial, investigación epidemiológica y comunicación de riesgo en los territorios donde coincidan indicadores de mayor riesgo, como elevada incidencia, alta positividad y ubicación en zonas de alerta o brote.
- Analizar semanalmente los territorios que presenten cambios inusuales en casos, positividad, severidad o circulación de serotipos, con desagregación hasta municipio cuando sea posible, para identificar oportunamente conglomerados o cambios en el patrón de transmisión.
- Mantener la preparación de los servicios de salud para la detección temprana de signos de alarma y dengue grave, especialmente en los territorios con mayor transmisión o incremento reciente de casos.
- Fortalecer la calidad, oportunidad e integración de la información epidemiológica y laboratorial entre las diferentes fuentes de vigilancia para facilitar la identificación temprana de cambios relevantes en la situación epidemiológica.

Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo

Recursos de interés

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

MSPAS

- Protocolo de Vigilancia Epidemiológica de Arbovirosis
- Ficha epidemiológica integrada de Arbovirosis
- Manual de Manejo Clínico de Dengue MSPAS (2022)

OPS

- Alerta epidemiológica Chikungunya (OPS)
- Directrices para el diagnóstico clínico y el tratamiento del dengue, el chikunguña y el zika