

תכשירי IVIG

Ig VENA	KIOVIG®	Privigen®	FLEBOGAMMA ® DIF	Omr-IgG-am ™ 5%	GAMUNEX®-C	Intratect®100g/l	שם מסחרי
5%	10%	10%	5%	5%	10%	5% 10%	ריכוז וצורת הגשה
תמיסה	תמיסה	תמיסה	תמיסה	תמיסה	תמיסה	תמיסה	
Maltose	Glycine	L-Proline	SORBITOL AND FRUCTOSE	maltose	Glycine	Glycine	חומרי עזר
לשמור בקירור	בטמפ' החדר	בטמפ' החדר	בטמפ' החדר	בטמפ' החדר	לשמור בקירור	בטמפ' החדר	תנאי אחסון
0.05	0.14	פחות מ 0.025	פחות מ 0.05	פחות מ 0.15	0.046	1.8	IgA (mg/mL)
95% לפחות	98% לפחות	98% לפחות	97% לפחות	95% לפחות	למעלה מ-98%	96%	ריכוז IgG
לא נדרש	ניתן לתת לא מהול במידה ויש צורך בריכוז 5% ניתן לדלל ע"י מיחול בנפח שווה של GLUCOSE 5% אסור עם סליין	ניתן לתת לא מהול במידה ויש צורך בריכוז 5% ניתן לדלל ע"י מיחול בנפח שווה של GLUCOSE 5% אסור עם סליין	לא נדרש	לא נדרש	ניתן לתת לא מהול במידה ויש צורך בריכוז 5% ניתן לדלל ע"י מיחול בנפח שווה של GLUCOSE 5% אסור עם סליין	לא נדרש	מיהול
מומלץ להתחיל ב 0.46-0.92mL/kg/h במשך 30 דקות. אם נסבל היטב ניתן להעלות את הקצב ל 1.85mL/kg/h	מומלץ להתחיל ב 0.5mL/kg/h במשך 30 דקות ואם נסבל היטב ניתן להעלות את הקצב למקסימום של 6mL/kg/h	מומלץ להתחיל ב 0.3mL/kg/h במשך 30 דקות ואם נסבל היטב ניתן להעלות את הקצב למקסימום של 4.8mL/kg/h	מומלץ להתחיל ב 0.6-1.2mL/kg/h במשך 30 דקות. אם נסבל היטב ניתן להעלות את הקצב ל 6mL/kg/h	מומלץ להתחיל ב 0.6-1.2mL/kg/h במשך 15 דקות. אם נסבל היטב ניתן להעלות את הקצב ל 4.8mL/kg/h	מומלץ להתחיל ב 0.6mL/kg/h במשך 30 דקות ואם נסבל היטב ניתן להעלות את הקצב למקסימום של 4.8mL/kg/h	מומלץ להתחיל ב 0.3mL/kg/h במשך 30 דקות ואם נסבל היטב ניתן להעלות את הקצב למקסימום של 1.9mL/kg/h	קצב מתן מומלץ ע"י היצרן
			לא לשימוש ביולדים מתחת לשנתיים בגלל תכולת הפרוקטוז	לא מכיל SUCROSE משמרים			הערות
עריכה: אשוואק עתאבה, מגר' חורי ג'ריס, מגר' לימור איזנובדו						23.1.23	תאריך עדכון

