

הנחיות למתן תרופות בשימוש שכיח- טיפול נמרץ ילדים

שם התרופה (שם מסחרי)	מיהול ראשוני	ריכוז מקסימלי	קצב מתן	הערות
Chlorhydrate de thiamine Vitamin B1	100 mg/2 ml	ללא צורך במיהול שניוני אך ההמלצה שנפח השאיבה הסופי יהיה 10 מ"ל של NS	10-30 דקות	לפי הנחיות היצרן
Diazepam (Assival)	10 mg/2 ml	ללא צורך במיהול שניוני אך ההמלצה שנפח השאיבה הסופי יהיה 10 מ"ל של NS	תוך 10 דקות לפחות	
Dipyrone (Optalgin)	1000 mg/2 ml	ללא צורך במיהול שניוני אך ההמלצה שנפח השאיבה הסופי יהיה 10 מ"ל של NS	תוך 10 דקות לפחות	לפי הנחיות יצרן
Esomeprazole (Nexium)	40 mg להוסיף 5 מ"ל לאמפולה	0.4-0.8 mg/ml	10-30 דקות	
Furosemide (Fusid)	250 mg/25 ml 20 mg/2 ml	2-10 mg/ml נפח השאיבה הסופי המומלץ הינו 10 מ"ל לפחות NS/D5W	15-30 דקות (PUSH במצבי חירום בלבד) 1-2 דקות	בקצב מהיר מעלה את הסיכון לאוטוטוקסיסטי

הנחיות למתן תרופות בשימוש שכיח- טיפול נמרץ ילדים

שם התרופה (שם מסחרי)	מיהול ראשוני	ריכוז מקסימאלי	קצב מתן	הערות
Hydralazine	20 mg להוסיף 2 מ"ל לאמפולה WFI	10 mg/ml נפח השאיבה הסופי המומלץ הינו 10 מ"ל לפחות NS/D5W	10 דקות לפחות	אפשר לדלל עד 1 mg/ml
Hydrocortisone	100 mg להוסיף 2 מ"ל לאמפולה WFI	1-50 mg/ml נפח השאיבה הסופי המומלץ הינו 10 מ"ל לפחות NS/D5W	10 דקות	
Ketorolac	30 mg/ ml	ללא צורך במיהול שניוני אך ההמלצה שנפח השאיבה הסופי יהיה 10 מ"ל של NS	10-20 דקות	
Lacosamide (Vimpat)	10 mg/ml (20 ml)	ללא צורך במיהול שניוני אך ההמלצה שנפח השאיבה הסופי יהיה 10 מ"ל של NS/D5W	30-60 דקות 40-80 mg/min במצב של סטטוס	4 שעות אחרי מיהול שניוני בטמפר' החדר

הנחיות למתן תרופות בשימוש שכיח- טיפול נמרץ ילדים

שם התרופה (שם מסחרי)	מיהול ראשוני	ריכוז מקסימאלי	קצב מתן	הערות
Levetiracetam (Keppra)	500 mg/5 ml	5-15 mg/ ml ללא צורך במיהול שניוני אך ההמלצה שנפח השאיבה הסופי יהיה 10 מ"ל של NS/D5W	15 דקות לפחות במידה ורוצים לתת במשך 5 דקות יחס המיהול הוא 1:1	אחרי מיהול שניוני היציבות היא 4 שעות בטמפר' החדר
Methylprednisolone (Solumedrol)	1000 mg/ 16 ml 500 mg/ 8 ml 125 mg/ 2 ml הריכוז המתקבל אחרי המהילה ב- WFI הינו: 62.5 mg/ml	2.5- 20 mg/ ml יש למהול עד לנפח סופי מינמאלי של 10 מ"ל NS/D5W	30-60 דקות	- תכשירים המכילים בנזילאלכוהול) מוהל שבא עם התרופה) יש להשתמש בילידם מעל גיל שנתיים קצב מהיר יותר במצב מסכן חיים 3-15 דקות
Metoclopramide (Pramin)	10 mg/2 ml	0.2 mg/ml	15 דקות לפחות	
Ondansetron (Zofran)	8 mg/4 ml	- מינון מעל 4 מ"ג ההמלצה להוסיף 50 מ"ל - בילידים מתחת לגיל שנה אפשר להוסיף 10 מ"ל	תוך 15 דקות לפחות	במתן לחולים אונקולוגיים סביב טיפול כימותרפי יש להוסיף 50 מ"ל

הנחיות למתן תרופות בשימוש שכיח- טיפול נמרץ ילדים

ולתת ב- 15 דקות לפחות		מוהלים ב- NS/D5W		
שם התרופה (שם מסחרי)	מיהול ראשוני	ריכוז מקסימאלי	קצב מתן	הערות
Pantoprazole (Controloc)	להוסיף 10 מ"ל לאמפולה	4 mg/ml מוהלים ב- NS	15 דקות לפחות	יש לשטוף את העירוני לפני ואחרי המתן בסליין
Paracetamol (Acamol)	1000 mg/100 ml	ללא צורך במיהול שניוני אך ההמלצה שנפח השאיבה הסופי יהיה 10 מ"ל של NS	15-30 דקות	אמפולה לשימוש עד 6 שעות בטמפרטורת החדר
Phenytoin	250 mg/5 ml	אפשר לתת בלי מיהול שני במידה ומוהלים הריכוז המינימאלי הוא 5 mg/ml לא לערבב עם D5W	מבוגרים: 50 mg/min ילדים: 1-3 mg/kg/min ומקסימום 50 mg/min במידה ומוהלים יש לתת תוך 1-4 שעות	- לתת בווריד גדול (לא בקרקפת) יש להשתמש בפילטר-0.22 0.55 מיקרון לא לשמור במקרר

הנחיות למתן תרופות בשימוש שכיח- טיפול נמרץ ילדים

	20 דקות לפחות	למהול ב- 50 מ"ל לפחות NS/D5W	2 mg/0.2 ml 10 mg/ml	Phytomenadione Vitamin K
שם התרופה (שם מסחרי)	מיהול ראשוני	ריכוז מקסימאלי	קצב מתן	הערות
Promethazine (Phenergan)	50 mg/2 ml	ללא צורך במיהול שניוני אך ההמלצה שנפח השאיבה הסופי יהיה 10 מ"ל של NS	תוך 10 דקות לפחות	
Tranexamic Acid Hexacapon	500 mg/5 ml	50-100 mg/ml נפח השאיבה הסופי המומלץ הינו 10 מ"ל לפחות NS/D5W	15 דקות לפחות	-
Valproate Sodium (Orfiril)	300 mg/3 ml	יש להוסיף 50 מ"ל לכל אמפולה NS/D5W	60 דקות לפחות 1.5-3 mg/kg/min במצב של סטטוס	- קצב יותר גבוה רק במידה ויש צורך רפואי

הוכן ע"י:
ח"יר אסמאעיל- נאמנת תרופות
אשוואק עתאבא- רוקחת
נבדק ע"י: ד"ר עלי ג'בארין- רוקח קליני