

ГНМ. Новая медицина. Паренхима и кора головного мозга

Сверкунов Артём Владимирович

Клинический психолог. Специалист ЛФК Общественный деятель.

ЦЕЛители



Древняя медицина

Ложные теории лекарям

Толпе натуропатия и гомеопатия

БОЛЬница




Современная медицина

Ложные знания для врачей

Толпе Ложные теории и фармпрепараты

3ДРАВница



Новая медицина

Знания для всех


Народу самоисцеление



Герд Хамер (Ryke Geerd Hamer) 1935—2017г.г.

Терапевт, врач-онколог, доктор медицины и магистр теологии. Создатель и основоположник Германской Новой Медицины (Germanic New Medicine)

Компас Германской Новой Медицины Онтогенетическая Система важных целесообразных биологических специальных программ (ЦБС)



ЭНДОДЕРМА

(внутренний зародышевый слой)

МЕЗОДЕРМА

(средний зародышевый слой)

ЭКТОДЕРМА

(наружный зародышевый слой)

Анаэробы

могут существовать без кислода. Всегда присутствют в организме

Аэробы

Собираются в ПК 1 из окружающей среды.

Эволюция белка

НН в стволе мозга

Са-фаза РсІ-фаза Адено-са (опухоль ТВ распад опухоли клетки+)

нн в мозжечке

Са-фаза РсІ-фаза Адено-са (опухоль ТВ распад опухоли клетки+)

НН в паренхиме головного мозга

Са-фаза: РсІ-фаза: Некроз (потеря Восстанов

Некроз (потеря Восстановление некротиткани) зированных участков (ткани больше, чем до этого)

НН в коре головного мозга


Са-фаза: Pcl-фаза: Эпителиальные язвы Заживление язв Кусковые

Защита от атаки


KCO


Территория / разлука
















ЭНДОДЕРМА

(внутренний зародышевый слой)

МЕЗОДЕРМА (средний слой)

Анаэробы могут существовать без кислода. Всегда

присутствют

в организме

НН в стволе мозга

Са-фаза РсІ-фаза

Адено-са (опухоль ТВ распад опухоли


клетки+)


Кусковые

НН в мозжечке


Са-фаза РсІ-фаза


Адено-са (опухоль ТВ распад опухоли клетки+) Защита от атаки






















Leber und ihre verschiedenen Anteile m




Leber-Gallengänge (Ektoderm, Cortex-gest Zellschwund (Ulcera) in der ca-Phase. Zellwi (Hepatitis) in der pcl-Phase




КОРА ГОЛОВНОГО МОЗГА




ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ CEREBRAL MEDULLA И ОРГАНАМИ





Компас Германской Новой Медицины Онтогенетическая Система

важных целесообразных биологических специальных программ (ЦБС)



ЭНДОДЕРМА (внутренний зародышевый слой) **МЕЗОДЕРМА**

(средний заро-

ЭКТОДЕРМА (наружный зародышевый слой)

Анаэробы могут

существовать без кислода. Всегда присутствют

Са-фаза в организме

ткани)

клетки+)

Аэробы Собираются в

ПК重 1 из окружающей среды.

Эволюция

белка

НН в стволе мозга Са-фаза

PcI-фаза Адено-са (опухоль ТВ распад опухоли

НН в мозжечке

РсІ-фаза Адено-са (опухоль ТВ распад опухоли клетки+)

НН в паренхиме головного мозга

Са-фаза: Некроз (потеря

Рсі-фаза: Восстановление некротизированных участков (ткани больше, чем до этого)

НН в коре головного мозга

Са-фаза:

РсІ-фаза: Эпителиальные язвы Заживление язв Кусковые

Защита от атаки

KCO

Территория / разлука

ДВУХФАЗНОЕ ПРОТЕКАНИЕ КОНФЛИКТОВ Стадия выздоровления Фаза озноба – эпи лептический кризис Конфликт Разрешение = СДХ конфликта Активная фаза конфликта ПКФ-1 ПКФ-2 КАФ Ночь Норматония Симпатикотония Ваготонная фаза Норматония a+6 = 6+2МНОГОФАЗНОЕ ПРОТЕКАНИЕ КОНФЛИКТОВ ОДНОФАЗНОЕ ПРОТЕКАНИЕ КОНФЛИКТОВ



Сенсорика и психотипы









Сверкунов

Артём Владимирович

Клинический психолог. Специалист в области лечебной физической культуры.

Общественный деятель.

Фонд развития человека «Стать»

vk.com/frchs

vk.com/zdravnica_rus

t.me/zdravnica_rus

+7-922-18-16-109

