






$K^-p \rightarrow \Lambda\pi^+\pi^-$: Λ, beam 735 MeV/c
p_Λ^{lab} [GeV/c]
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
θ_Λ^{lab} [degree]
10
1



K⁻p → Λπ⁺π⁻: π⁺, beam 735 MeV/c
p^lab_π⁺ [GeV/c]
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
θ^lab_π⁺ [degree]
10
1



K⁻p → Λπ⁺π⁻: π⁻, beam 735 MeV/c
$p^{lab}_{\pi^-}$ [GeV/c]
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
$\theta^{lab}_{\pi^-}$ [degree]
10
1


K⁻p → Λη: lab kinematics
p_Λ^{lab} [GeV/c]
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
2
4
6
8
10
12
14
θ_Λ^{lab} [degree]
10^3
10^2
10
1


Λη: lab θ = 2.0 ± 0.15 degree
Counts
10^3
10^2
10
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
p_Λ^lab [GeV/c]


Λη: lab θ = 4.0 ± 0.15 degree
Counts
10^3
10^2
10
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
p_Λ^lab [GeV/c]


Λη: lab θ = 6.0 ± 0.15 degree
Counts
10^3
10^2
10
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
p_Λ^lab [GeV/c]


Λη: lab θ = 7.0 ± 0.15 degree
Counts
10^3
10^2
10
1
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
p_Λ^lab [GeV/c]