

種類	イナビル (ラニナミビル)  〈吸入〉	リレンザ (ザナミビル)  〈吸入〉	タミフル (オセルタミビル)  〈内服〉	ゾフルーザ (パロキサビル マルボキシル)  〈内服〉	ラピアクタ (ラミビル)  〈静脈内注射〉
作用機序	ノイラミニダーゼ阻害	ノイラミニダーゼ阻害	ノイラミニダーゼ阻害	キャップ依存性 エンドヌクレアーゼ阻害	ノイラミニダーゼ阻害
用法用量 (成人)	(成人or10歳以上の小児) 【治療】 1回2キット(1回だけ) (単回投与) 【予防】 1回2キット(単回投与) または、1回1キット(2日間)	(成人及び小児) 【治療】 1日2回 1回2ブリスター (5日間) 【予防】 1日1回 1回1ブリスター (10日間)	(成人or小児37.5kg以上) 【治療】 1日2回 1回1Cap (5日間) 【予防】 1日1回 1回1Cap (7～10日間)	(成人or12歳以上の小児) 【治療・予防】 1回80mg(20mg×4錠) (体重80kg以上) 【治療・予防】 1回40mg(20mg×2錠) (体重80kg未満) ※治療&予防の用法用量は同じ	【治療】 1回600mgを15分で静注 (連日反復投与可能) 【予防】 予防適応なし
特徴	1回で終了 (簡単) - 薬剤トレーが透明 - うがいはいなくてもいい 10歳が用量変更の境目	- 手技が難しい 1ディスク=4ブリスター 1ディスク=1日分	- Cap・錠剤・DSがある 1回2mg/kg (1歳以上) 1回3mg/kg (0歳) - 幅広い年齢層に使える - 腎障害患者で減量が必要	1回で終了 (簡単) 80kgが用量変更の境目 - 主に肝代謝	- 基本、病院で使う - 重症な患者に - 嚥下困難な患者に - 幅広い年齢層に使える腎障害患者で減量が必要