國中自然 · 科普讀本

秋天為什麼會有「萬鷺朝鳳」？

先認識黃頭鷺。你看到的成群白鳥，很可能就是牠。



01 認得出

非繁殖季全身大致白色；繁殖季頭、頸、胸、背會帶橙黃。

02 說得出

牠跟牛、跟耕耘機，是為了抓住被驚起的昆蟲。

03 想得清

太興的山谷氣流讓南遷鳥群更容易被看見。群飛本身還不能確認每一群都是黃頭鷺。

照片記錄的是黃頭鷺群飛。嘉義太興的「萬鷺朝鳳」，是同一類鳥在山谷裡的秋季景象。

01 • 先認識牠

名字裡有「鷺」，生活卻常在草地

黃頭鷺屬於鷺科，又叫牛背鷺。很多人心中的白鷺，是站在水邊等魚的那種。黃頭鷺更常在草地、農田、牧場和開闊地走路找食物。



非繁殖季：身體大致是白的，遠看很容易被叫成白鷺鷥。印度西孟加拉。Tisha Mukherjee / CC BY-SA 4.0



繁殖季：頭、頸、喉、上胸和背部長出橙黃色羽毛，嘴也偏橙黃。塞浦路斯。Charles J. Sharp / CC BY-SA 4.0

一張身分證

中文名：黃頭鷺。別名：牛背鷺。學名多用 *Bubulcus ibis*。亞洲族群有時被另分成東方黃頭鷺。分類名稱會隨研究更新，你在野外看到的仍是同一類鳥。體長大約 46 到 56 公分。

牠吃的主要是昆蟲和小型動物，例如蚱蜢、蟋蟀、飛蟲，也會吃蚯蚓、蛙，以及其他小型脊椎動物。所以你在稻田、旱田看到「白鷺」，先別急著認定牠是來捕魚的。


02 • 怎麼辨認

飛行時，先看脖子



黃頭鷺飛行時通常把脖子縮起來，像一個「S」。夏威夷考艾島。ImagePerson / CC BY 4.0

鷺：脖子縮起　　**鶴：脖子伸直**



示意。看脖子，比只看「是不是白色」可靠。



容易認錯

小白鷺常在水邊

小白鷺嘴多是黑的，腳趾偏黃，較常在水邊找魚。黃頭鷺嘴在繁殖季偏橙黃，而且更常走上草地。南非。Alandmanson / CC BY-SA 4.0

野外四問

先問自己

1. 現在是繁殖季，還是非繁殖季？
2. 頭、頸、胸、背有沒有橙黃羽？
3. 飛起來時，脖子是縮著還是伸直？
4. 牠是在乾地走路，還是在水邊等魚？

只看到遠方一群白鳥，先記成「白色鷺科鳥類」。桃園、三峽一帶也可能看見黃頭鷺移動，但要看清羽色、嘴腳，或留下照片，才能確認那一群。

跟著牛，也跟著耕耘機



法國卡馬格：黃頭鷺走在牛附近。臺灣的黃頭鷺也會這樣，或改跟在耕耘機後面。Giles Laurent / CC BY-SA 4.0

牛走過草地，會把昆蟲驚起來。耕耘機翻土，會把土裡的昆蟲、蚯蚓翻出來。黃頭鷺跟在旁邊，找食物的效率就比較高。過去牠甚至會站上牛背，所以有了「牛背鷺」這個名字。

> **牠主要不是為了「幫牛除蟲」。比較準的說法是：牠會利用大型動物或農耕活動，把獵物驚出來。**

牠在吃什麼

地面上的小動物

蚱蜢、蟋蟀、飛蟲、蚯蚓、蛙，以及其他小型脊椎動物。覓食時會快走、小跑、停下來看，也會跳起來啄飛蟲。

和多數鷺不同

乾地是牠的餐桌

許多鷺科鳥類以魚為主，所以你在溪邊、海邊更容易遇到牠們。黃頭鷺則常出現在平地到中海拔的田、草原、牧場，清晨和黃昏也會成群往返覓食區與夜棲地。

不是所有黃頭鷺同一天離開

農業部鳥類資料指出：黃頭鷺在臺灣全年都可能見到，族群裡有夏候鳥、冬候鳥和過境個體。夏候鳥大約 9 月離臺南遷，隔年 3 月左右再回來繁殖。至於是不是有一部分全年留在臺灣，還需要更多研究。

時間	常見狀況
春季	一部分個體回到臺灣北部或其他繁殖地。
春、夏季	繁殖、育雛。這時較容易看見橙黃色繁殖羽。
8 月下旬到 10 月中旬	秋季南遷。大型群飛最容易出現在這段時間。
秋、冬季	有些往臺灣南部移動，有些繼續前往東南亞等較溫暖的地區。北方來的冬候鳥，也可能這時出現在臺灣。

三個詞

夏候鳥：春夏來繁殖，秋天往南。

冬候鳥：秋天從更北方來過冬。

過境：路經這裡，不是全程都留下。

讀資料時要留一句話

「秋天看得到南遷」很常見。這不代表臺灣每一隻黃頭鷺都在同一天、沿同一條路離開。看到一群鳥往南飛，是線索，不是全部個體的時刻表。

鳥友多年觀察，曾記錄鳥群由北往南，經過水庫、溪谷，其中包括雲林樟湖一帶，再到嘉義梅山。這些是觀察整理，不是每隻鳥都戴著追蹤器走出的固定航線。




05 · 萬鷺朝鳳

山谷裡有一段看不見的電扶梯

嘉義縣梅山鄉太興村的生毛樹溪谷，每年秋天常出現這個景象。鳥群飛進溪谷、盤旋，再越過山頭。數量很多時，遠看像一條白色長帶在山谷裡翻轉。當地把生毛樹溪一帶稱作「鳳凰穴」，於是有了「萬鷺朝鳳」這個名字。

這是地方對景象的稱呼，加上地方傳說，不是鳥類學的正式名稱。

賞鳥地點常被說成「阿里山」。更精確地說，是梅山鄉太興村，在阿里山風景區的旅遊範圍附近，不是阿里山森林遊樂區的高山核心。



1. 山坡被太陽曬熱，附近的暖空氣可能上升。
2. 山谷和山稜會改變風向，也可能形成向上的氣流。
3. 鳥群在上升氣流裡盤旋，先取得高度。
4. 到了合適高度，再向下一段路滑翔或振翅前進。

觀察紀錄提到，鳥群常沿雲林樟湖一帶飛來，進入生毛樹溪山谷，藉氣流飛行並變換隊形。牠們不一定是停下來休息或覓食。隊形散開又聚合，可能和每隻鳥在氣流中的路徑有關。目前能說明的是：鳥群會利用山谷氣流。還不宜把每一次隊形變化，都解釋成有一位固定隊長在下指令。

大型群飛大約出現在 8 月下旬到 10 月中旬。風景區與地方介紹，常把白露前後到雙十節前後當成觀察窗口。數量和出現時間受天候、風向影響，不會每天都一樣。

兩種群飛，不要混在一起

季節性南遷

秋天沿路往南

鳥群持續往同一方向移動，或在山谷盤旋升高後越過山稜，然後離開。太興村看到的「萬鷺朝鳳」，主要是這一種。

日常往返

早晚進出夜棲地

黃頭鷺本來就愛群居、集體夜棲。清晨、黃昏，牠們也會成群在覓食地和睡覺的樹林之間來去。這不一定是正在南遷。

成群飛，可能讓個體更容易跟上同伴，也一起使用同一段氣流。可是若沒有追蹤資料，就不要替某一群鳥編出「誰帶隊、誰決定方向」的故事。

下次可以記這五項

- ☐ 日期是不是落在 8 月下旬到 10 月。
- ☐ 身體是全白，還是頭頸胸背帶橙黃。
- ☐ 是一直往同一方向，還是在山谷升高後越嶺。
- ☐ 是在附近來回，還是成批飛過、逐漸離開。
- ☐ 當天的風和地形。鳥況每天都可能不同。

友善，也守規定

保持安靜，站在不妨礙居民的安全位置。不追鳥、不投食，也不要為了靠近而走進農田或私人地。

2026 年太興村這季，嘉義縣公告：9 月 11 日到 10 月 31 日，距地面約 122 公尺（400 呎）以下禁止無人機。違規可能被罰 3 萬到 15 萬元。

這是今年這季的規定。以後再去，先查民航局無人機系統或縣府最新公告。

07 · 想一想

先自己答，再往下對

1. 黃頭鷺為什麼又叫牛背鷺？
2. 非繁殖季的黃頭鷺，為什麼遠看很像白鷺鷥？
3. 飛行時，怎樣用脖子分辨鷺和鶴？
4. 「萬鷺朝鳳」是正式學名，還是地方對景象的稱呼？
5. 看到山谷裡隊形一直在變，為什麼不宜說「一定有隊長在下令」？

1. 因為牠常出現在牛附近，甚至站上牛背，等牛走路時驚起昆蟲。現在也常跟在耕耘機後面。
2. 非繁殖季身體大致是白的。要再看嘴、腳、環境，以及有沒有橙黃繁殖羽。
3. 鷺飛行時通常把脖子縮起來；鶴把脖子伸直。
4. 是太興村一帶對秋季群飛景象的稱呼，和「鳳凰穴」的地方說法有關，不是正式學名。
5. 目前觀察能說明的是鳥群會利用山谷氣流。沒有追蹤每一隻鳥之前，不能斷定隊形變化等於有人在指揮。

一句話

> **你看到的很可能是黃頭鷺的秋季南遷。牠們平時在草地、農田找蟲，秋天沿山線移動；太興的山谷氣流讓這段路更容易被人看見，於是有了「萬鷺朝鳳」。**

資料與圖片

- 農業知識入口網〈黃頭鷺〉：遷留型態、棲地與食性。kmweb.moa.gov.tw
- 嘉義縣政府 115 年 9 月 7 日府建道管字第 11502411191 號公告；交通部民航局遙控無人機管理資訊系統。
- 嘉義縣文化觀光局 2026 年說明：太興村黃頭鷺約於 8 月下旬至 10 月中旬南遷，並設臨時禁航。
- 封面群飛：Treysam，CC BY-SA 4.0。繁殖羽與頭部特徵見第 2 頁。飛行：ImagePerson，CC BY 4.0。牛旁：Giles Laurent，CC BY-SA 4.0。非繁殖季草地：Tisha Mukherjee，CC BY-SA 4.0。小白鷺：Alandmanson，CC BY-SA 4.0。剖面與比較圖為本教材繪製。
- 照片多攝於印度、塞浦路斯、法國、夏威夷、南非，用來說明種類特徵，不是太興村實景。分類名稱以農業部常用的 *Bubulcus ibis* 為主。