

Họ và tên thí sinh: Lớp: MÃ ĐỀ: 000

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Đáp án đúng in đậm màu đỏ)

Câu 1: Hàm số $y = f(x)$ có $f'(x) = x(x - 2)(x + 1)$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào?

- A. **(-1; 0).** B. **(2; $+\infty$).**
C. **(0; 2).** D. **($-\infty$; -1).**

Câu 2: Đồ thị hàm số $y = (2x - 1)/(x + 1)$ có đường tiệm cận đứng là:

- A. **$x = 2$.** B. **$x = -1$.**
C. **$y = 2$.** D. **$y = -1$.**

Câu 3: Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ là:

- A. **M(1; 0).** B. **N(-1; 4).**
C. **P(0; 2).** D. **Q(2; 4).**

Câu 4: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + \cos x$ là:

- A. **$F(x) = x^3 - \sin x + C$.** B. **$F(x) = x^3 + \sin x + C$.**
C. **$F(x) = 6x + \sin x + C$.** D. **$F(x) = x^3 + \cos x + C$.**

Câu 5: Mặt cầu (S): $(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 16$ có tâm I và bán kính R là:

- A. **I(1; -2; 3), R = 4.** B. **I(-1; 2; -3), R = 4.**
C. **I(1; -2; 3), R = 16.** D. **I(-1; 2; -3), R = 16.**

Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho vector $a = (1; 2; -1)$ và vector $b = (2; 0; 1)$. Tọa độ vector $u = a + 2b$ là:

- A. **$u = (5; 2; 1)$.** B. **$u = (3; 2; 0)$.**
C. **$u = (5; 4; 1)$.** D. **$u = (4; 2; -1)$.**

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Ý Đúng in đậm màu đỏ, ý Sai không tô màu)

Câu 1: Cho hàm tổng chi phí $C(x) = x^3 - 30x^2 + 400x + 500$ (nghìn đồng) với $0 \leq x \leq 25$:

- a) **Chi phí cố định khi $x = 0$ là 500 nghìn đồng.**
b) **Chi phí biên tại mức sản lượng $x = 10$ là $C'(10) = 100$ nghìn đồng.**
c) Chi phí trung bình luôn giảm khi sản lượng tăng từ 0 đến 25.
d) Tổng chi phí sản xuất nhỏ nhất khi $x = 20$ sản phẩm.

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho A(1; 0; 2), B(-1; 1; 3), C(3; 2; 1) và (P): $2x - y + 2z - 5 = 0$:

- a) **Trọng tâm G của tam giác ABC là G(1; 1; 2).**
b) **Mặt phẳng (P) có vector pháp tuyến $n = (2; -1; 2)$.**
c) Điểm A(1; 0; 2) nằm trên mặt phẳng (P).
d) Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (P) bằng 1.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (Đáp án in đậm màu đỏ)

Câu 1: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^2 + 4x + 5$ trên $[0; 3]$.

Đáp án: 9

Câu 2: Tính tích phân $I = \int (2x + 1)dx$ từ 0 đến 3.

Đáp án: 12

Câu 3: Mặt cầu (S) tâm I(1; 1; 2) đi qua A(2; -1; 4) có bán kính R bằng bao nhiêu?

Đáp án: 3

PHẦN IV. Câu tự luận (Hướng dẫn chấm in đậm màu đỏ)

Câu 1 (1,5 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với (ABCD) và $SA = a\sqrt{3}$. Tính theo a thể tích V.

Hướng dẫn chấm: $V = (1/3) * a^2 * a\sqrt{3} = (a^3\sqrt{3})/3$ (1,5 điểm)

Câu 2 (1,0 điểm): Một ô tô chạy $v_0 = 10$ m/s đạp phanh với $a(t) = -2t$ (m/s²). Tính quãng đường đến khi dừng hẳn.

Hướng dẫn chấm: Dừng khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = \sqrt{10}$; $s = \int (10 - t^2)dt = (20\sqrt{10})/3 \approx 21,08$ mét (1,0 điểm)

----- HẾT -----

BẢNG ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI MẪU

MÔN: TOÁN (LỚP 12) - MÃ ĐỀ: 000

I. BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN I (TRẮC NGHIỆM 4 LỰA CHỌN)

Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: B Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: A

II. BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN II (TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI)

Câu 1: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai

Câu 2: a) Đúng | b) Đúng | c) Sai | d) Sai

III. BẢNG ĐÁP ÁN PHẦN III (TRẢ LỜI NGẮN)

Câu 1: 9 Câu 2: 12 Câu 3: 3

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM PHẦN IV (TỰ LUẬN)

Câu 1 (1,5 điểm):

• Diện tích đáy: $S_{ABCD} = a^2$ (0,5 điểm). Chiều cao: $SA = a\sqrt{3}$ (0,5 điểm).

• Thể tích: $V = \frac{1}{3} * a^2 * a\sqrt{3} = \frac{a^3\sqrt{3}}{3}$ (0,5 điểm).

Câu 2 (1,0 điểm):

• $v(t) = 10 - t^2$ (m/s). Xe dừng khi $v(t) = 0 \Leftrightarrow t = \sqrt{10}$ (s) (0,5 điểm).

• $s = \int (10 - t^2) dt$ từ 0 đến $\sqrt{10} = \frac{20\sqrt{10}}{3} \approx 21,08$ mét (0,5 điểm).