

# Zamfirescu Dönüşümünün Bir Genelleştirmesi

Hakan ERGÜL

Atatürk Üniversitesi

April 2, 2016

## Bazı ünlü Sabit Nokta Teoremleri

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

- (Banach Daralma İlkesi[1])

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$$

[B]



## Bazı ünlü Sabit Nokta Teoremleri

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

- (Banach Daralma İlkesi[1])

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y) \quad [B]$$

- (Kannan Dönüşümü[2])

$$d(f(x), f(y)) \leq \frac{\alpha}{2} \{d(x, f(x)) + d(y, f(y))\} \quad [K]$$

□

## Bazı ünlü Sabit Nokta Teoremleri

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

- (Banach Daralma İlkesi[1])

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y) \quad [B]$$

- (Kannan Dönüşümü[2])

$$d(f(x), f(y)) \leq \frac{\alpha}{2} \{d(x, f(x)) + d(y, f(y))\} \quad [K]$$

- (Chatterjea Dönüşümü[3])

$$d(f(x), f(y)) \leq \frac{\alpha}{2} \{d(x, f(y)) + d(y, f(x))\} \quad [C]$$

□

# Bazı ünlü Sabit Nokta Teoremleri

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

- (Banach Daralma İlkesi[1])

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y) \quad [B]$$

- (Kannan Dönüşümü[2])

$$d(f(x), f(y)) \leq \frac{\alpha}{2} \{d(x, f(x)) + d(y, f(y))\} \quad [K]$$

- (Chatterjea Dönüşümü[3])

$$d(f(x), f(y)) \leq \frac{\alpha}{2} \{d(x, f(y)) + d(y, f(x))\} \quad [C]$$

şartını sağlıyorsa,  $f$  dönüşümünün bu uzayda bir tek sabit noktası vardır.

□

# Zamfirescu Dönüşümü

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  ve  $\beta, \gamma \in [0, \frac{1}{2})$  olmak üzere her  $x, y \in X$  için aşağıdakilerden en az biri doğrudur:

- $d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$
- $d(f(x), f(y)) \leq \beta \{d(x, f(x)) + d(y, f(y))\}$
- $d(f(x), f(y)) \leq \gamma \{d(x, f(y)) + d(y, f(x))\}$
- 

## Not

- Zamfirescu dönüşümü tam metrik uzayda bir tek sabit noktaya yakınsar.

# Zamfirescu Dönüşümü

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  ve  $\beta, \gamma \in [0, \frac{1}{2})$  olmak üzere her  $x, y \in X$  için aşağıdakilerden en az biri doğrudur:

- $d(f(x), f(y)) \leq \alpha d(x, y)$
- $d(f(x), f(y)) \leq \beta \{d(x, f(x)) + d(y, f(y))\}$
- $d(f(x), f(y)) \leq \gamma \{d(x, f(y)) + d(y, f(x))\}$
- 

## Not

- Zamfirescu dönüşümü tam metrik uzayda bir tek sabit noktaya yakınsar.
- Rhoades[] 'deki *Theorem 1. (xiv) ve (xxv)*' den Zamfirescu dönüşümünün,  $[\beta]$ ,  $[\kappa]$  ve  $[c]$ 'den daha genel olduğu görülür.

Şimdi Zamfirescu dönüşümünden daha genel olan aşağıdaki lemmayı verelim:



Şimdi Zamfirescu dönüşümünden daha genel olan aşağıdaki lemmayı verelim:

Şimdi Zamfirescu dönüşümünden daha genel olan aşağıdaki lemmayı verelim:

### Lemma

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha \max \left\{ d(x, y), \frac{1}{2} [d(x, f(x)) + d(y, f(y))], \frac{1}{2} [d(y, f(x)) + d(y, f(x))] \right\}$$

şartını sağlıyorsa bu dönüşüm bir tek sabit noktası vardır. □

Şimdi Zamfirescu dönüşümünden daha genel olan aşağıdaki lemmayı verelim:

### Lemma

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha \max \left\{ d(x, y), \frac{1}{2} [d(x, f(x)) + d(y, f(y))], \frac{1}{2} [d(y, f(x)) + d(y, f(x))] \right\}$$

şartını sağlıyorsa bu dönüşüm bir tek sabit noktası vardır. □

Şimdi Zamfirescu dönüşümünden daha genel olan aşağıdaki lemmayı verelim:

### Lemma

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha \max \left\{ d(x, y), \frac{1}{2} [d(x, f(x)) + d(y, f(y))], \frac{1}{2} [d(y, f(x)) + d(y, f(x))] \right\}$$

şartını sağlıyorsa bu dönüşüm bir tek sabit noktası vardır. □

### Not

Şimdi Zamfirescu dönüşümünden daha genel olan aşağıdaki lemmayı verelim:

### Lemma

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha \max \left\{ d(x, y), \frac{1}{2} [d(x, f(x)) + d(y, f(y))], \frac{1}{2} [d(y, f(x)) + d(y, f(x))] \right\}$$

şartını sağlıyorsa bu dönüşüm bir tek sabit noktası vardır. □

### Not

- ❶ Zamfirescu dönüşümünden tam metrik uzayda bir tek sabit noktaya yakınsar.

Şimdi Zamfirescu dönüşümünden daha genel olan aşağıdaki lemmayı verelim:

### Lemma

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha \max \left\{ d(x, y), \frac{1}{2} [d(x, f(x)) + d(y, f(y))], \frac{1}{2} [d(y, f(x)) + d(y, f(x))] \right\}$$

şartını sağlıyorsa bu dönüşüm bir tek sabit noktası vardır. □

### Not

- ① Zamfirescu dönüşümünden tam metrik uzayda bir tek sabit noktaya yakınsar.
- ② Rhoades[] 'deki *Theorem 1.* (xxv)' de görüldüğü gibi yukarıdaki lemma, Zamfirescu dönüşümünden daha geneldir.

Şimdi Zamfirescu dönüşümünden daha genel olan aşağıdaki lemmayı verelim:

### Lemma

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\alpha \in [0, 1)$  olmak üzere

$$d(f(x), f(y)) \leq \alpha \max \left\{ d(x, y), \frac{1}{2} [d(x, f(x)) + d(y, f(y))], \frac{1}{2} [d(y, f(x)) + d(y, f(x))] \right\}$$

şartını sağlıyorsa bu dönüşüm bir tek sabit noktası vardır. □

### Not

- ① Zamfirescu dönüşümünden tam metrik uzayda bir tek sabit noktaya yakınsar.
- ② Rhoades[] 'deki *Theorem 1. (xxv)* de görüldüğü gibi yukarıdaki lemma, Zamfirescu dönüşümünden daha geneldir.
- ③ Dolayısıyla lemmada verilen şartları sağlayan dönüşüm,  $[B]$ ,  $[K]$  ve  $[C]$ 'den daha geneldir.

## Theorem

$(X, d)$  tam metrik uzay ve  $f : X \rightarrow X$  bir dönüşüm,  $\psi, \phi : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$  sürekli fonksiyonlar ayrıca  $\psi$  azalmayan ve  $\phi(x) = 0 \iff x = 0$  ve

$$M(x, y) := \left\{ d(x, y), \frac{d(x, f(x)) + d(y, f(y))}{2}, \frac{d(x, f(y)) + d(y, f(x))}{2} \right\} \quad (1)$$

olmak üzere her  $x, y \in X$  için

$$\psi(d(f(x), f(y))) \leq \psi(M(x, y)) - \phi(M(x, y)) \quad (2)$$

eşitsizliğini sağlayan  $f$  dönüşümünün bir tek sabit noktası vardır. □





## Lemma

*Ana Teorem'de verilen şartlarla birlikte  $\{M(x_n, x_{n+1})\}$  dizisi için  $M(x_n, x_{n+1}) \rightarrow 0$  dir.*

## Lemma

*Ana Teorem'de verilen şartlarla birlikte  $\{M(x_n, x_{n+1})\}$  dizisi için  $M(x_n, x_{n+1}) \rightarrow 0$  dir.*

## Lemma

Ana Teorem'de verilen şartlarla birlikte  $\{M(x_n, x_{n+1})\}$  dizisi için  $M(x_n, x_{n+1}) \rightarrow 0$  dir.

## Proof.

$$\begin{aligned} M(x_n, x_{n+1}) &= \max \left\{ d(x_n, x_{n+1}), \frac{d(x_n, f(x_n)) + d(x_{n+1}, f(x_{n+1}))}{2}, \right. \\ &\quad \left. \frac{d(x_n, f(x_{n+1})) + d(x_{n+1}, f(x_n))}{2} \right\} \\ &= \max \left\{ d(x_n, x_{n+1}), \frac{d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2})}{2}, \right. \\ &\quad \left. \frac{d(x_n, x_{n+2}) + d(x_{n+1}, x_{n+1})}{2} \right\} \\ &= \max \left\{ d(x_n, x_{n+1}), \frac{d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2})}{2} \right\} \end{aligned}$$



## Lemma

Ana Teorem'de verilen şartlarla birlikte  $\{M(x_n, x_{n+1})\}$  dizisi için  $M(x_n, x_{n+1}) \rightarrow 0$  dir.

## Proof.

$$\begin{aligned} M(x_n, x_{n+1}) &= \max \left\{ d(x_n, x_{n+1}), \frac{d(x_n, f(x_n)) + d(x_{n+1}, f(x_{n+1}))}{2}, \right. \\ &\quad \left. \frac{d(x_n, f(x_{n+1})) + d(x_{n+1}, f(x_n))}{2} \right\} \\ &= \max \left\{ d(x_n, x_{n+1}), \frac{d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2})}{2}, \right. \\ &\quad \left. \frac{d(x_n, x_{n+2}) + d(x_{n+1}, x_{n+1})}{2} \right\} \\ &= \max \left\{ d(x_n, x_{n+1}), \frac{d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2})}{2} \right\} \end{aligned}$$



elde ederiz. Burada iki durum söz konusu olur:

Durum 1.  $M(x_n, x_{n+1}) = d(x_n, x_{n+1})$  olması halinde :

$$\begin{aligned}\psi(d(x_{n+1}, x_{n+2})) &= \psi(d(f(x_n), f(x_{n+1}))) \\ &\leq \psi(d(x_n, x_{n+1})) - \phi(d(x_n, x_{n+1})) \\ &\leq \psi(d(x_n, x_{n+1}))\end{aligned}$$

olup  $\psi$  azalmayan olduğundan

$$d(x_{n+1}, x_{n+2}) \leq d(x_n, x_{n+1})$$

dır. Yani  $\{d(x_n, x_{n+1})\}$  dizisi azalandır.

Durum 2.  $M(x_n, x_{n+1}) = \frac{1}{2}(d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2}))$  olması hali :

O halde

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq \frac{1}{2}(d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2})) \quad (3)$$

$$\leq d(x_{n+1}, x_{n+2}) \quad (4)$$

olur. Ayrıca

$$\psi(d(x_{n+1}, x_{n+2})) = \psi(d(f(x_n), f(x_{n+1}))) \quad (5)$$

$$\leq \psi\left(\frac{d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2})}{2}\right) \quad (6)$$

$$= \phi\left(\frac{d(x_n, x_{n+1}) + d(x_{n+1}, x_{n+2})}{2}\right) \quad (7)$$

$$\leq \psi(d(x_n, x_{n+1})) \quad (8)$$

olup  $\psi$  azalmayan olduğundan

$$d(x_{n+1}, x_{n+2}) \leq d(x_n, x_{n+1})$$

dır. Bu ise (2) eşitsizliği ile çelişir.

## Lemmanın Sonucu:

Sonuç olarak  $M(x_n, x_{n+1}) = d(x_n, x_{n+1})$  dır. O halde  $\{d(x_n, x_{n+1})\}$  dizisi monoton azalan(armayan) bir dizidir ve bir  $r \geq 0$  sayısına yakınsar. Bu bilgiyi kullanırsak

$$\psi(d(x_{n+1}, x_{n+2})) \leq \psi(d(x_n, x_{n+1})) - \phi(d(x_n, x_{n+1}))$$

olup  $n \rightarrow \infty$  iken limitini alırsak

$$\psi(r) \leq \psi(r) - \phi(r)$$

elde ederiz ki bu  $r = 0$  olmasını gerektirir. Sonuç olarak  $\{d(x_n, x_{n+1})\} \rightarrow 0$ . □



## Ana Teoremin İspatı

Öncelikle  $\{x_n\}$  dizisinin Cauchy dizisi olduğunu gösterelim. Varsayalım ki  $\{x_n\}$  bir Cauchy dizisi olmasın. O halde  $\{x_n\}$  dizisinin öyle iki  $\{x_{n(k)}\}$  ve  $\{x_{m(k)}\}$  alt dizisi vardır ki  $\varepsilon_0 > 0$  olmak üzere  $m(k) > n(k) \geq k$  olacak şekildeki her  $k \in \mathbb{N}$  için

$$d(x_{m(k)}, x_{n(k)}) \geq \varepsilon_0$$

dır. Dahası yukarıdaki şartları sağlayan  $m(k)$  sayısını  $n(k)$  dan büyük en küçük sayı olarak seçersek

$$d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)}) < \varepsilon_0$$

elde ederiz. Buradan

$$\varepsilon_0 \leq d(x_{m(k)}, x_{n(k)}) \quad (9)$$

$$\leq d(x_{m(k)}, x_{m(k)-1}) + d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)}) \quad (10)$$

$$< d(x_{m(k)}, x_{m(k)-1}) + \varepsilon_0 \quad (11)$$

olup  $k \rightarrow \infty$  iken

$$d(x_{m(k)}, x_{n(k)}) \rightarrow \varepsilon_0 \quad (12)$$

olur.

## Ana Teoremin İspatı

Yine

$$d(x_{m(k)}, x_{n(k)}) \leq d(x_{m(k)}, x_{m(k)-1}) + d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)-1}) + d(x_{n(k)-1}, x_{n(k)}) \quad (13)$$

$$\leq d(x_{m(k)}, x_{m(k)-1}) + d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)}) + d(x_{n(k)}, x_{n(k)-1}) \quad (14)$$

$$+ d(x_{n(k)-1}, x_{n(k)}) \quad (15)$$

eşitsizliğinde  $k \rightarrow \infty$  iken limit alırsak

$$d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)-1}) \rightarrow \varepsilon_0 \quad (16)$$

elde ederiz.

## Ana Teoremin İspatı

Benzer olarak

$$d(x_{m(k)}, x_{n(k)}) \leq d(x_{m(k)}, x_{m(k)-1}) + d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)}) \quad (17)$$

$$\leq d(x_{m(k)}, x_{m(k)-1}) + d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)-1}) + d(x_{n(k)-1}, x_{n(k)}) \quad (18)$$

eşitsizliğinde  $k \rightarrow \infty$  iken limit alırsak

$$d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)}) \rightarrow \varepsilon_0 \quad (19)$$

buluruz.

## Ana Teoremin İspatı

Ayrıca

$$d(x_{m(k)}, x_{n(k)}) \leq d(x_{m(k)}, x_{n(k)-1}) + d(x_{n(k)-1}, x_{n(k)}) \quad (20)$$

$$\leq d(x_{m(k)}, x_{m(k)-1}) + d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)-1}) + d(x_{n(k)-1}, x_{n(k)}) \quad (21)$$

eşitsizliğinde  $k \rightarrow \infty$  iken limit alırsak

$$d(x_{m(k)}, x_{n(k)-1}) \rightarrow \varepsilon_0 \quad (22)$$

elde ederiz.

## Ana Teoremin İspatı

Sonuç olarak Diğer yandan

$$\psi(\varepsilon_0) \leq \psi(d(x_{m(k)}, x_{n(k)})) \quad (23)$$

$$= \psi(d(fx_{m(k)-1}, fx_{n(k)-1})) \quad (24)$$

$$\leq \psi(M(x_{m(k)-1}, x_{n(k)-1})) - \phi(M(x_{m(k)-1}, x_{n(k)-1})) \quad (25)$$

dır. Burada (12), (16), (19) ve (22) deki bilgileri kullanırsak

$$\lim_{k \rightarrow \infty} M(x_{m(k)-1}, x_{n(k)-1}) = \lim_{k \rightarrow \infty} \max \left\{ d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)-1}), \quad (26)$$

$$\frac{1}{2} [d(x_{m(k)-1}, x_{m(k)}) + d(x_{n(k)-1}, x_{n(k)})], \quad (27)$$

$$\frac{1}{2} [d(x_{m(k)-1}, x_{n(k)}) + d(x_{m(k)}, x_{n(k)-1})] \left\} \quad (28)$$

$$= \max\{\varepsilon_0, 0, \varepsilon_0\} \quad (29)$$

$$= \varepsilon_0 \quad (30)$$

elde ederiz.

## Ana Teoremin İspatı

Bunu (25)'te yerine yazarsak

$$\psi(\varepsilon_0) \leq \psi(\varepsilon_0) - \phi(\varepsilon_0) \quad (31)$$

olup  $\phi(\varepsilon_0) \leq 0$  olur ki bu da  $\varepsilon_0 = 0$  olmasını gerektirir. Bu ise baştaki kabulümüzle çelişir. Demekki kabulümüz yanlıştır. Yani  $\{x_n\}$  bir Cauchy dizisidir.  $(X, d)$  tam metrik uzay olduğu için  $\{x_n\}$  bu uzayda bir  $x^*$  noktasına yakınsar. Buradan hareketle

$$\lim_{n \rightarrow \infty} M(x_n, x^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} \max \left\{ d(x_n, x^*), \frac{1}{2} [d(x_n, x_{n+1}) + d(x^*, fx^*)], \right. \quad (32)$$

$$\left. \frac{1}{2} [d(x_n, fx^*) + d(x^*, x_{n+1})] \right\} \quad (33)$$

$$= \frac{d(x^*, fx^*)}{2} \quad (34)$$

elde ederiz. Bu bilgiyi (2) de yerine yazarsak  $n \rightarrow \infty$

$$\psi(d(x^*, fx^*)) \leq \psi\left(\frac{d(x^*, fx^*)}{2}\right) - \phi\left(\frac{d(x^*, fx^*)}{2}\right) \quad (35)$$