WEEK 07 TBL REVIEW (MEDICINE)

مراجعة التعلم القائم على الفريق – الأسبوع السابع

Medicine – Week 07 – 12 single-best-answer questions (suggested answers)

الطب – الأسبوع السابع – 12 سؤالاً بإجابة واحدة صحيحة (إجابات مقترحة)

1. GLUTEAL REGION AND LOWER-LIMB NERVES | المنطقة الألوية وأعصاب الطرف السفلي

Q1 – Nerve below piriformis | س1 – العصب تحت الكمثري

The large nerve emerging **inferior to the piriformis** is the **sciatic nerve**; it supplies the skin of the **lateral leg and foot**.

العصب الكبير الذي يخرج **أسفل العضلة الكمثرية** هو **العصب الوركي**؛ وهو يغذي جلد **الساق الوحشية والقدم**.

- It is **not** responsible for hip adduction (obturator nerve).

  وهو **ليس** المسؤول عن ضم الورك (العصب السدادي).

- It does **not** innervate all the gluteal muscles.

  وهو **لا** يعصّب جميع عضلات المنطقة الألوية.

- It does **not** give sensation to the medial aspect of the leg.

  وهو **لا** يعطي الحس للجانب الإنسي من الساق.

Q3 – Lateral thigh burning | س3 – حرقة الفخذ الوحشية

Burning and tingling over the **lateral thigh** that worsens with tight belts: the **lateral femoral cutaneous nerve**.

الحرقة والتنميل على **الفخذ الوحشي** اللذان يزدادان مع الأحزمة الضيقة: **العصب الجلدي الفخذي الوحشي**.

Q7 and Q12 – Femur and patella | س7 وس12 – عظم الفخذ والرضفة

In a **distal femur fracture**, the distal fragment is pulled **posteriorly** by the **gastrocnemius**.

في **كسر الفخذ السفلي** ينسحب الجزء البعيد **إلى الخلف** بفعل **العضلة التوأمية (الساقية)**.

Preventing **lateral dislocation of the patella**: the **forward projection of the lateral femoral condyle** (likely intended answer).

منع **الخلع الوحشي للرضفة**: **الإسقاط الأمامي للقُتَيْن الفخذي الوحشي** (الإجابة المرجّحة).

> Trochlear groove depth also contributes, so the options overlap; confirm the official key.
>
> عمق الأخدود المِرْقيّ يساهم أيضاً لذلك تتداخل الخيارات؛ يُرجى التأكد من المفتاح الرسمي.

2. NEOPLASIA | الأورام

Benign and Malignant Neoplasms | الأورام الحميدة والخبيثة

Benign (Q9) الحميدة	Malignant (Q4, Q5) الخبيثة
Composed of **well-differentiated cells** تتألف من **خلايا متمايزة جيداً**	May show **loss of differentiation** قد تُظهر **فقدان التمايز**
No rapid growth, invasion or metastasis لا نمو سريع ولا غزو ولا انبثاث	**Anaplasia:** large hyperchromatic nuclei, abnormal mitosis, severe pleomorphism **فقدان التصنّع:** نوى كبيرة شديدة التلوّن، انقسام غير طبيعي، تعدد أشكال شديد

> **Low normal mitosis** is NOT a feature of anaplasia.
>
> **الانقسام المنخفض الطبيعي** ليس من صفات فقدان التصنّع.

Classification and Dysplasia | التصنيف وعسر التنسج

- **Squamous cell carcinoma** of the skin is a **malignant epithelial neoplasm** (Q8).

سرطانة الخلايا الحرشفية في الجلد **ورم ظهاري خبيث** (س8).

- **Lymphoma** is a **lymphoid neoplasm** (Q11).

اللمفوما ورم لمفاوي (س11).

Dysplasia (Q6): the likely intended answer is **carcinoma in situ**, only for full-thickness epithelial dysplasia with an intact basement membrane.

عسر التنسج (س6): الإجابة المرجّحة هي **السرطانة في الموضع**، وذلك فقط لعسر التنسج الظهاري كامل السماكة مع غشاء قاعدي سليم.

> Dysplasia does not always progress to cancer; the question wording is imperfect, so confirm the official key.
>
> لا يتطور عسر التنسج دائماً إلى سرطان؛ وصياغة السؤال غير دقيقة لذلك يُرجى التأكد من المفتاح الرسمي.

3. ANTICANCER DRUGS | أدوية السرطان

Q2 and Q10 | س2 وس10

The **antiestrogen** used for postmenopausal women with metastatic breast cancer is **tamoxifen**.

مضاد الإستروجين المستخدم لدى النساء بعد سن اليأس المصابات بسرطان الثدي المنتشر هو **التاموكسيفين**.

- Topotecan, tacrolimus, paclitaxel and lomustine are not antiestrogens.

التوبوتيكان والتاكروليموس والباكليتاكسيل واللوموستين ليست مضادات إستروجين.

Alkylating agents: busulfan, lomustine, carmustine and chlorambucil.

العوامل الألكيلية: البوسولفان واللوموستين والكارموستين والكلورامبوسيل.

> **Methotrexate** is NOT an alkylating agent (it is an antimetabolite).
>
> **الميثوتريكسات** ليس عاملاً ألكيلياً (فهو مضاد استقلاب).