

BONE FRACTURE

كسور العظام

التصنيف • الصورة السريرية • الإسعافات الأولية | Classification • Clinical Picture • First Aid

1. CLASSIFICATION & CLINICAL PICTURE | التصنيف والصورة السريرية

1. Classification of Fractures

1. تصنيف الكسور

According to skin (حسب الجلد)

- Closed (simple) (المغلق (البسيط))
- Open (compound) (المفتوح (المركب))

According to fracture line (حسب خط الكسر)

- Transverse (المستعرض)
- Oblique (المائل)
- Spiral (الحلزوني)
- Comminuted (المفتت)

According to displacement (حسب الانزياح)

- Undisplaced (غير المنزاح)
- Displaced (المنزاح)

(Figures: open fracture vs. closed fracture (drawings, photo and X-ray); transverse, oblique, spiral and comminuted fracture lines of the femur; "Closed vs. open fractures".)

(الأشكال: الكسر المفتوح مقابل الكسر المغلق (رسوم، صورة، وصورة شعاعية)؛ خطوط الكسر المستعرض والمائل والحلزوني والمفتت في عظم الفخذ؛ "الكسور المغلقة مقابل المفتوحة".)

2. Clinical Picture

2. الصورة السريرية

- **Pain** — usually severe and worsened by movement.

الألم — شديد عادةً ويزداد مع الحركة.

- Swelling and tenderness.

التورم والألم عند الجس.

- Bruising or discoloration.

الكدمات أو تغير اللون.

- Deformity.

التشوه.

- Loss of function / inability to use the limb.

فقدان الوظيفة / عدم القدرة على استخدام الطرف.

- Abnormal mobility and possible crepitus (do not test deliberately).

حركة غير طبيعية واحتمال وجود فرقعة (لا تختبرها عمداً).

- **Open fracture:** wound and possible exposed bone.

الكسر المفتوح: جرح مع احتمال ظهور العظم.

2. FIRST AID | الإسعافات الأولية

3. First Aid

3. الإسعافات الأولية

- Ensure safety and call emergency medical services.
تأكد من السلامة واتصل بخدمات الطوارئ الطبية.
- Immobilize/splint in the position found.
ثبّت/جبر الطرف في الوضع الذي وُجد عليه.
- Support the joints above and below the suspected fracture.
اسند المفاصلين أعلى الكسر المشتبه به وأسفله.
- Do NOT straighten or realign the bone.
لا تحاول تقويم العظم أو إعادة محاذاته.
- For open fractures: cover the wound with a clean/sterile dressing.
في الكسور المفتوحة: غطّ الجرح بضماد نظيف/معقم.
- Do NOT push exposed bone back inside.
لا تدفع العظم الظاهر إلى الداخل.

(Figure: splinting – A: whole-body immobilization; B: forearm splint; lower-limb splint.)

(الشكل: التجبير – A: تثبيت الجسم بالكامل؛ B: جبيرة الساعد؛ جبيرة الطرف السفلي.)

4. Additional First Aid

4. إسعافات أولية إضافية

- Apply a cold pack wrapped in cloth near the injury.
ضع كمادة باردة ملفوفة بقطعة قماش قرب الإصابة.
- Do not apply ice directly to the skin.
لا تضع الثلج مباشرة على الجلد.
- Keep the person warm and reassured.
حافظ على دفء المصاب وطمأنته.
- Avoid food or drink if surgery/anesthesia may be required.
تجنب إعطاء الطعام أو الشراب إذا كانت الجراحة/التخدير محتملة.

Emergency Signs

علامات الطوارئ

- Severe or uncontrolled bleeding.
نزف شديد أو غير مسيطر عليه.
- Difficulty breathing or loss of consciousness.
صعوبة في التنفس أو فقدان الوعي.
- Suspected spinal or pelvic injury.
اشتباه إصابة العمود الفقري أو الحوض.
- Absent pulse distal to the injury.
غياب النبض أسفل الإصابة.

- Cold, pale, or blue limb.

طرف بارد أو شاحب أو أزرق.

These require immediate emergency medical care.

هذه الحالات تتطلب رعاية طبية طارئة فورية.

(Figure – bleeding control: pressure with hands; apply dressing and press; tourniquet – wrap, wind, secure, time.)

(الشكل – السيطرة على النزف: الضغط باليدين؛ وضع الضماد والضغط؛ العاصبة – اللف، الشد، التثبيت، تسجيل الوقت.)

Key Points

النقاط الرئيسية

- **Recognize:** pain, swelling, deformity, and loss of function.
- **Protect:** keep the fracture still and splint appropriately.
- Do not manipulate or straighten the fracture.
- Control bleeding and cover open wounds.
- Check circulation and sensation before and after splinting.
- Seek professional medical assessment.

التعرّف: الألم، والتورم، والتشوه، وفقدان الوظيفة.

الحماية: أبقِ الكسر ثابتاً وجبّه بشكل مناسب.

لا تحرك الكسر ولا تحاول تقويمه.

سيطر على النزف وغطّ الجروح المفتوحة.

تحقق من الدوران والإحساس قبل التجبير وبعده.

اطلب تقييماً طبياً متخصصاً.