PRESENTING PROBLEMS IN GASTROINTESTINAL DISEASE

الأعراض الهضمية الشائعة

Prof. Hassan Nassrullah – Internal Medicine
أ.د. حسن نصر الله – الطب الباطني

1. DYSPHAGIA | عسر البلع

Definitions and classification | التعاريف والتصنيف

- **Dysphagia** is **difficulty in swallowing**; it may coexist with heartburn or vomiting.
  عسر البلع هو **صعوبة في البلع**؛ وقد يترافق مع حرقة المعدة أو التقيؤ.
- **Globus sensation:** anxious people feel a **lump in the throat** without an organic cause. **Odynophagia: pain with swallowing**, usually from **esophagitis** due to reflux or **candidiasis**.
  الإحساس بكتلة في الحلق: يشعر الأشخاص القلقون بـ**كتلة في الحلق** دون سبب عضوي. **البلع المؤلم: ألم عند البلع** ينتج غالباً عن **التهاب المريء** بسبب الجزر أو **المبيضات**.
- **Oropharyngeal** causes: **neuromuscular dysfunction** affecting the initiation of swallowing by the pharynx and upper esophageal sphincter; examination may show **drooling, dysarthria, hoarseness** and cranial nerve or other neurological signs.
  الأسباب **الفموية البلعومية: اختلال عصبي عضلي** يؤثر في بدء البلع بواسطة البلعوم والمعصرة المريئية العلوية؛ وقد يظهر في الفحص **سيلان اللعاب وعسر التلفظ وبحة الصوت** وعلامات عصبية قحفية أو أخرى.
- **Esophageal** causes: **structural disease** (benign or malignant **strictures**) and **dysmotility** of the esophagus.
  الأسباب **المريئية: أمراض بنيوية (تضيقات** حميدة أو خبيثة) و**اضطراب حركة** المريء.

2. DYSPEPSIA, VOMITING, HEARTBURN | عسر الهضم والتقيؤ وحرقة المعدة

Dyspepsia | عسر الهضم

- **Dyspepsia** (“indigestion”) is a collective term for any symptoms thought to arise from the **upper gastrointestinal tract**, such as **bloating and nausea**; it covers many symptoms and disorders, including some outside the digestive system.
  عسر الهضم (“سوء الهضم”) مصطلح جامع لأي أعراض يُعتقد أنها تنشأ من **السبيل الهضمي العلوي** مثل **الانتفاخ والغثيان**؛ ويشمل أعراضاً واضطرابات كثيرة، بعضها خارج الجهاز الهضمي.

A careful history is important to:

التاريخ المرضي الدقيق مهم من أجل:

- Elicit symptoms **classical of specific disorders** (e.g. **peptic ulcer**).
  استخراج أعراض **نموذجية لاضطرابات محددة** (مثل **القرحة الهضمية**).
- Detect **“alarm” features** requiring urgent investigation.
  كشف **“علامات الإنذار”** التي تتطلب تقصياً عاجلاً.
- Detect **atypical symptoms** suggesting other disorders, e.g. **myocardial ischemia**.
  كشف **أعراض غير نموذجية** توحي باضطرابات أخرى مثل **إقفار عضلة القلب**.

Vomiting | التقيؤ

- Vomiting is usually associated with **nausea, retching, salivation, anorexia or dyspepsia**; true vomiting must be **distinguished from regurgitation**, and acute from chronic vomiting.
  يترافق التقيؤ عادةً مع **الغثيان والتهوّع وسيلان اللعاب والقهم أو عسر الهضم**؛ ويجب **تمييز التقيؤ الحقيقي عن القلس**، والحاد عن المزمن.
- Seek associated **abdominal pain, fever, diarrhea**, relation to food, **drug ingestion, headache, vertigo and weight loss**.
  ابحث عن **ألم البطن والحمى والإسهال** المرافقة وعلاقة التقيؤ بالطعام و**تناول الأدوية والصداع والدوار ونقص الوزن**.

Heartburn and regurgitation | الحرقة والقلس

- **Heartburn** is **retrosternal burning discomfort**, often rising into the chest and sometimes with **regurgitation of acidic or bitter fluid** into the throat; it occurs **after meals, on lying down, or with bending, straining or heavy lifting**.
  الحرقة انزعاج حارق **خلف القص**، يصعد غالباً إلى الصدر وأحياناً مع **قلس سائل حامضي أو مر** إلى الحلق؛ وتحدث **بعد الوجبات أو عند الاستلقاء أو عند الانحناء أو الشدّ أو رفع الأثقال**.

- These are classical symptoms of **gastro-esophageal reflux**, but up to **50%** of patients present with other symptoms such as **chest pain, belching, halitosis, chronic cough or sore throat**.
هذه أعراض نموذجية لـ**الجزر المعدي المريئي**، لكن حتى **50%** من المرضى يشكون من أعراض أخرى مثل **ألم الصدر والتجشؤ ونتن النفس والسعال المزمن والتهاب الحلق**.

> **Young** patients with typical symptoms responding to diet, antacids or acid suppression need **no investigation**; patients **over 55 years** or with **alarm or atypical features** need **urgent endoscopy**.
> المرضى **الشباب** ذوو الأعراض النموذجية والاستجابة للحمية أو مضادات الحموضة أو كبح الحموضة **لا يحتاجون إلى تقصٍّ**؛ أما المرضى **فوق 55 عاماً** أو ذوو **علامات الإنذار أو الأعراض غير النموذجية** فيحتاجون إلى **تنظير عاجل**.

3. DIARRHEA | الإسهال

Acute diarrhea | الإسهال الحاد

- **Diarrhea** is the passage of **more than 200 g of stool daily**; measuring stool volume helps confirm it. The most severe symptom is often **urgency of defecation**, and **fecal incontinence** is common.
الإسهال هو طرح **أكثر من 200 غ من البراز يومياً**؛ ويساعد قياس حجم البراز على تأكيده. وأشد الأعراض غالباً **إلحاح التغوط**، و**سلس البراز** شائع.
- **Acute diarrhea** is extremely common, usually due to **fecal-oral transmission** of bacteria or their toxins, viruses or parasites; it is **short-lived**, and a history **longer than 10 days** rarely has an infective cause.
الإسهال الحاد شائع جداً، وسببه غالباً **انتقال برازي فموي** للجراثيم أو سمومها أو الفيروسات أو الطفيليات؛ وهو **قصير الأمد**، وقلّما يكون سبب إسهال **استمر أكثر من 10 أيام** إنتاناً.
- Drugs may be responsible: **antibiotics, cytotoxic drugs, PPIs and NSAIDs**.
قد تكون الأدوية مسؤولة: **المضادات الحيوية والأدوية السامة للخلايا ومثبطات مضخة البروتون ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية**.

Chronic or relapsing diarrhea | الإسهال المزمن أو النكّاس

- The most common cause is **irritable bowel syndrome (IBS)**: increased frequency with **loose, watery or pellety stools**; **rarely at night** and **most severe before and after breakfast**; at other times the patient is **constipated**.
أشيع الأسباب **متلازمة الأمعاء المتهيجة**: زيادة تواتر التغوط مع **براز رخو أو مائي أو كالكريات**؛ و**نادراً في الليل** و**أشد ما يكون قبل الفطور وبعده**؛ وفي أوقات أخرى يكون المريض **مصاباً بالإمساك**.
- The stool often contains **mucus but never blood**, and the 24-hour stool volume is **less than 200 g**.
كثيراً ما يحوي البراز **مخاطاً لكن لا دم فيه أبداً**، وحجمه خلال 24 ساعة **أقل من 200 غ**.
- Chronic diarrhea can be caused by disease of the **colon**, the **small bowel**, or by **malabsorption**; the presentation, stool examination, routine blood tests and imaging reveal a diagnosis in many cases.
قد ينتج الإسهال المزمن عن مرض في **القولون** أو **الأمعاء الدقيقة** أو عن **سوء الامتصاص**؛ ويكشف التظاهر السريري وفحص البراز والتحاليل الروتينية والتصوير التشخيص في حالات كثيرة.

> A series of **negative investigations** usually implies **IBS**, but some patients clearly have **organic disease** and need more extensive investigation.
> سلسلة من **الفحوص السلبية** توحي عادةً بـ**متلازمة الأمعاء المتهيجة**، لكن بعض المرضى لديهم بوضوح **مرض عضوي** ويحتاجون إلى تقصٍّ أوسع.

4. WEIGHT LOSS | نقص الوزن

Causes | الأسباب

- Weight loss of **more than 3 kg over 6 months** is **significant** and often indicates an underlying disease.
نقص الوزن **بأكثر من 3 كغ خلال 6 أشهر مهم** وغالباً يدل على مرض كامن.
- **Physiological:** dieting, exercise, starvation or the reduced intake of old age; a **dietitian** is valuable in older patients because the dietary history may be unreliable.
فيزيولوجي: الحمية أو الرياضة أو الجوع أو نقص المتناول في الشيخوخة؛ و**اختصاصي التغذية** مفيد عند كبار السن لأن التاريخ الغذائي قد لا يُعتمد عليه.
- **Psychiatric: anorexia nervosa, bulimia, affective disorders**; **alcoholics** (self-neglect and poor intake); **depression**.
نفسي: القهم العصابي والنهام والاضطرابات الوجدانية؛ و**مدمنو الكحول** (الإهمال الذاتي وسوء التغذية)؛ و**الاكتئاب**.
- **Systemic:** chronic infections (**tuberculosis**, recurrent urinary or chest infections, parasitic and protozoan infections); **HIV-related illness**; **disseminated malignancy** (a late feature); chronic inflammatory diseases (**rheumatoid arthritis, polymyalgia rheumatica**).
جهازي: الإنتانات المزمنة (**السل** وإنتانات البول أو الصدر المتكررة والعدوى الطفيلية والأوالي)؛ و**المرض المرتبط بفيروس العوز المناعي**؛ و**الخباثة المنتشرة** (علامة متأخرة)؛ والأمراض الالتهابية المزمنة (**التهاب المفاصل الرثوي والألم العضلي الرثوي**).

- **Gastrointestinal: dysphagia and gastric outlet obstruction** reduce intake; **malignancy** (obstruction, anorexia, cytokines); **malabsorption** (pancreatic or small bowel); **Crohn's disease and ulcerative colitis** (anorexia, fear of eating, loss of protein, blood and nutrients).
هضمي: عسر البلع وانسداد مخرج المعدة ينقصان المتناول؛ و**الخباثة** (انسداد وقهم وسيتوكينات)؛ و**سوء الامتصاص** (البنكرياس أو الأمعاء الدقيقة)؛ و**داء كرون والتهاب القولون القرحي** (قهم وخوف من الأكل وفقد البروتين والدم والمغذيات).

- **Metabolic and miscellaneous:** metabolic disorders and **end-stage respiratory and cardiac disease**.
استقلابي ومتفرقات: الاضطرابات الاستقلابية و**أمراض الرئة والقلب في مراحلها النهائية**.

Investigations | التقصي

- If the cause is not obvious: **urinalysis** (glucose, protein, blood); **blood tests** (liver function, random glucose, thyroid function); **CRP and ESR**; **fecal calprotectin**.
إذا لم يكن السبب واضحاً: **تحليل البول** (الغلوكوز والبروتين والدم)؛ و**تحاليل الدم** (وظائف الكبد والغلوكوز العشوائي ووظائف الدرق)؛ و**CRP، ESR**؛ و**كالبروتكتين البراز**.

- Sometimes **invasive tests** (**bone marrow aspiration, liver biopsy**, e.g. for cryptic miliary TB) or **CT** are needed; first **revisit the history and reweigh at intervals**.
أحياناً تلزم **فحوص باضعة (خزعة نقي العظم أو خزعة الكبد** مثلاً للسل الدخني الخفي) أو **التصوير المقطعي**؛ وقبل ذلك **أعد التاريخ المرضي وزن المريض على فترات**.

Possible consequences of malabsorption | النتائج المحتملة لسوء الامتصاص

Sign العلامة	Deficiency العوز
Night blindness, follicular hyperkeratosis العمى الليلي وفرط التقرن الجريبي	**Vitamin A** **فيتامين A**
Anemia; angular stomatitis and glossitis فقر الدم؛ والتهاب زاوية الفم واللسان	**Iron, folate, B12** **الحديد، حمض الفوليك، فيتامين B12**
Bleeding gums نزف اللثة	**Vitamin C** **فيتامين C**
Purpura and bruising الفرفرية والكدمات	**Vitamins C and K** **فيتامين C، فيتامين K**
Poor wound healing ضعف التئام الجروح	**Vitamin C, protein, zinc** **فيتامين C والبروتين والزنك**
Acrodermatitis enteropathica التهاب الجلد الأطرافي المعوي	**Zinc** **الزنك**
Koilonychia الأظافر الملعقية	**Iron** **الحديد**
Paraesthesia and tetany المذل والتكزز	**Calcium, magnesium** **الكالسيوم والمغنزيوم**
Osteomalacia, rickets لين العظام والرخد	**Calcium, vitamin D** **الكالسيوم وفيتامين D**
Muscle wasting; proximal myopathy ضمور العضلات؛ واعتلال العضلات الدانية	**Protein; vitamin D** **البروتين؛ وفيتامين D**
Peripheral neuropathy الاعتلال العصبي المحيطي	**Vitamin B12** **فيتامين B12**
Peripheral edema الوذمة المحيطية	**Hypoalbuminemia** **نقص ألبومين الدم**

- **Routine blood tests: microcytic anemia** (iron deficiency); **macrocytic anemia** (folate or B12 deficiency); **increased prothrombin time** (vitamin K deficiency); **hypoalbuminemia, hypocalcemia, hypomagnesemia, hypophosphatemia, low serum zinc**.
التحاليل الروتينية: فقر دم صغير الكريات (عوز الحديد)؛ و**فقر دم ضخم الكريات** (عوز الفوليك أو B12)؛ و**زيادة زمن البروثرومبين** (عوز فيتامين K)؛ و**نقص ألبومين الدم ونقص كالسيوم الدم ونقص مغنزيوم الدم ونقص فوسفات الدم وانخفاض الزنك في المصل**.

5. CONSTIPATION | الإمساك

Definition and assessment | التعريف والتقييم

- **Constipation** is the **infrequent passage of hard stools**; patients may also complain of **straining, a sensation of incomplete evacuation** and perianal or abdominal discomfort; it occurs in many GI and other medical disorders.

  الإمساك هو **قلة تواتر طرح البراز القاسي**؛ وقد يشكو المرضى أيضاً من **الشدّ والإحساس بعدم اكتمال الإفراغ** وانزعاج حول الشرج أو في البطن؛ ويحدث في اضطرابات هضمية وطبية كثيرة.

- **Onset and duration** matter: **neonatal onset** suggests **Hirschsprung's disease**; a **recent change** in bowel activity in middle age suggests an **organic disorder such as colonic carcinoma**.

  البدء والمدة مهمان: **البدء الوليدي** يوحي بـ**داء هيرشسبرونغ**؛ و**التغير الحديث** في النشاط المعوي في منتصف العمر يوحي بـ**اضطراب عضوي مثل سرطان القولون**.

- Ask about **rectal bleeding, pain, weight loss**, excessive straining, **IBS symptoms**, **childhood constipation** and **emotional distress**.

  اسأل عن **النزف الشرجي والألم ونقص الوزن** والشدّ المفرط و**أعراض الأمعاء المتهيجة** و**الإمساك في الطفولة** و**الضائقة النفسية**.

- **Careful examination contributes more** to diagnosis than extensive investigation: general medical disorders, signs of **intestinal obstruction**, **neurological disorders** (especially spinal cord lesions), and **perineal inspection and rectal examination** (pelvic floor abnormalities, anal canal or rectal masses, fecal impaction, prolapse).

  الفحص الدقيق يسهم أكثر في التشخيص من التقصي الواسع: الاضطرابات الطبية العامة وعلامات **الانسداد المعوي** و**الاضطرابات العصبية** (خصوصاً آفات النخاع الشوكي) و**معاينة العجان والفحص الشرجي** (شذوذات قاع الحوض وكتل القناة الشرجية أو المستقيم وانحشار البراز والهبوط).

Management | التدبير

- It is **neither possible nor appropriate** to investigate every person with constipation; most respond to **increased fluid intake, dietary fiber, exercise** and the **judicious use of laxatives**.

  ليس ممكناً ولا مناسباً تقصي كل مصاب بالإمساك؛ ويستجيب معظمهم لـ**زيادة السوائل والألياف الغذائية والرياضة** و**الاستعمال الحكيم للمليّنات**.

> **Middle-aged or elderly** patients with a **short history** or **worrying symptoms** (rectal bleeding, pain, weight loss) must be investigated promptly by **barium enema or colonoscopy**.
>
> المرضى **متوسطو العمر أو المسنون** ذوو **القصة القصيرة** أو **الأعراض المقلقة** (نزف شرجي أو ألم أو نقص وزن) يجب تقصيهم بسرعة بـ**الحقنة الباريتية أو تنظير القولون**.

6. ABDOMINAL PAIN | ألم البطن

Four types of abdominal pain | أنواع ألم البطن الأربعة

- **Visceral:** gut organs are insensitive to burning and cutting but sensitive to **distension, contraction, twisting and stretching**; pain from **unpaired structures** is usually, but not always, felt in the **midline**.

  الحشوي: الأعضاء المعوية غير حساسة للحرق والقطع لكنها حساسة لـ**التمدد والانقباض والالتواء والشدّ**؛ وألم **البنى المفردة** يُحَسّ عادةً، لا دائماً، في **الخط الناصف**.

- **Parietal:** the parietal peritoneum is innervated by **somatic nerves**; inflammation, infection or neoplasia causes **sharp, well-localized and lateralized** pain.

  الجداري: يتعصب الصفاق الجداري بـ**أعصاب جسدية**؛ والالتهاب أو العدوى أو الورم يسبب ألماً **حاداً جيد التوضع وجانبياً**.

- **Referred:** e.g. **gallbladder** pain referred to the **back or shoulder tip**.

  المنعكس: مثل ألم **المرارة** المنعكس إلى **الظهر أو رأس الكتف**.

- **Psychogenic:** cultural, emotional and psychosocial factors influence pain; sometimes no organic cause is found and **depression or somatization disorder** may be responsible.

  النفسي المنشأ: تؤثر العوامل الثقافية والعاطفية والنفسية الاجتماعية في الألم؛ وأحياناً لا يوجد سبب عضوي وقد يكون **الاكتئاب أو اضطراب الجسدنة** هو المسؤول.

Acute abdominal pain | ألم البطن الحاد

Mechanism الآلية	Causes الأسباب
Inflammation **الالتهاب**	Appendicitis, diverticulitis, cholecystitis, pelvic inflammatory disease, pancreatitis, pyelonephritis, intra-abdominal abscess التهاب الزائدة والرتوج والمرارة ومرض التهاب الحوض والتهاب البنكرياس والتهاب الحويضة والكلية وخراج داخل البطن
Perforation / rupture **الانثقاب / التمزق**	Peptic ulcer, diverticular disease, ovarian cyst, **aortic aneurysm** القرحة الهضمية وداء الرتوج وكيسة المبيض و**أم دم الأبهر**
Obstruction **الانسداد**	Intestinal obstruction, biliary colic, **ureteric colic** الانسداد المعوي والمغص الصفراوي و**المغص الحالبي**

- **Algorithm:** signs of **peritonitis** → **resuscitation then laparotomy**. Otherwise **blood tests** (↑ amylase/lipase = **acute pancreatitis**) → **erect chest X-ray** (free air = **perforation**) → **abdominal X-ray** (dilated loops = **obstruction/ileus**) → **ultrasound** (gallstones, thick wall = **cholecystitis**) → **contrast radiology** → **CT** (pancreatitis, abscess, aortic aneurysm, malignancy); if inconclusive **observe**, and if symptoms persist **laparoscopy**.

  الخوارزمية: علامات **التهاب الصفاق** ← **إنعاش ثم فتح البطن**. وإلا **تحاليل الدم** (ارتفاع الأميلاز/الليباز = **التهاب بنكرياس حاد**) ← **صورة صدر شعاعية بوضع الوقوف** (هواء حر = **انثقاب**) ← **صورة بطن شعاعية** (عرى متوسعة = **انسداد/شلل أمعاء**) ← **الأمواج فوق الصوتية** (حصيات وجدار سميك = **التهاب المرارة**) ← **التصوير الظليل** ← **التصوير المقطعي** (التهاب البنكرياس والخراج وأم دم الأبهر والخباثة)؛ وإن لم تحسم الفحوص **تُراقب الحالة**، وإن استمرت الأعراض **تنظير البطن**.

- **By region: RUQ** gallstones, cholangitis, hepatitis, liver abscess; **epigastric** esophagitis, peptic ulcer, pancreatitis, biliary disease; **LUQ** splenic abscess, splenomegaly, rupture; **umbilical** early appendicitis, mesenteric adenitis, Meckel's; **flanks** renal colic, pyelonephritis, ovarian cyst or torsion; **RLQ** appendicitis, Crohn's, ectopic pregnancy, hernias, PID; **pelvic** cystitis, urinary retention, fibroid, endometriosis; **LLQ** diverticulitis, ulcerative colitis, constipation, ectopic pregnancy.

  بحسب المنطقة: الربع العلوي الأيمن حصيات المرارة والتهاب الأقنية الصفراوية والتهاب الكبد وخراج الكبد؛ **والشرسوف** التهاب المريء والقرحة الهضمية والتهاب البنكرياس وأمراض الطرق الصفراوية؛ **والربع العلوي الأيسر** خراج الطحال وتضخم الطحال وتمزقه؛ **والسرّة** التهاب الزائدة المبكر والتهاب العقد المساريقية ورتج ميكل؛ **والخاصرتان** المغص الكلوي والتهاب الحويضة والكلية وكيسة المبيض أو التواؤه؛ **والربع السفلي الأيمن** التهاب الزائدة وداء كرون والحمل خارج الرحم والفتوق والتهاب الحوض؛ **والحوض** التهاب المثانة واحتباس البول والورم الليفي وبطانة الرحم المهاجرة؛ **والربع السفلي الأيسر** التهاب الرتوج والتهاب القولون القرحي والإمساك والحمل خارج الرحم.

Abdominal examination and old age | فحص البطن والشيخوخة

- **Findings: hepatomegaly or palpable gallbladder**; **epigastric mass** (gastric or pancreatic cancer, aortic aneurysm); **left iliac fossa mass** (sigmoid cancer, constipation, diverticular mass); **right iliac fossa mass** (caecal carcinoma, Crohn's, appendix abscess); **suprapubic mass** (bladder, pregnancy, fibroids or carcinoma); **generalized distension** (fat, fluid, flatus, feces, fetus).

  الموجودات: تضخم الكبد أو مرارة مجسوسة؛ وكتلة شرسوفية (سرطان المعدة أو البنكرياس وأم دم الأبهر)؛ **وكتلة في الحفرة الحرقفية اليسرى** (سرطان السيني والإمساك وكتلة رتوجية)؛ **وكتلة في الحفرة الحرقفية اليمنى** (سرطان الأعور وداء كرون وخراج الزائدة)؛ **وكتلة فوق العانة** (المثانة والحمل والأورام الليفية أو السرطان)؛ **وانتفاخ معمم** (دهن وسائل وغازات وبراز وجنين).

Left upper quadrant mass كتلة الربع العلوي الأيسر	Spleen الطحال	Kidney الكلية
Edge / upper limit الحافة / الحد العلوي	Edge with a **notch**; **cannot get above it**; moves toward the right iliac fossa حافة ذات **ثلمة**؛ و**لا يمكن الوصول فوقها**؛ وتتحرك نحو الحفرة الحرقفية اليمنى	**Rounded**; can get above it; moves down **مستديرة**؛ ويمكن الوصول فوقها؛ وتتحرك نحو الأسفل
Percussion القرع	**Dull** أصم	**Resonant**, **ballotable** **رنان** و**قابل للارتداد (البالوتمان)**

- **Peritonitis:** guarding and rebound, absent bowel sounds, rigidity. **Obstruction:** distension, tinkling bowel sounds, visible peristalsis.

  التهاب الصفاق: حراسة وألم ارتدادي وغياب أصوات الأمعاء وتخشب. **الانسداد:** انتفاخ وأصوات أمعاء رنانة وتمعج مرئي.

- **In old age:** severity and localization may be **blunted**; presentation may be **atypical** (delirium, collapse, immobility); **cancer** is more common over **70** than under 50; diverticulitis may present with **delirium or anorexia** and little tenderness; the surgical outcome depends on **frailty** and whether surgery is **elective or emergency**, not on chronological age.

  في الشيخوخة: قد تُخفَّف شدة الألم وتوضعه؛ وقد يكون التظاهر **غير نموذجي** (هذيان أو انهيار أو عدم حركة)؛ و**السرطان** سبب أشيع لألم البطن الحاد بعد سن **70** منه قبل 50؛ وقد يتظاهر التهاب الرتوج بـ**الهذيان أو القهم** مع قلة الإيلام؛ ويعتمد مآل الجراحة على **الهشاشة** وعلى كون الجراحة **اختيارية أو إسعافية** لا على العمر الزمني.

7. CHRONIC, RECURRENT AND CONSTANT ABDOMINAL PAIN | ألم البطن المزمن والمتكرر والمستمر

Assessment and investigation | التقييم والتقصي

- Note the patient's **demeanor, mood and emotional state** and signs of **weight loss, fever, jaundice or anemia**; take a **detailed history** of the pain and associated symptoms. If the abdominal and rectal examination is normal, look for disease of the **vertebral column, spinal cord, lungs and cardiovascular system**.

  لاحظ **سلوك المريض ومزاجه وحالته الانفعالية** وعلامات **نقص الوزن والحمى واليرقان وفقر الدم**؛ وخذ **قصة مفصلة** عن الألم والأعراض المرافقة. وإذا كان فحص البطن والمستقيم طبيعياً فابحث عن مرض في **العمود الفقري والنخاع الشوكي والرئتين والجهاز القلبي الوعائي**.

Presentation التظاهر	Investigation التقصي
Epigastric pain, dyspepsia, gallbladder symptoms ألم شرسوفي وعسر هضم وأعراض مرارية	**Endoscopy and ultrasound** **التنظير والأمواج فوق الصوتية**

Presentation التظاهر	Investigation التقصي
Altered bowel habit, rectal bleeding, obstruction تبدل عادات التغوط ونزف شرجي وانسداد	**Colonoscopy** **تنظير القولون**
Pain provoked by food in widespread atherosclerosis ألم يستثيره الطعام مع تصلب شرياني واسع	**CT or MR angiography** (mesenteric ischemia) **تصوير الأوعية بالمقطعي أو بالرنين** (إقفار مساريقي)
Upper abdominal pain radiating to the back ألم بطني علوي ينتشر إلى الظهر	**Ultrasound, CT, fecal elastase** **الأمواج فوق الصوتية والمقطعي وإيلاستاز البراز**
Loin pain radiating to the flanks with urinary symptoms ألم قطني ينتشر إلى الخاصرتين مع أعراض بولية	**X-ray, ultrasound, CT KUB** (stones) **صورة شعاعية وأمواج فوق صوتية ومقطعي للكلى والحالب والمثانة** (حصيات)

- **IBS:** young patients with **pain relieved by defecation, bloating and alternating bowel habit**; **blood tests, fecal calprotectin and sigmoidoscopy** are sufficient without rectal bleeding, weight loss or abnormal findings. A history of **alcohol misuse, weight loss and diarrhea** suggests **chronic pancreatitis or pancreatic cancer**.
  الأمعاء المتهيجة: مرضى شباب مع **ألم يزول بالتغوط وانتفاخ وتناوب في عادات التغوط**؛ وتكفي **تحاليل الدم وكالبروتكتين البراز وتنظير السيني** في غياب النزف الشرجي ونقص الوزن والموجودات الشاذة. وقصة **إدمان الكحول ونقص الوزن والإسهال** توحي بـ**التهاب البنكرياس المزمن أو سرطان البنكرياس**.
- **Psychological origin** is suggested by past psychiatric disturbance, repeated negative investigations or vague symptoms; take care not to miss rare pathology such as **acute intermittent porphyria**; review notes and discuss openly with the patient to avoid unnecessary invasive tests.
  المنشأ النفسي توحي به قصة اضطراب نفسي سابق أو فحوص سلبية متكررة أو أعراض غامضة؛ ويجب الحذر من إغفال أمراض نادرة مثل **البورفيريا المتقطعة الحادة**؛ وتُراجَع السجلات ويُناقَش المريض بصراحة لتجنب الفحوص الباضعة غير الضرورية.

Extra-intestinal causes and constant pain | الأسباب خارج الأمعاء والألم المستمر

Group المجموعة	Examples أمثلة
Retroperitoneal **خلف الصفاق**	Aortic aneurysm, malignancy, lymphadenopathy, abscess أم دم الأبهر والخباثة واعتلال العقد اللمفاوية والخراج
Psychogenic **نفسي المنشأ**	Depression, anxiety, hypochondriasis, somatization اكتئاب وقلق ووهم المرض وجسدنة
Locomotor **حركي**	Vertebral compression fracture, abdominal muscle strain كسر انضغاطي فقري وإجهاد عضلات البطن
Metabolic / endocrine **استقلابي / صماوي**	Diabetes mellitus, acute intermittent porphyria, hypercalcemia داء السكري والبورفيريا المتقطعة الحادة وفرط كالسيوم الدم
Drugs / toxins **أدوية / سموم**	Glucocorticoids, azathioprine, lead, alcohol الستيروئيدات القشرية والأزاثيوبرين والرصاص والكحول
Hematological **دموي**	Sickle-cell disease, hemolytic disorders فقر الدم المنجلي والاضطرابات الانحلالية
Neurological **عصبي**	Spinal cord lesions, tabes dorsalis, radiculopathy آفات النخاع الشوكي والتبس الظهري واعتلال الجذور

- **Constant pain:** most patients have features suggesting the diagnosis; in a minority no cause is found, giving **"chronic functional abdominal pain"**: **abnormal CNS processing of normal visceral afferent input** with psychosocial factors; the aim is **symptom control** and minimizing the effect on social, personal and occupational life.
  الألم المستمر: لدى معظم المرضى ميزات توحي بالتشخيص؛ وفي أقلية لا يوجد سبب مما يؤدي إلى تشخيص **"ألم البطن الوظيفي المزمن"**: **معالجة شاذة في الجهاز العصبي المركزي للدخل الحسي الحشوي الطبيعي** مع عوامل نفسية اجتماعية؛ والهدف **ضبط الأعراض** وتقليل أثرها في الحياة الاجتماعية والشخصية والمهنية.
- Management is best in **specialized pain clinics** with psychological support and appropriate drugs: **tricyclic antidepressants, gabapentin or pregabalin, ketamine and opioids**.
  يكون التدبير أفضل في **عيادات الألم المتخصصة** مع الدعم النفسي والأدوية المناسبة: **مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقة والغابابنتين أو البريغابالين والكيتامين والأفيونات**.