HYPOCHONDRIASIS

توهّم المرض (المراق)

Psychiatry lecture – presentation by Mirzha Mendez

محاضرة في الطب النفسي – عرض تقديمي لميرزا ميندز

1. INTRODUCTION, DEFINITION AND ONSET | المقدمة والتعريف وسن البدء

Introduction | المقدمة

Hypochondriasis is a **somatoform disorder** marked by **recurrent preoccupation with fears of having a life-threatening disease** despite **appropriate work-up and medical reassurance**.

توهّم المرض (المراق) هو **اضطراب جسدي الشكل** يتميّز بـ**انشغال متكرر بالخوف من الإصابة بمرض مهدِّد للحياة** على الرغم من **الفحوصات المناسبة والطمأنة الطبية**.

The preoccupation may be with:

وقد يتعلق الانشغال بما يلي:

- A **specific organ or disease** (e.g., cardiac disease).

  عضو أو مرض محدّد (مثل مرض القلب).

- **Bodily functioning** (e.g., peristalsis, heartbeat).

  وظائف الجسم (مثل التمعّج ونبض القلب).

- **Minor physical alterations** (e.g., a small sore or an occasional cough).

  تغيّرات جسدية بسيطة (مثل قرحة صغيرة أو سعال عرضي).

Hypochondriasis is **excessive worry about being sick**. Those who suffer from it are called **hypochondriacs**.

توهّم المرض هو **قلق مفرط من الإصابة بالمرض**، ويُسمّى المصابون به **المتوهّمين المرض (المراقيين)**.

Hypochondriacs have **anxiety that they are constantly ill**. They truly believe that something is wrong with them and visit doctors frequently to get diagnosed (**doctor's shopping**).

يعاني هؤلاء المرضى من **قلق دائم من أنهم مرضى**، ويعتقدون حقًّا أن شيئًا ما خاطئ في أجسامهم، فيزورون الأطباء مرارًا للحصول على تشخيص (**التنقّل بين الأطباء**).

Definition | التعريف

First definition: an **unrealistic or inaccurate interpretation** of physical symptoms or sensations, leading to preoccupation and fear of having a serious disease **without any organic cause or psychopathology**.

التعريف الأول: تفسير غير واقعي أو غير دقيق للأعراض أو الأحاسيس الجسدية يؤدي إلى الانشغال والخوف من الإصابة بمرض خطير **دون أي سبب عضوي أو اعتلال نفسي**.

Second definition: a **persistent preoccupation** with a fear (or belief) of having one or more serious diseases, based on the person's **own interpretation of normal body function or minor physical abnormalities**.

التعريف الثاني: انشغال مستمر بالخوف (أو الاعتقاد) بوجود مرض خطير أو أكثر، استنادًا إلى **تفسير الشخص نفسه لوظائف الجسم الطبيعية أو لشذوذات جسدية بسيطة**.

Onset | سن البدء

- Hypochondriasis may begin anywhere from the **teenage years to older years**.

  قد يبدأ توهّم المرض في أي وقت من **سن المراهقة حتى الكهولة**.

- The **peak age of onset** is in the **twenties and thirties**.

  ويقع **ذروة سن البدء** في **العقدين الثالث والرابع من العمر**.

2. EPIDEMIOLOGY | الوبائيات

Epidemiology | الوبائيات

Item البند	Fact المعلومة
Prevalence الانتشار	One recent study reported a **6-month prevalence of 4 to 6 percent** in a general medical clinic population, but it may be **as high as 15 percent**. أفادت دراسة حديثة بأن **الانتشار خلال ستة أشهر يبلغ 4 إلى 6 بالمئة** بين مراجعي العيادات الطبية العامة، وقد يصل إلى **15 بالمئة**.

Item البند	Fact المعلومة
Sex **الجنس**	**Men and women are equally affected**. **الرجال والنساء يتأثرون بالتساوي**.
Age **العمر**	Onset can occur at any age, but the disorder most commonly appears in persons **20 to 30 years** of age. يمكن أن تبدأ الأعراض في أي عمر، لكن الاضطراب يظهر غالبًا عند الأشخاص **بين سن العشرين والثلاثين**.
Race and social factors **العرق والعوامل الاجتماعية**	Some evidence suggests it is **more common among blacks than whites**, but **social position, education level and marital status do not appear to affect** the diagnosis. تشير بعض الأدلة إلى أنه **أكثر شيوعًا بين ذوي البشرة السوداء منه بين البيض**، لكن **المكانة الاجتماعية والمستوى التعليمي والحالة الزوجية لا يبدو أنها تؤثر** في التشخيص.
Medical students **طلبة الطب**	Complaints occur in about **3 percent**, usually in the **first 2 years**, but are generally **transient**. تحدث الشكاوى عند نحو **3 بالمئة**، وغالبًا في **السنتين الأوليين**، لكنها عادةً **عابرة**.

3. FEATURES AND SYMPTOMS | السمات والأعراض

Features of hypochondriasis | سمات توهّم المرض

- The fear or belief **persists despite assurance** to the contrary, such as showing **normal reports** to the patient.
  يستمر الخوف أو الاعتقاد **رغم الطمأنة**، مثل إطلاع المريض على **تقارير طبيعية**.
- **Doctor shopping** is predictably common.
  التنقّل بين الأطباء شائع جدًّا ويمكن توقّعه.
- **Preoccupation with medical terms and syndromes** is quite common. The patient changes the physician frequently in order to be **investigated again**.
  الانشغال بالمصطلحات والمتلازمات الطبية شائع جدًّا، ويبدّل المريض طبيبه كثيرًا ليُجرى له **فحص جديد**.
- Becoming **easily worried** about health.
  سهولة القلق على الصحة.
- **Lack of physical symptoms**. If physical symptoms are present, they are **mild**.
  قلة الأعراض الجسدية، وإن وُجدت فهي **خفيفة**.

Symptoms of hypochondriasis | أعراض توهّم المرض

Symptom العَرَض	Detail التفصيل
Frequent doctor visits **الزيارات المتكررة للأطباء**	If one doctor declares that he is healthy, he goes to **two more** (**doctor shopping**) to make sure, because he truly thinks he is sick and that the first doctor is missing something. إذا أعلن طبيب أنه سليم، يذهب إلى **طبيبين آخرين (التنقّل بين الأطباء)** للتأكد، لأنه يعتقد حقًّا أنه مريض وأن الطبيب الأول فاته شيء.
Requests for tests and surgery **طلب الفحوصات والعمليات**	Even though certain tests and operations carry risks, hypochondriacs ask for them **over and over again**. رغم أن بعض الفحوصات والعمليات تنطوي على مخاطر، يطلبها المتوهّمون **مرارًا وتكرارًا**.
Severe anxiety about health **قلق شديد على الصحة**	Constant worry about illness. قلق دائم من المرض.
Excessive self-diagnosis and research **التشخيص الذاتي والبحث المفرط**	When they see a **news story or an online article** about a new disease, they think they have it. عندما يرون **خبرًا أو مقالًا على الإنترنت** عن مرض جديد يظنون أنهم مصابون به.
Thoughts that anything unusual means serious illness **الاعتقاد بأن أي شيء غير معتاد يعني مرضًا خطيرًا**	Any unusual bodily sensation is read as a serious illness. يُفسَّر أي إحساس جسدي غير معتاد على أنه مرض خطير.
Lack of attendance at work or school **التغيّب عن العمل أو المدرسة**	Due to **anxiety over possible illnesses**. بسبب **القلق من احتمال الإصابة بأمراض**.

Symptom العَرَض	Detail التفصيل
Constant attention to blood pressure and heartbeat **المراقبة المستمرة** لضغط الدم ونبض القلب	Repeated checking of body signs. فحص متكرر للعلامات الجسدية.

The symptoms slide is cut off after "constant attention to blood pressure, heartbeat; constant", so the rest of the list is not visible.
قائمة الأعراض في الشريحة مقطوعة بعد عبارة "المراقبة المستمرة لضغط الدم ونبض القلب"، لذا لا يظهر بقية النص.

4. ETIOLOGY: EXPLANATORY MODELS | السببيات: النماذج التفسيرية

1. Psychodynamic model | النموذج الديناميي النفسي

- The development of physical symptoms from **unconscious conflicts** may be traced to **Sigmund Freud**.
يُعزى نشوء الأعراض الجسدية من **الصراعات اللاشعورية** إلى **سيغموند فرويد**.
- **Psychodynamic defenses**, such as **repression and displacement**, were regarded as the basis for hypochondriasis.
اعتُبرت **الدفاعات النفسية الدينامية** مثل **الكبت والإزاحة** أساسًا لتوهّم المرض.
- To remediate unconscious conflicts such as **aggression and hostility towards others**, physical complaints serve to **reconcile such internally unacceptable drives**.
ولمعالجة الصراعات اللاشعورية مثل **العدوانية والعداء تجاه الآخرين**، تعمل الشكاوى الجسدية على **التوفيق بين هذه الدوافع الداخلية غير المقبولة**.

2. Social learning model | نموذج التعلّم الاجتماعي

- Hypochondriasis is a **social transactional process** whereby the patient assumes the **'sick role'**.
توهّم المرض **عملية تبادل اجتماعي** يتخذ فيها المريض **"دور المريض"**.
- The aim is to obtain a **'socially acceptable excuse'** or **relief from social or occupational obligations**.
والهدف هو الحصول على **"عذر مقبول اجتماعيًا"** أو **التخفّف من الالتزامات الاجتماعية أو المهنية**.
- When a person becomes ill through no fault of his or her own, a **different set of social rules** applies.
وعندما يمرض الشخص دون أي ذنب منه تنطبق عليه **مجموعة قواعد اجتماعية مختلفة**.
- Having an illness ensures that the individual will be **taken care of** (to gain **sympathy**).
ويضمن المرض أن يحظى الفرد بـ**الرعاية** (لكسب **التعاطف**).

3. Cognitive-behavioral model | النموذج المعرفي السلوكي

- Patients **misinterpret bodily symptoms** and **amplify their somatic sensations** into fears of having a real, **life-threatening malady**.
يُسيء المرضى **تفسير الأعراض الجسدية ويضخّمون إحساساتهم الجسدية** حتى تتحول إلى مخاوف من علّة حقيقية **مهدِّدة للحياة**.
- **Health anxiety** is concern or preoccupation regarding health that is **appropriate, reality-based** and **responds to medical evaluation and reassurance**.
قلق الصحة هو اهتمام أو انشغال بالصحة يكون **مناسبًا وقائمًا على الواقع ويستجيب للتقييم الطبي والطمأنة**.
- **Cognitive distortions** and the consequent **reassurance-seeking behavior** may serve to **maintain the disorder**; therefore targeted therapy is needed.
قد تعمل **التشوّهات المعرفية** وما ينتج عنها من **سلوك البحث عن الطمأنة** على **إدامة الاضطراب**، ولذلك يلزم علاج موجَّه.

The slide lists "Hypochondriacal psychosis, Body dysmorphic disorder, Hypochondriasis, Somatization disorder" in brackets after health anxiety, and the last sentence is cut off at the bottom of the slide.
تذكر الشريحة بين قوسين "الذهان المراقي، واضطراب تشوّه الجسم، وتوهّم المرض، واضطراب الجَسْدَنة" بعد قلق الصحة، كما أن آخر جملة مقطوعة في أسفل الشريحة.

4. Anxiety spectrum disorder | اضطراب طيف القلق

- Hypochondriasis may be conceptualized as a **variant manifestation of an underlying anxiety disorder (AD)**.
يمكن تصوّر توهّم المرض على أنه **مظهر متنوّع لاضطراب قلق كامن**.
- The anxiety originates from the **preoccupation with fear of having a disease**, which occurs despite reassurance.
ينشأ القلق من **الانشغال بالخوف من الإصابة بمرض**، وهو ما يحدث رغم الطمأنة.
- Other disorders on the spectrum with similar etiology but slightly different phenotypes: **OCD, specific phobia and GAD**.

ومن الاضطرابات الأخرى على الطيف ذات السببية المشابهة والأنماط الظاهرية المختلفة قليلًا: **الوسواس القهري والرهاب النوعي والقلق العام**.

- A neuroanatomical study showed that hypochondriasis, **OCD and PD** may have similar **frontal-striatal and limbic activity**, associated with **increased distractibility** for irrelevant information.
  أظهرت دراسة تشريحية عصبية أن توهّم المرض و**الوسواس القهري واضطراب الهلع** قد يتشاركون في **نشاط جبهي-مخطّط وحوفي** مشابه، يرتبط بـ**زيادة التشتّت** تجاه المعلومات غير ذات الصلة.
- This model has **immediate treatment implications**: most anxiety disorders respond well to **pharmacotherapy** (for dysfunctional neurotransmission) and **cognitive-behavior psychotherapeutic interventions**.
  لهذا النموذج **انعكاسات علاجية مباشرة**: إذ تستجيب معظم اضطرابات القلق جيدًا لـ**العلاج الدوائي** (لخلل النقل العصبي) و**التدخلات النفسية المعرفية السلوكية**.

5. Genetics and other factors | الوراثة وعوامل أخرى

- **Genetics:** family history of hypochondriasis or anxiety issues.
  الوراثة: تاريخ عائلي لتوهّم المرض أو مشكلات القلق.

Other factors:

عوامل أخرى:

- **Major life stress event**.
  حدث حياتي ضاغط كبير.
- History of **abuse or neglect as a child**.
  تاريخ **إساءة أو إهمال في الطفولة**.
- History of **childhood illness**.
  تاريخ **مرض في الطفولة**.
- **Disturbance in perception** that magnifies normal sensations.
  اضطراب في الإدراك يضخّم الأحاسيس الطبيعية.
- Having **another mental disorder** (e.g., major depression, obsessive compulsive disorder, psychotic disorders).
  وجود **اضطراب نفسي آخر** (مثل الاكتئاب الجسيم والوسواس القهري والاضطرابات الذهانية).

5. DIAGNOSIS | التشخيص

ICD-10 and DSM-IV criteria | معايير التصنيف الدولي للأمراض (ICD-10) ومعايير DSM-IV

Criterion المعيار	ICD-10 ICD-10	DSM-IV DSM-IV
A أ	Either: a **persistent belief of at least six months** in the presence of a minimum of **two serious physical diseases** (**at least one must be specifically named by the patient**); or a persistent preoccupation (**body dysmorphic disorder**). أحد أمرين: **اعتقاد مستمر لمدة ستة أشهر على الأقل** بوجود **مرضين جسديين خطيرين على الأقل (يجب أن يسمّي المريض أحدهما بالتحديد)**؛ أو انشغال مستمر (**اضطراب تشوّه الجسم**).	Preoccupation with fears of having, or the idea that one has, a serious disease based on **misinterpretation of bodily symptoms**. انشغال بالخوف من الإصابة بمرض خطير، أو الاعتقاد بوجوده، استنادًا إلى **سوء تفسير الأعراض الجسدية**.
B ب	The preoccupation causes **persistent distress or interference with personal functioning** and leads the patient to **seek medical treatment or investigations** (or equivalent help from local healers). يسبب الانشغال **ضيقًا مستمرًا أو تداخلًا مع الأداء الشخصي** في الحياة اليومية، ويدفع المريض إلى **طلب العلاج الطبي أو الفحوصات** (أو مساعدة مماثلة من المعالجين المحليين).	The preoccupation **persists despite appropriate medical evaluation and reassurance**. يستمر الانشغال **رغم التقييم الطبي المناسب والطمأنة**.
C ج	**Persistent refusal to accept medical advice** that there is no adequate physical cause for the symptoms or physical abnormality. **الرفض المستمر لقبول النصيحة الطبية** بعدم وجود سبب جسدي كافٍ للأعراض أو للشذوذ الجسدي.	The preoccupation causes **clinically significant distress or impairment** in social, occupational or other important areas of functioning. يسبب الانشغال **ضيقًا أو اختلالًا ذا دلالة سريرية** في المجالات الاجتماعية أو المهنية أو غيرها من مجالات الأداء المهمة.

> Criterion C of both ICD-10 and DSM-IV is partly cut off at the bottom of the slides.
> المعيار "ج" في كل من ICD-10 وDSM-IV مقطوع جزئيًا في أسفل الشريحتين.

6. THERAPY RECOMMENDATIONS | التوصيات العلاجية

1. Establishment of therapeutic alliance | إقامة التحالف العلاجي

The outcome of psychological therapy. Steps:

وهو نتيجة العلاج النفسي. الخطوات:

- **Acknowledge the patient's pain and suffering**.

الاعتراف بألم المريض ومعاناته.

- Understand symptoms as a **form of emotional communication**.

فهم الأعراض على أنها **شكل من أشكال التواصل العاطفي**.

- **Search for comorbid** medical and psychiatric illness.

البحث عن أمراض مرافقة طبية ونفسية.

- Be aware of **emotional reactions and/or judgmental stance** towards the patient.

الانتباه إلى **ردود الفعل العاطفية و/أو الموقف الحُكمي** تجاه المريض.

- **Judiciously employ** diagnostic evaluation and referrals.

استخدام التقييم التشخيصي والإحالات بحكمة.

2. Maintenance of therapeutic relationship | الحفاظ على العلاقة العلاجية

- **Reassure** the patient that evaluation will be **ongoing**.

طمأنة المريض بأن التقييم **سيستمر**.

- Focus on **care and not cure** of the patient.

التركيز على **رعاية المريض لا شفائه**.

- Emphasize that treatment requires **regular scheduled visits**.

التأكيد على أن العلاج يتطلب **زيارات منتظمة مجدولة**.

- Explain to the patient that he or she is **not 'crazy'**.

توضيح أنه **ليس "مجنونًا"**.

- Introduce the possibility that **psychological factors (stress)** may play a role in **amplification of underlying physical symptoms**.

طرح احتمال أن **العوامل النفسية (الضغوط)** قد تسهم في **تضخيم الأعراض الجسدية الكامنة**.

- **Educate** the patient regarding etiology and treatment if they are ready to listen.

تثقيف المريض حول السببيات والعلاج إذا كان مستعدًا للاستماع.

- Stay current with **routine healthcare maintenance**.

مواكبة **الرعاية الصحية الروتينية**.

3. Psychotherapy | العلاج النفسي

- **Counseling:** sometimes simply discussing fears can help.

الإرشاد: أحيانًا يفيد مجرد الحديث عن المخاوف.

- **Support groups:** the patient joins a group of other people who have hypochondriasis to discuss experiences and strategies to manage the disorder.

مجموعات الدعم: ينضم المريض إلى مجموعة من المصابين بتوهّم المرض لمناقشة التجارب واستراتيجيات التعامل مع الاضطراب.

- **Exposure plus response prevention therapy:** a mental health professional helps the patient **confront fears** and teaches the patient how to **relax and release anxiety**.

العلاج بالتعريض ومنع الاستجابة: يساعد اختصاصي الصحة النفسية المريض على **مواجهة مخاوفه** ويعلّمه كيف **يسترخي ويتخلص من القلق**.

- **Cognitive-behavioral therapy**.

العلاج المعرفي السلوكي.

- **Behavioral stress management**.

إدارة الضغوط السلوكية.

- **Problem-solving therapy**.

العلاج بحل المشكلات.

4. Pharmacotherapy | العلاج الدوائي

- **Placebo:** each patient will receive placebo in 10 or 20 mg pills given according to the schedule.

الدواء الوهمي: يتلقى كل مريض دواءً وهميًّا في حبوب 10 أو 20 ملغ تُعطى وفق الجدول.

- **Antidepressants: SSRIs, SNRIs, tricyclic antidepressants** and others (e.g., **mirtazapine** and **trazodone**).
  مضادات الاكتئاب: مثبّطات استرداد السيروتونين الانتقائية، ومثبّطات استرداد السيروتونين والنورإبينفرين، ومضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات، وغيرها (مثل **ميرتازابين وترازودون**).
- **Antipsychotics:** second-generation antipsychotics (e.g., **risperidone, olanzapine and quetiapine**) or **pimozide**.
  مضادات الذهان: مضادات الذهان من الجيل الثاني (مثل **ريسبيريدون وأولانزابين وكيتيابين**) أو **بيموزايد**.

> The placebo wording in the slide looks like a trial protocol and is kept as written.
> صياغة الدواء الوهمي في الشريحة تبدو كأنها من بروتوكول تجربة سريرية، وقد أُبقيت كما وردت.