

# LGE - SNU AI Scientist 고급과정

## 확률통계 및 통계 방법론

### 과제2

2026년 01월

**문제 1.** 어떤 온라인 강의 플랫폼에서 한 사용자의 강의 시청 시간은 평균 30분, 표준편차 5분인 분포를 따른다고 하자. 서로 다른 사용자의 시청 시간은 서로 독립이라고 가정한다. 무작위로  $n = 100$  명의 사용자를 선택하여 이들의 평균 시청 시간을  $\bar{X}$  라 하자.  $\bar{X}$  가 29분 이상 31분 이하일 확률을 아래의 표를 참고하여 구하여라. (단,  $Z$ 는 표준정규분포를 따르는 확률변수이다.)

$z$	$P(0 \leq Z \leq z)$
1.0	0.341
1.5	0.433
2.0	0.477
2.5	0.494
3.0	0.499

**문제 2.** 음악 스트리밍 서비스에서 임의로 한 명의 사용자를 선택했을 때, 그 사용자가 시스템이 추천한 곡을 끝까지 재생하면 1, 중간에 종료하면 0으로 기록한다고 하자. 이를 확률변수  $X$ 로 두면, 확률변수  $X$ 는 다음과 같은 분포를 가진다.

$$P(X = 1) = 0.7, \quad P(X = 0) = 0.3$$

서로 다른 다섯 명의 사용자를 무작위로 선택하여 관측한 반응을  $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5$ 라고 하자. 각 사용자의 반응은 서로 독립이며 동일한 확률분포를 따른다고 가정한다. 이때 표본평균을  $\bar{X} = \frac{X_1+X_2+X_3+X_4+X_5}{5}$ 라고 할 때, 다음의 물음에 답하여라.

- (a)  $\bar{X}$ 의 확률질량함수를 구하여라.
- (b)  $P(\bar{X} \geq 0.6)$ 을 구하여라.
- (c)  $E(\bar{X})$ 와  $\text{Var}(\bar{X})$ 를 구하여라.

**문제 3.** 음악 스트리밍 서비스에서 임의로 한 명의 사용자를 선택했을 때, 그 사용자가 시스템이 추천한 곡을 끝까지 재생하면 1, 중간에 종료하면 0으로 기록한다고 하자. 이를 확률변수  $X$ 로 두고, 각 사용자의 반응은 서로 독립이며

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

를 따른다고 하자. 서로 다른  $n = 100$ 명의 사용자를 무작위로 선택하여 얻은 결과를  $X_1, \dots, X_{100}$ 이라 하고, 추천된 음악을 끝까지 재생한 사용자의 수를  $Y = \sum_{i=1}^{100} X_i$ 라 하자. 관측 결과  $Y = 70$ 으로 나타났다. 표본비율을  $\hat{p} = Y/100$ 이라 할 때, 모비율  $p$ 의 95% 신뢰구간을 근사적으로 구하여라. (단,  $Z \sim N(0, 1)$ 에 대하여  $P(Z \leq 1.64) = 0.95$ ,  $P(Z \leq 1.96) = 0.975$ 이다.)

**문제 4.** 어떤 배달 주문 플랫폼에서는 하나의 주문 건에 대해 사용자가 남기는 리뷰 별점 유형을 세 가지로 분류한다. 각 반응은 다음과 같이 숫자 1, 2, 3으로 기록된다.

- 1: 낮은 수준의 만족도
- 2: 보통 수준의 만족도
- 3: 높은 수준의 만족도

한 사용자가 남기는 리뷰 별점을 확률변수  $X$ 로 나타낼 때, 이 반응은 다음과 같은 분포를 따른다고 알려져 있다.

$$P(X = 1) = \theta, \quad P(X = 2) = 2\theta(1 - \theta), \quad P(X = 3) = (1 - \theta)^2, \quad (0 < \theta < 1).$$

이제 서로 독립인 사용자의 리뷰 별점  $X_1, \dots, X_n$ 을 관측한 결과, 리뷰 별점이 1인 경우가  $n_1$  번, 2인 경우가  $n_2$  번, 3인 경우가  $n_3$  번 관측되었을 때, ( $n_1 + n_2 + n_3 = n$ 이 성립함은 알려져있다) 모수  $\theta$ 의 최대가능도추정량  $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$ 을 구하여라.

**Hint (로그 미분 공식)**

양의 함수  $f(\theta) > 0$ 에 대하여

$$\frac{d}{d\theta} \log f(\theta) = \frac{f'(\theta)}{f(\theta)}.$$

**문제 5.** 한 프로야구 타자가 실내 배팅 연습장에서 친 타구가 공중에 머무는 시간(단위: 초)을  $X$ 라 하자. 실내 환경에서 동일한 조건으로 타구가 발생하며, 각 타구는 서로 영향을 주지 않는다고 가정한다. 타구가 떨어질 때까지의 비행 시간  $X$ 는 평균이  $\mu$ 인 지수분포

$$f(x; \mu) = \frac{1}{\mu} e^{-x/\mu}, \quad x > 0$$

를 따른다고 하자. 이 타자가 친  $n$ 개의 독립적인 타구 비행 시간을  $X_1, \dots, X_n$ 이라 할 때, 모수  $\mu$ 의 최대가능도추정량  $\hat{\mu}_{\text{MLE}}$ 을 구하여라.

**Hint: 미분 공식**

- (로그 미분 공식)

양의 함수  $f(\mu) > 0$ 에 대하여

$$\frac{d}{d\mu} \log f(\mu) = \frac{f'(\mu)}{f(\mu)}.$$

- (지수함수의 합성함수 미분)

미분 가능한 함수  $g(\mu)$ 에 대하여

$$\frac{d}{d\mu} e^{g(\mu)} = e^{g(\mu)} g'(\mu).$$

특히,

$$\frac{d}{d\mu} e^{-a/\mu} = e^{-a/\mu} \cdot \frac{a}{\mu^2}, \quad (a > 0).$$

- (거듭제곱 함수의 미분)

상수  $k$ 에 대하여

$$\frac{d}{d\mu} \mu^{-k} = -k\mu^{-(k+1)}, \quad \frac{d^2}{d\mu^2} \mu^{-k} = k(k+1)\mu^{-(k+2)}.$$