1 Bulgular

Öğrencilerin tanıtıcı özellikleri iki üniversite için ayrı ayrı incelenmiştir.

A ve B üniversitelerinin son sınıf hemşirelik öğrencilerinin sosyodemografik özelliklerinin karşılaştırılması Tablo 1'de sunulmuştur. A Üniversitesindeki öğrencilerin yaş ortalaması 22,4 olarak bulunmuştur.

2 Kararlılık

İspat. Fark şemasında $v_k^n = r^k e^{in\theta}$ yazılır ve Von-Neumann analiz metodu kullanılırsa

$$\frac{r^2 - 2r + 1}{\tau h^2} = \frac{2r}{h^2}\left(\cos\theta - 1\right), \tag{1}$$

$$\frac{r^2 - 1}{2\tau} = \frac{r}{h^2}\left(e^{i\theta} - 2 + e^{-i\theta}\right) \tag{2}$$

elde edilir. Burada $n = 0$ ve $k = 1$ alınırsa

$$\frac{1}{\tau h^2}\left(re^{-i\theta} - 2r^2\right) = \frac{r}{h^2}\left(e^{i\theta} - 2\right), \tag{3}$$

$$\frac{r^2}{\tau} = \frac{2r}{h^2} \tag{4}$$

olur. Bu denklemin kökleri birim çemberin içinde kaldığından şema kararlıdır.

3 Öneriler

- La charge épidémiologique des maladies buccodentaires est marquée par des inégalités affectant également les groupes spécifiques.
- Binanın herhangi bir katında, her iki deprem doğrultusu için yapılmış olan performans analizi sonucu, kirişlerin en fazla yüzde yirmisi belirgin hasar bölgesine geçebilir.

Bulgular, uzun ve iç içe geçmiş tümcelerde terim tutarlılığının belirgin biçimde azaldığını göstermektedir. Ortalama terim tutarlılığı %87,4 olarak ölçülmüş; ancak kırk sözcükten uzun tümcelerde bu oran %71,2'ye düşmüştür. Bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < 0{,}01$).