

# Sur les racines imbriquées

Yvann Le Fay

Lycée Henri IV, 75005

Mai 2018, modifié en mars 2019

## 1 Définitions

Soient  $(u_n) \in (\mathbb{N} \setminus \{0\})^{\mathbb{N}}$ , la suite d'exposants des radicaux,  $C$  une constante positive et  $(f_n) \in \mathbb{R}^{+\mathbb{N}}$ . On définit pour tout  $n, m \in \mathbb{N}$ ,

$$A(n, m) = \begin{cases} f_n \sqrt[n]{C + A(n+1, m)}, & n \leq m \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

## 2 Inégalités, équivalents de $A(n, m)$

**Proposition 1.** Soient  $n, m \in \mathbb{N}$  tels que  $n \leq m$ , alors

$$A(n, m) \leq \sum_{j=1}^{m-n+1} \left( \prod_{k=0}^{j-1} u_{k+n} \right)^{-1} (C + f_{n+j-1}^{u_{n+j-1}})$$

*Démonstration.* Par récurrence, l'inégalité est vérifiée en  $n = m$  par l'inégalité arithmético-géométrique, on a

$$A(m, m) = f_m \sqrt[m]{C} \leq (C + f_m^{u_m})/u_m$$

Supposons qu'elle soit vérifiée pour  $n+1$ , i.e

$$A(n+1, m) \leq \sum_{j=1}^{m-n} \left( \prod_{k=0}^{j-1} u_{k+n+1} \right)^{-1} (C + f_{n+j}^{u_{n+j}})$$

Alors

$$\begin{aligned}
A(n,m) &= \sqrt[n]{f_n^{u_n}(C + A(n+1,m))} \\
&\leq \frac{1}{u_n}(f_n^{u_n} + C + A(n+1,m)) \\
&\leq \frac{1}{u_n} \left( f_n^{u_n} + C + \sum_{j=1}^{m-n} \left( \prod_{k=0}^{j-1} u_{k+n+1} \right)^{-1} (C + f_{n+j}^{u_{n+j}}) \right) \\
&= \frac{1}{u_n} \left( f_n^{u_n} + C + \sum_{j=2}^{m-n+1} \left( \prod_{k=0}^{j-1} u_{n+k} \right)^{-1} (C + f_{n+j-1}^{u_{n+j-1}}) \right) \\
&= \sum_{j=1}^{m-n+1} \left( \prod_{k=0}^{j-1} u_{n+k} \right)^{-1} (C + f_{n+j-1}^{u_{n+j-1}})
\end{aligned}$$

□

**Proposition 2.** Soient  $n, m \in \mathbb{N}$  tels que  $n \leq m$ , si  $(u_n)$  est de terme constant égal à  $r$  et  $f$  admet un prolongement dérivable et concave, alors

$$A(n,m) \leq \frac{C}{r-1} + \frac{1}{r} \sum_{s=0}^r \binom{r}{s} A^{r-s} B^s \Phi(r^{-1}, -s, 0)$$

où  $\Phi(z, s, a) = \sum_{k=0}^{+\infty} z^k (k+a)^{-s}$  et  $A = f(n)$ ,  $B = f'(n)$ .

*Démonstration.* D'après la proposition 1., on a

$$A(n,m) \leq \sum_{j=1}^{m-n+1} r^{-j} (C + f_{n+j-1}^{u_{n+j-1}}) = \underbrace{\frac{C}{r-1} (1 - r^{n-m-1})}_{=V} + \sum_{j=1}^{m-n+1} r^{-j} f_{n+j-1}^{u_{n+j-1}}$$

Or  $f$  est concave, ainsi  $\forall j \in \mathbb{N}$ ,

$$f(n+j-1) \leq A + B(j-1)$$

Ainsi

$$\begin{aligned}
A(n,m) &\leq V + \sum_{j=1}^{m-n+1} \sum_{s=0}^r \binom{r}{s} A^{r-s} B^s \frac{(j-1)^s}{r^j} \\
&= V + \frac{1}{r} \sum_{s=0}^r \sum_{j=0}^{m-n} \binom{r}{s} A^{r-s} B^s \frac{j^s}{r^j}
\end{aligned}$$

Or

$$\begin{aligned}
\sum_{j=0}^{m-n} \frac{j^s}{r^j} &= \underbrace{\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{j^s}{r^j}}_{=\Phi(r^{-1}, -s, 0)} - \underbrace{\sum_{j=m-n+1}^{+\infty} \frac{j^s}{r^j}}_{=r^{n-m-1} \Phi(r^{-1}, -s, m-n+1)}
\end{aligned}$$

Enfin, asymptotiquement pour  $m$ , on obtient le résultat.

□

**Proposition 3.** Soient  $n, m \in \mathbb{N}$  tels que  $n < m$ , si on dispose de deux suites  $((\lambda_k), (\mu_k))_{k \in \llbracket n+1; m \rrbracket}$  tels que  $\lambda_k A(k, m) \leq C + A(k, m) \leq \mu_k A(k, m)$  alors on a

$$f_n \prod_{j=1}^{m-n} (f_{n+j} \lambda_{n+j})^{P_{j,n}} \leq A(n, m) \leq f_n \prod_{j=1}^{m-n} (f_{n+j} \mu_{n+j})^{P_{j,n}}$$

où

$$P_{j,n} = \left( \prod_{i=0}^{j-1} u_{i+n} \right)^{-1}$$

*Démonstration.* On traite par récurrence l'inégalité de droite, *mutatis mutandis* pour celle de gauche. L'inégalité est vérifiée en  $n = m - 1$ , on a

$$A(m-1, m) = f_{m-1} \sqrt[m-1]{C + f_m \sqrt[m-1]{C}} \leq f_{m-1} \sqrt[m-1]{\mu_m f_m}$$

Supposons qu'elle soit vérifiée pour  $n+1$ , i.e

$$A(n+1, m) \leq f_{n+1} \prod_{j=1}^{m-n-1} (f_{n+1+j} \mu_{n+1+j})^{P_{j,n+1}}$$

Alors

$$\begin{aligned} A(n, m) &= f_n \sqrt[n]{C + A(n+1, m)} \leq f_n \sqrt[n]{\mu_{n+1} A(n+1, m)} \\ &\leq f_n \sqrt[n]{\mu_{n+1} f_{n+1} \prod_{j=2}^{m-n} (f_{n+j} \mu_{n+j})^{P_{j-1, n+1}}} \\ &= f_n \prod_{j=1}^{m-n} (f_{n+j} \mu_{n+j})^{P_{j,n}} \quad \text{car } u_n^{-1} P_{j-1, n+1} = P_{j,n} \end{aligned}$$

**Remarque.** On a égalité si et seulement si  $\lambda_k = 1 + \frac{C}{A(k, m)}$ . □

**Proposition 4.** Si  $f$  est une fonction croissante et  $(u_n)$  de terme constant égal à  $u$ ,  $\lambda$  tel que quelque soit  $k \geq n$ ,  $\lambda A(k, \infty) \leq C + A(k, \infty)$  alors

$$f_n (\lambda f_n)^{\frac{1}{u-1}} \leq A(n, \infty)$$

Aussi, si  $f$  est décroissante,  $(u_n)$  de terme constant égal à  $u$  et  $\mu$  tel que quelque soit  $k \geq n$ ,  $\mu A(k, \infty) \geq C + A(k, \infty)$  alors

$$f_n (\lambda f_n)^{\frac{1}{u-1}} \geq A(n, \infty)$$

*Démonstration.* D'après la proposition 3, on a pour la majoration (*mutatis mutandis* pour la minoration)

$$f_n (\lambda f_n)^{\frac{1}{u-1}} = f_n \prod_{j=1}^{\infty} (\lambda f_n)^{u^{-j}} \leq f_n \prod_{j=1}^{\infty} (\lambda f(n+j))^{u^{-j}} \leq A(n, \infty)$$

□

**Proposition 5.** Si  $u_n$  est égale constante  $u$ ,  $f_n \sim f_{n+j}$  et que  $A(n, +\infty)$  tend vers  $+\infty$  alors

$$f_n^{\frac{u}{u-1}} \sim A(n, \infty)$$

*Démonstration.* Posons pour tout  $k \geq n$   $\lambda_k = 1 + \frac{C}{A(k, m)}$ , soit  $\varepsilon > 0$ , il existe  $N \in \mathbb{N}$  tel que pour tout  $n \geq N$ ,

$$\left| \frac{C}{A(n, +\infty)} \right| < \varepsilon \text{ et } \left| \frac{f_n}{f_N} - 1 \right| < \varepsilon$$

Aussi d'après la proposition 3,

$$f_n \prod_{j=1}^{m-n} \left( f_{n+j} \left( 1 + \frac{C}{A(n+j, m)} \right) \right)^{u^{-j}} = A(n, m)$$

Ainsi pour  $n \geq N$ ,  $j \geq 1$ , on a  $f_N(1 - \varepsilon) < f_{n+j} < f_N(1 + \varepsilon)$

$$f_n \prod_{j=1}^{m-n} \left( f_N(1 - \varepsilon)^2 \right)^{u^{-j}} < A(n, m) < f_n \prod_{j=1}^{m-n} \left( f_N(1 + \varepsilon)^2 \right)^{u^{-j}}$$

Enfin pour  $m \rightarrow +\infty$ ,

$$f_n(f_N(1 - \varepsilon)^2)^{1/(u-1)} \leq A(n, \infty) \leq f_n(f_N(1 + \varepsilon)^2)^{1/(u-1)}$$

D'où le résultat pour  $\varepsilon \rightarrow 0$ , i.e  $N \rightarrow n$ . □

**Proposition 6.** Une autre forme de  $A(n, m)$  est

$$A(n, m) = \sqrt[n]{a_{n,1} + \sqrt[n+1]{a_{n,2} + \dots + \sqrt[n]{a_{n, m-n+1}}}} \text{ avec } a_{n,i} = C \prod_{j=1}^i f_{j+n-1}^{Q_{j,i,n}} \text{ où } Q_{j,i,n} = \prod_{l=0}^{i-j} u_{n+l}$$

*Démonstration.* L'égalité est vérifiée pour  $n = m$ , on a

$$A(m, m) = f_m \sqrt[n]{C} = \sqrt[n]{f_m^u C}$$

Supposons qu'elle soit vérifiée pour  $n + 1$ , i.e

$$A(n+1, m) = \sqrt[n+1]{a_{n+1,1} + \dots + \sqrt[n]{a_{n+1, m-n}}}$$

Alors

$$A(n, m) = \sqrt[n]{C f_n^{u_n} + \sqrt[n+1]{f_n^{u_n u_{n+1}} a_{n+1,1} + \dots + \sqrt[n]{f_n^{Q_{1, m-n+1, n}} a_{n+1, m-n}}}}$$

Ainsi,  $a_{n,1} = C f_n^{u_n}$ , de plus pour  $2 \leq i \leq m - n + 1$ ,  $a_{n,i} = a_{n+1, i-1} f_n^{Q_{1, i, n}}$ , ce qui est attendu. □

**Remarque.** Cette forme peut être utilisée pour appliquer le théorème de convergence de Herschfeld.