

인간작업모델을 기반으로 한 여가활동이 지역사회 거주 장애인의 삶의 질, 자기효능감, 시간 사용에 미치는 영향

임지현*, 유대성*, 유서진*, 이지혜*, 김희**

*건양대학교 의과대학 학부생

**건양대학교 의과대학 작업치료학과 부교수

국문초록

목적: 본 연구는 인간작업 모델을 기반으로 한 여가활동이 지역사회 거주 장애인의 삶의 질, 자기효능감, 시간 사용에 미치는 영향을 알아보고자 하였다.

연구방법: 본 연구는 보건소 지역사회 재활 사업에 참여하는 지역사회 거주 장애인 15명을 선정하여 대상으로 했다. 대상자와 작업치료 학부생 봉사자 2~3명을 매칭하였고, 지역사회 재활 담당 작업치료사와 작업치료학과 교수의 지도하에 평가와 중재를 제공하였다. 연구설계는 단일집단 사전·사후 설계를 적용했다. 중재는 10주 동안 10회기 실시하였으며 중재 전·후를 비교하기 위해 삶의 질 평가를 위해 한국판 WHO 삶의 질 척도-단축형(Korean Version of The World Health Organization Quality of Life Brief Version), 자기효능감 평가를 위해 일반적 자기효능감 척도(General Self-efficacy Scale), 시간 사용 평가를 위해 작업 질문지(Occupational Questionnaire; OQ)를 사용하였다.

결과: 10주간의 인간 작업모델을 기반으로 한 여가활동을 통해 지역사회 거주 장애인의 삶의 질은 전반적 삶의 질, 신체적 건강, 사회적 관계에서 상승을 보였다. 자기효능감은 유의한 변화를 보이지 않았다. 시간사용은 OQ의 전 문항에서 유의하게 변화가 있었다.

결론: 지역사회 거주 장애인이 삶에서 원하는 여가활동을 할 수 있도록 많은 방문재활이 이루어지기를 기대한다.

주제어: 방문재활, 여가활동, 인간작업모델, 지역사회 장애인

1. 서론

2022년 한국장애인고용공단 고용개발원의 2022 장애인 통계를 보면 등록 장애인 수는 약 264만 명으로 전체 인구의 5.12%에 해당한다(Korea Employment Agency for Persons with Disability, 2022). 2018년 정부는 지역사회 돌봄으로 장애인의 지역사회 통합을 달

성하고, 재가·지역사회 중심으로 서비스 제공을 추진하는 등과 같이 장애인의 탈시설화 경향이 나타났다. 이에 장애인의 인권을 강조하는 흐름에 따라 지역사회에서 장애인이 인간다운 삶을 누리는 것에 대한 관심이 커지고 있는 현실이다(Kim & Rho, 2018; Seo & Seo, 2020).

삶의 질은 개인의 특성과 환경 요인에 의해 영향을 받는 핵심 영역으로 구성된 다차원적인 현상이며, 상대적

ORCID: Kim, Hee, <https://orcid.org/0000-0001-6867-2274>

Corresponding author: Kim, Hee (heekim@konyang.ac.kr/Dept. of Occupational Therapy, Konyang University)

Received 5 March 2024; Revised 12 April 2024; Accepted 7 May 2024

인 가치와 중요성에 따라 다르다(Grabowska et al., 2021). 인간작업모델(Model of Human Occupation; MOHO)에서 사람은 환경과 영향을 주고받으며 적응하는 생물이기 때문에, 인간의 가치는 개인에게 중요한 활동이 무엇이고 얼마나 참여하는지에 따라 변화하며, 삶의 질과 긴밀한 관계를 가지고 있다(Lee et al., 2007). 장애인의 여가활동 참여는 여가 만족과 삶의 질에 긍정적인 영향을 주며 사회적 관계망 확장 및 삶의 활력소가 될 수 있다(Nam & Lee, 2017; Shin, 2017). 2018년 문화향수실태조사를 분석한 Oh와 Koo (2019)의 논문에 따르면 장애인의 문화·여가활동의 비율이 전체 국민의 비율보다 현저히 낮은 수준이었다. 이에 영향을 주는 요인으로는 건강이나 체력 부족, 경제적 부담, 시간 부족, 열악한 접근성, 장애인을 위한 시설 부족, 의사소통의 어려움 등이 있다(de Hollander & Proper, 2018; Lee, 2018).

자기효능감은 성공적인 결과를 만들어 낼 수 있다는 개인의 능력에 대한 기대나 확신이며 개인의 주관적인 특성 및 수행과 관련이 있다(Kim et al., 2017; Lee & Kim, 2021). 인간작업모델(MOHO)의 의지(volition)는 인간의 작업에 영향을 미친다고 설명하였으며, 이는 인지된 자기효능감, 어려움과 실패를 해결하려는 노력 등에 인간의 동기가 영향을 받는다고 설명한 Bandura의 자기효능감 이론과 유사한 개념이다(Harel-Katz & Carmeli, 2019). 장애인의 자기효능감에 긍정적인 영향을 주는 여가활동 유형으로는 사회단체, 오락·사회활동 등이 있다(Chon, 2017).

작업치료사는 작업 참여, 생산적인 시간 사용, 생활방식을 전문적으로 중재하며, 시간사용 중재는 인간작업모델(MOHO)을 이론적 근거로 한다(Brown et al., 2021; Lee & Jung, 2021). 이를 해결하기 위해서는 작업 수행의 균형이 이뤄진 시간 사용이 필요하며, 작업균형은 개인의 건강 및 삶의 질 향상에 영향을 줄 수 있다(Choi et al., 2022; Lee & Jung, 2021).

인간 작업 모델(MOHO)은 작업 중심의 수행을 지원하며 클라이언트의 요구 우선순위에 맞추도록 한다(Kielhofner, 2008). 또한, 치료적 작업을 클라이언트가 관심 있는 활동을 위주로 하여 능동적인 활동 참여를 유도한다(Lim & Jung, 2013). 여기서 작업은 자발적인 생

각과 감정에 의해 동기부여가 되고, 습관과 역할이 수행요소를 가능할 수 있게 한다고 제시하였다(Kielhofner, 2008).

현재 장애인들은 주로 TV 시청, 독서 등 정적인 여가활동을 한다(Nam & Lee, 2017). 이러한 정적이고 수동적인 여가활동은 낮은 자기효능감과 삶의 질에 영향을 주게 된다(Hong & Kim, 2015). Heo 등(2019)의 연구에서는 뇌졸중 환자의 신체기능, 삶의 만족도, 자기효능감에 고객중심 여가활동이 미치는 영향에 대해 알아보았으며 삶의 만족도와 균형, 자기효능감을 향상되었다고 보고했다. Kwon 등(2022)의 논문에서는 장애인과 비장애인의 여가활동 참여를 비교하여 장애인들이 동적 여가활동 참여에도 불구하고 정적인 여가활동의 만족도가 높음을 확인하였다. Lee와 Jung (2021)의 선행연구는 국내 장애인을 대상으로 시간 사용 중재의 효과를 알아보았으며, 삶의 질 및 만족도, 자기효능감 등에서 긍정적인 효과가 있음을 확인하였다. 앞서 제시한 연구들에서는 지역사회가 아닌 기관 중심으로 진행되었으며 참여 대상자 개인의 특성과 기능적인 수준, 흥미 및 선호도를 고려한 개별 여가활동 프로그램이 아닌 집단으로 제공되었다.

따라서 지역사회에 거주하는 장애인을 대상으로 개별 여가활동 프로그램을 진행하고 삶의 질, 자기효능감, 시간 사용에 미치는 영향을 탐색하고자 한다.

II. 연구방법

1. 대상자

본 연구는 건양대학교 생명윤리위원회(IRB No. KYU-2023-04-009-002)의 승인을 받아 진행하였다. D 지역에 거주하고 있는 지역사회 거주 장애인을 대상으로 보건소 재활 서비스를 이용하고 있으며, 일상생활에서 의사소통이 가능한 자이다. 표본의 크기를 산출하기 위해 G*Power 3.1.9.2를 사용하였다. 선행연구(Heo et al., 2019)를 참고하여 대응표본 t 검정의 검정력($1 - \beta$) 0.90, 양측 유의수준(α) 0.05, 효과크기 (d) 0.80을 적용한 결과 최종 표본 수 19명이었다. 대상자의 20% 탈락률을 고려

하여 총 21명으로 선정하였다. 선별기준은 MMSE-K 평가 결과 20점 이상으로 하였고, 선별기준에 충족하지 못한 5명과 건강상의 이유로 중재를 중단한 1명을 제외한 후 진행하였다. 연구목적에 충분히 이해하고 참여에 직접 서면 동의한 자로 최종 총 15명을 선별하였다.

2. 선별도구

1) 한국판 간이 정신상태 검사(Korean version of Mini-Mental State Examination; MMSE-K)

MMSE-K는 Kwon 과 Park (1989)이 MMSE를 한국판으로 번역 및 표준화한 것이다. 지남력, 기억 등록, 기억 회상, 언어기능, 이해 및 판단 영역 총 12문항을 약 5~10분 정도에 측정할 수 있는 평가도구이다. 검사 결과는 30점 만점에 24점이 정상, 20에서 23점은 치매 의심, 19점 이하는 확실한 치매로 판정된다. 검사-재검사 간 신뢰도는 0.88이며 검사자 간 신뢰도는 0.99이다(Lee & Yoo, 2013). 본 연구에서는 대상자의 인지 수준을 확인하기 위해 사용하였으며, MMSE-K 점수가 20점 이상인 자를 대상으로 선정하였다.

3. 평가도구

1) 한국판 WHO 삶의 질 척도-단축형(Korean Version Of WHOQOL-BREF)

WHOQOL-BREF는 26개의 항목으로 WHOQOL 하부척도의 평균점수와 가장 높은 상관관계가 있는 한 항목씩 선택되어 구성되었다. 의약품 및 의학적 도움에 대한 의존성, 통증과 불편, 부정적 생각에 대한 문항의 경우 역 채점 방식으로 구성되었다. 따라서 점수가 높을수록 삶의 질이 높다는 것을 의미한다. 선행연구(Min et al., 2000)의 결과 한국판 WHOQOL-BREF는 신뢰도, 내적 일관성, 타당도 등에서 적절한 평가도구임이 입증되었다. 본 연구에서 대상자의 삶의 질을 문화적, 사회적, 환경적인 배경에 중점을 두어 주관적인 평가를 하기 위하여 사용했다.

2) 일반적 자기효능감 척도(General Self-efficacy Scale; GSS)

일반적 자기효능감을 알아보기 위해 Sherer 등(1982)이 개발한 일반적 자기효능감 측정 도구를 사용하였다. 본 연구에서는 Kim과 Kim (2003)이 한국형으로 번안한 것을 사용했다. 주어진 과제 달성에 필요한 행동과정을 조직화하고 실행하는 가능성에 대한 개인의 신념에 대해 알 수 있으며 총 14문항으로 구성되어 있다. '전혀 자신없다'는 1점에서 '완전히 자신있다'는 10점으로 응답하여 점수 총점이 높을수록 자기효능감이 높음을 의미한다. 도구 개발 당시의 신뢰도 Cronbach's α 값은 0.86이었으며 Kim과 Ryo (2018)의 연구에서는 Cronbach's α 값이 0.98이다.

3) 작업 질문지(Occupational Questionnaire; OQ)

본 연구는 개인의 시간 사용을 알아보기 위해 인간작업모델(Model of Human Occupation; MOHO)에 기반을 둔 Smith 등(1986)에 의해 개발된 작업 질문지를 사용하였다. 오전 5시부터 오후 11시 30분까지 30분 간격으로 어떠한 활동을 했는지 기록한다. 평일과 주말로 나누어 일상적인 날을 기준으로 작성하도록 한다.

4) 흥미 체크리스트(Interest Checklist; IC)

개인의 흥미 유형과 특성에 대한 자료를 수집하고 이를 통해 일상에 걸쳐 관련된 흥미를 예견하기 위해 흥미 체크리스트를 사용하였다(Kielhofner & Neville, 1983). 각 개인의 역할, 활동 유형, 능력에 대한 정보를 얻을 수 있다. 평가도구의 검사-재검사 신뢰도는 0.84~0.92이다. 평가는 면접으로 질문지를 이용하여 진행하고, 정확한 환경과 자세는 규정되어 있지 않다.

4. 중재도구

1) 인간 작업모델(Model of Human Occupation; MOHO)

1980년 Kielhofner (2008)에 의해 시작되어 인간작업에 대해 광범위하고 통합적인 관점을 제공한다. 인간의 작업을 의지, 습관화, 수행능력 세 가지의 상호 관련

된 구성 요소로 정의하며 의지는 작업 동기, 습관화는 작업이 일상이나 패턴으로 조직화 되는 과정, 수행능력은 숙련된 작업 수행의 기초가 되는 신체적, 정신적 능력을 말한다. 이러한 구성 요소들은 작업 선택과 작업 행동에 영향을 주는 요소로 개인의 성향뿐만 아니라 환경의 영향도 매우 중요하다.

5. 연구 절차

인간 작업모델을 기반으로 한 여가활동이 지역사회 거주 장애인 삶의 질, 자기효능감, 시간 사용에 미치는 영향을 알아보기 위해 단일집단 사전-사후 설계(one group pretest-posttest design)를 사용하였다(Figure 1). 본 연구에 대한 설명문을 충분히 이해하고 연구 참여에 동의하는 대상자에게 서면으로 연구 참여 동의를 받았다.

대상자와 관련된 정보가 연구 이외의 목적으로 사용되지 않도록 하며 연구를 진행하였다. 본 연구에서는 대상자와 건양대학교 작업치료학과 3학년 학부생 봉사자를 1:2 또는 1:3을 원칙으로 그룹화하여 지역사회 재활 작업치료사와 작업치료학과 교수 지도하에 평가와 중재를 제공했다. 사전평가 1회기, 중재 8회기, 사후평가 1회기

로 총 10회기에 걸쳐 중재를 진행하였으며, 중재 시간은 주 1회, 1회기 당 약 60분이었다. 흥미체크리스트로 파악한 것을 바탕으로 대상자가 원하는 여가활동을 선정하였고, 진행한 여가활동 프로그램은 Table 1과 같다. 분류는 Yoon 등(2021)의 연구를 참고했다. 중재로 인한 삶의 질, 자기효능감, 시간사용의 변화를 알아보기 위해 사전-사후평가에 한국판 WHO 삶의 질 척도-단축형(Korean Version Of WHOQOL-BREF), 일반적 자기효능감 척도(General Self-Efficacy Scale; GSS), 일상적인 시간 조사표(Occupational Questionnaire; OQ)를 사용하였다.

6. 분석 방법

본 연구에서는 SPSS 28.0을 사용하였다. 대상자의 일반적 특성은 기술통계를 사용하였다. 프로그램 전·후 삶의 질, 자기효능감, 시간 사용의 차이는 정규성 검정을 만족하여 대응 t 검정(paired t -test)을 사용하였다. 통계학적 유의수준은 0.05로 정하였다.




Figure 1. Process of the Research

*WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life Brief Version

Table 1. Client-Centered Leisure Activity Program

Leisure classification	Activity
Physical activity	Going on a walk, healthy side stretching and massage, upper extremity rotation exercise
Media activity	Learn how to use a computer and tablet PC, watch favorite TV program together
Social activity	Talking past and current experience, communicate using question cards, share hobbies
Culture activity	Reading books, writing calligraphy about bible readings, visiting church, watching movies, visiting beer festivals, visiting local markets, writing calligraphy bible verses
Artistic activity	Cooking decorating cookies, cooking pizza, cooking chicken skewers and fish cake stew
	Coloring clay trays, create art with mosaics, painting nail polish, pipo painting, connecting dots and coloring, drawing
	Handicraft flower bookshelves, terrariums, assembling deform blocks, beads crafts, pizza and tteokbokki models with clay, cross-stitching jewels,
	Making pom-pom art activities, decorating picture frames with clay, flower fans, clay animals, coasters and ballpoint pens, hand mirrors, key chains using clay, planting plants
Sport/Game	Card games, board games, 500-piece puzzles, matching card games

III. 연구결과

1. 연구대상자의 일반적 특성

연구 대상자들에 대한 일반적 특성은 다음과 같다 (Table 2). 성별은 남성이 33.3%, 여성이 66.7%로 여성이 남성보다 많았다. 연령의 경우, 50대(46.7%)가 가장 많은 비율을 차지하였고 30대(6.7%), 40대(13.3%), 60대(26.7%), 70대(6.7%)를 합한 값과 비슷하게 나타났다. 결혼 상태 또한 기혼(46.7%)이 다른 항목의 결과를 합한 값과 유사하게 나타났으며, 교육수준은 고등학교(40.0%), 초등학교(20.0%), 대학교(20.0%), 중학교(13.3%), 무학(6.7%) 순이다. 장애 유형의 경우 뇌병변(80.0%)이 가장 많은 비율을 차지하였다.

2. 여가프로그램 중재 전 · 후 변화

1) 삶의 질 사전 · 사후

전반적 삶의 질(overall quality of life)에서 평균 3.07점에서 3.13점으로 약 0.6점 정도 상승하였다($p < 0.01$). 신체적 건강(physical health)에서는 평균 14.87점에서 18.07점으로 약 4.8점 정도 상승하였다($p <$

0.01). 사회적 관계(social relationships)에서도 평균 9점에서 9.80점으로 약 0.8점 상승하여($p < 0.01$) 통계적으로 유의한 변화가 나타났다(Table 3).

2) 자기효능감 사전 · 사후

통계적으로 유의하진 않았지만, 대상자들의 자기효능감은 사전 94.40점에서 사후 104.40점으로 프로그램 시행 후 약 10점 상승하였다(Table 4).

3) 시간 사용 사전 · 사후

여가(leisure), 수면 및 휴식(sleep/rest), 일상생활(ADL), 일(work) 모든 영역에서 시간 사용의 변화가 나타났다. 여가 시간이 334분에서 424분으로 약 90분 상승하였다($p < 0.01$). 수면 및 휴식 시간은 644분에서 520분으로 약 124분 감소하였다($p < 0.01$). 일상생활 시간은 304분에서 348분으로 약 44분 정도 증가하였다($p < 0.001$). 일 시간은 86분에서 112분으로 약 26분 정도 상승하여($p < 0.001$) 통계적으로 유의한 결과가 나타났다(Table 5).

Table 2. General Characteristics of Subject

(N = 15)

Characteristics	Division	n (%)
Gender	Male	5 (33.3)
	Female	10 (66.7)
Age	31~40	1 (6.7)
	41~50	2 (13.3)
	51~60	7 (46.7)
	61~70	4 (26.7)
	71~80	1 (6.7)
Married state	Unmarried	4 (26.7)
	Married	7 (46.7)
	Separation by death	2 (13.3)
	Divorce	2 (13.3)
Level of education	Illiteracy	1 (6.7)
	Primary school	3 (20.0)
	Middle school	2 (13.3)
	High school	6 (40.0)
	University	3 (20.0)
Disability type	Physically disability	2 (13.3)
	Intellectual disability	1 (6.7)
	Brain lesions	12 (80.0)

The sum of the percentages does not equal 100% because of rounding

Table 3. WHOQOL-BREF Result of Changes in Activities

(N = 15)

	Variable	Pre	Post	<i>t</i>	<i>p</i>
		<i>M</i> ± <i>SD</i> (score)			
WHOQOL-BREF	Overall Quality of life	3.07 ± 0.96	3.13 ± 0.83	-0.367	0.004**
	General health	2.27 ± 0.88	2.87 ± 1.06	-1.871	0.490
	Physical health	14.87 ± 5.95	18.07 ± 5.43	-2.731	0.005**
	Psychological health	16.47 ± 4.42	29.87 ± 40.00	-1.310	0.617
	Social relationships	9.00 ± 3.74	9.80 ± 3.67	-1.206	0.001**
	Environment	21.27 ± 8.04	25.06 ± 10.06	-1.841	0.051
	Total score	61.60 ± 14.98	83.33 ± 38.70	-2.068	0.058

WHOQOL-BREF: World Health Organization Quality of Life Brief Version, SD: Stanard Deviation

***p* < 0.01

Table 4. General Self-efficacy Scale Result of Changes in Activities

(N = 15)

Variable	Pre	Post	<i>t</i>	<i>p</i>
	<i>M</i> ± <i>SD</i> (score)			
General Self-efficacy Scale	94.40 ± 21.67	104.40 ± 18.37	-1.939	0.073

SD: Stanard Deviation

Table 5. Occupational Questionnaire Result of Changes in Activities

(N = 15)

Variable		Pre	Post	<i>t</i>	<i>p</i>
		<i>M</i> ± <i>SD</i> (min)			
Occupational Questionnaire	Leisure	334.00 ± 270.92	424.00 ± 236.73	-1.667	0.006**
	Sleep/Rest	644.00 ± 253.00	520.00 ± 256.00	2.658	0.001**
	ADL	304.00 ± 166.21	348.00 ± 261.49	-0.991	0.001***
	Work	86.00 ± 124.66	112.00 ± 143.64	-1.992	0.001***

p* < 0.01, *p* < 0.001

SD: Stanard Deviation

Ⅳ. 고 찰

본 연구는 지역사회 거주 장애인을 대상으로 인간 작업모델 기반의 방문 재활 여가활동 프로그램 중재 전·후 삶의 질, 자기효능감, 시간사용에 미치는 영향을 알아보고자 실시하였다. 10주간의 방문 재활 프로그램 시행 후 지역사회 거주 장애인들의 삶의 질 영역 모두 점수 상승을 보였으며 전반적 삶의 질, 신체적 건강, 사회적 관계에서 통계적으로 유의미한 변화가 나타났다. 이를 통해서 여가활동이 삶의 질에 긍정적인 영향을 준다는 것을 확인할 수 있었다. 모든 영역의 점수 상승은 방문재활 여가활동 프로그램을 통해 기존에 장애인의 여가를 제한했던 요소 중 접근성에 대해 본 중재를 통해 용이하게 했기 때문이라고 판단된다. 이를 통해 장애인이 지역사회 참여할 수 있는 기회가 늘어남에 따라 사회적 상호작용 영역과 능동적인 신체 움직임으로 신체적 건강에 영향을 주었을 것으로 추정된다.

자기효능감은 프로그램 전·후 약 10점 상승했지만, 통계적으로 유의미하지 않았다. 병원 내 운동 치료실에서 뇌졸중 환자를 대상으로 고객중심 여가활동이 자기효능감을 향상시켰다고 보고한 Heo 등(2019)의 연구에서는 주 3회 60분 총 24회 실시하였다. 더 적은 주 1회 60분 총 10회기를 진행한 본 연구에서 유의미한 변화를 도출하기에 충분한 치료 강도가 아니었을 수 있다. 또한 반복적인 행동으로 습관화가 이루어지기에 부족한 시간이었다고 추측할 수 있다(Johnson & Stevenson, 2016).

프로그램 전·후 연구대상자들의 수면 및 휴식 시간사용량은 약 124분 감소했고 여가(leisure) 약 90분, 일상

생활(ADL) 약 44분, 일(work) 약 26분 정도 시간사용량이 증가했으며 통계적으로 유의미하였다. 이는 무의미하게 보내던 시간이 감소하고 작업에 참여하는 시간이 증가한 것으로 추정된다. 장애 및 여가 참여패턴을 연령대별로 조사한 Shandra (2021)의 연구에서는 정적이고 수동적인 시간은 해롭다고 하였다. 본 연구의 연구대상자가 원하는 활동을 직접 선택하고 능동적으로 시간을 보냄으로써 이러한 결과가 도출되었다고 추측할 수 있다.

본 연구에서는 기존 연구(Heo et al., 2019; Lee & Jung, 2021; Kwon et al., 2022)의 제한점이었던 개별 맞춤 여가활동 중재가 이루어지지 않았던 점을 학부생 봉사자 2~3명으로 구성된 한 팀과 대상자 한 명을 매칭하여 개별 맞춤 여가활동 프로그램으로 보완하였다. 본 연구의 제한점은 첫째, 대조군이 없는 단일 연구로 통제되지 않은 환경에 영향을 받았을 수도 있다. 둘째, G*Power 3.1.9.2를 통해 산출한 표본 수는 19명이지만 본 연구의 대상자는 15명으로 최소 표본 수를 충족하지 못하였다. 셋째, 주 1회·10회기의 짧은 중재 기간이다. Nielsen 등(2017)에서는 3개월, 6개월, 12개월의 작업 중심 중재 결과 기간은 큰 영향을 미치지 않는다고 보고하였다. Kim과 Kim (2020)의 연구에서는 월 1회·10회기로 장기간 중재하는 방법이 더욱 효과적인 방법임을 서술하였다. 마지막으로 국외 장애인을 대상으로 한 여가활동 연구를 살펴보았을 때 Vincent-Onabajo와 Blasu (2016)의 연구 55명, Harrison 등(2022)의 연구 2,000명, Schnitzler 등(2019)의 연구 33,785명으로 본 연구는 15명의 적은 표본 수로 일반화에 어려움이 있다.

V. 결 론

본 연구는 지역사회 거주 장애인을 대상으로 인간 작업모델 기반의 여가활동 프로그램을 통하여 대상자의 삶의 질, 자기효능감, 시간사용의 변화를 알아보았다. 이에 본 연구는 지역사회에 거주하고 있는 장애인이 기존의 환경에서 원하는 여가활동을 할 수 있도록 보다 많은 방문재활 프로그램이 이루어지기를 기대하는 바이다. 방문재활에 관한 연구는 지속적으로 발전하고 있으며, 향후 연구에서는 본 연구를 보완하여 전문성과 체계를 갖추고, 변수 간의 미치는 영향을 알아보기 위해 대조군을 설정해야 할 것이다.

References

- Brown, T., Bourke-Taylor, H., Isbel, S., Cordier, R., & Gustafsson, L. (2021). *Occupational therapy in Australia*. Taylor & Francis. doi:10.4324/9781003150732
- Choi, J. H., Hwang, H. S., & Kim, S. K. (2022). Time use and occupational balance of developmentally disabled people participating in vocational rehabilitation. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 30(1), 51-63. doi:10.14519/kjot.2022.30.1.05
- Chon, L. S. (2017). Influence of the disabled's leisure activity types on self-esteem and self-efficacy: In Gwangju-Metropolitan City, *The Journal of Humanities and Social Sciences*, 8(6), 885-900.
- de Hollander, E. L., & Proper, K. I. (2018). Physical activity levels of adults with various physical disabilities. *Preventive Medicine Reports*, 10, 370-376. doi:10.1016/j.pmedr.2018.04.017
- Grabowska, I., Antczak, R., Zwierzchowski, J., & Panek, T. (2021). Individual quality of life and the environment-towards a concept of livable areas for persons with disabilities in Poland. *BMC Public Health*, 21(1), 740. doi:10.1186/s12889-021-10797-7
- Harel-Katz, H., & Carmeli, E. (2019). The association between volition and participation in adults with acquired disabilities: A scoping review. *Hong Kong Journal of Occupational Therapy*, 32(2), 84-96. doi:10.1177/1569186119870022
- Harrison, J., Thetford, C., Reeves, M. J., Brown, C., Joshi, M., & Watkins, C. (2022). Returning to leisure activity post-stroke: Barriers and facilitators to engagement. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(21), 14587. doi:10.3390/ijerph192114587
- Heo, M. R., Son, B. Y., & Bang, Y. S. (2019). Effects of client-centered leisure activities on the physical function, self-efficacy and life satisfaction of stroke patients. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 27(3), 15-31. doi:10.14519/kjot.2019.27.3.02
- Hong, S. Y., & Kim, K. M. (2015). Correlation between the leisure activity participation and the self-efficacy with chronic stroke patient. *Journal of Rehabilitation Research*, 19(2), 277-296.
- Johnson, B., & Stevenson, H. (2016). Modernizing leisure assessment through technology applications. *Occupational Therapy Capstones*, 98. <https://commons.und.edu/ot-grad/98>
- Kielhofner, G. (2008). *Model of human occupation: Theory and application* (4th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Kielhofner, G., & Neville, A. (1983). *The modified interest checklist*. University of Illinois.
- Kim, A. R., & Kim, H. (2020). Effects of visiting occupational therapy on cognition, social participation, and daily life of people with disabilities in the community: Focusing on WHODAS 2.0. *Korean Journal of Occupational*

- Therapy*, 28(4), 99-110. doi:10.14519/kjot.2020.28.4.08
- Kim, H. S., & Kim, Y. S. (2003). A study on the quality of life, self-efficacy and family support of stroke patients in oriental medicine hospitals. *Korean Journal of Health Education and Promotion*, 20(1), 111-130.
- Kim, K. U., Oh, H. W., & Kim, H. (2017). The effect of occupation-centered transition program on self-efficiency and social participation for adult with intellectual disability. *Journal of Digital Convergence*, 15(2), 441-449. doi:10.14400/JDC.2017.15.2.441
- Kim, S. Y., & Rho, B. I. (2018). Individual/family/institutional determinants of life satisfaction of the mentally disabled residing in community medical institutions. *Journal of Regional Studies*, 26(2), 103-118. doi:10.31324/JRS.2018.06.26.2.103
- Korea Employment Agency for Persons with Disability. (2022). *2022 Disabled statistics at a glance* (Basic Task Report 2022-03). Kead EDI. <https://viewer.kead.or.kr/streamdocs/view/sd/streamdocsId=90a6fzwwK3xV8wVR2-yemkHwUfulXIpm-BUa5nEjaTc>
- Kwon, H. J., Jang, J. S. & Lee, N. R. (2022). Comparative analysis study of leisure activities between disabled person and non-disabled person: Based on 2019 national leisure activity survey. *The Journal of Korean Society of Assistive Technology*, 14(1), 11-22.
- Kwon, Y. C., & Park, J. H. (1989). Korean version of mini-mental state examination (MMSE-K) Part I: Development of the test for the elderly. *Journal of the Korean Neuropsychiatric Association*, 28(1), 125-135.
- Lee, C. S., & Kim, M. S. (2021). The effect of ability of people with developmental disabilities for social activities (Interpersonal ability, Ability for daily activities, Participation in social activities, Communication ability) on employment and job maintenance: Focusing on the mediating effect of self-efficacy. *GRI Review*, 23(3), 67-91.
- Lee, E. A., & Jung, J. H. (2021). The effects of time-use intervention for disabled in Korea: A systematic review. *Journal of Digital Convergence*, 19(11), 565-573. doi:10.14400/JDC.2021.19.11.565
- Lee, M. K. (2018). Social, cultural and leisure activities of people with disabilities: Current state and policy implications. In *Health and welfare policy forum* (Vol. 263, pp. 73-88). *Korea Institute for Health and Social Affairs*. doi:10.23062/2018.09.7
- Lee, T. Y., Jung, M. Y., Chung, B. I., Yoo, E. Y., Chang, S. J., & Nam, E. W. (2007). Quality of life and activity levels in the elderly based on the model of human occupation. *The Journal of Korean Society of Occupational Therapy*, 17(1), 1-16. doi:10.1080/11038120903082260
- Lee, Y. N., & Yoo, E. Y. (2013). The effects of errorless learning on mild demented old adult's memory: A single subject research design. *The Journal of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 7(1), 15-22.
- Lim, K. M., & Jung, M. Y. (2013). Clinical application of Model of Human Occupation for fragile older adult: A case study. *The Journal of Occupational Therapy for the Aged and Dementia*, 7(1), 23-33.
- Min, S. K., Lee, C. I., Kim, K. I., Suh, S. Y., & Kim, D. K. (2000). Development of Korean version of WHO quality of life scale abbreviated version (WHOQOL-BREF). *Journal of Korean Neuropsychiatric Association*, 39(3), 571-579.
- Nam, H. J., & Lee, H. J. (2017). Correlates of the participation of leisure activities, leisure satisfaction, and quality of life among disabled people. *Journal of Rehabilitation Research*,

21(1), 121-140.

- Nielsen, T. L., Petersen, K. S., Nielsen, C. V., Strøm, J., Ehlers, M. M., & Bjerrum, M. (2017). What are the short-term and long-term effects of occupation-focused and occupation-based occupational therapy in the home on older adults' occupational performance? A systematic review. *Scandinavian Journal of Occupational Therapy*, 24(4), 235-248. doi:10.1080/11038128.2016.1245357
- Oh, S. K., & Koo, B. K. (2019). A study on the actual condition of cultural leisure activities for the disabled. *Korean Journal of Arts Education*, 17(4), 1-17.
- Schnitzler, A., Jourdan, C., Josseran, L., Azouvi, P., Jacob, L., & Genêt, F. (2019). Participation in work and leisure activities after stroke: A national study. *Annals of Physical and Rehabilitation Medicine*, 62(5), 351-355. doi:10.1016/j.rehab.2019.04.005
- Seo, W. S., & Seo, W. Y. (2020). A study on the processes of dehospitalization of people with significant disabilities in the community: Based on grounded theory. *Health and Social Welfare Review*, 40(2), 85-120. doi:10.15709/hswr.2020.40.2.85
- Shandra, C. L. (2021). Disability and patterns of leisure participation across the life course. *The Journals of Gerontology: Series B*, 76(4), 801-809. doi:10.1093/geronb/gbaa065
- Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. *Psychological Reports*, 51(2), 663-671. doi:10.2466/pr0.1982.51.2.663
- Shin, S. B. (2017). Analysis of the determinants of quality of life of people with disabilities in Korea. *The Journal of Humanities and Social Science*, 8(4), 1043-1067.
- Smith, N. R., Kielhofner, G., & Watts, J. H. (1986). The relationships between volition, activity pattern, and life satisfaction in the elderly. *The American Journal of Occupational Therapy*, 40(4), 278-283.
- Vincent-Onabajo, G., & Blas, C. (2016). Participation in leisure activities after stroke: A survey of community-residing stroke survivors in Nigeria. *Neuro Rehabilitation*, 38(1), 45-52. doi:10.3233/NRE-151294
- Yoon, C. B., Yoon, S. Y., & Park, S. J. (2021). A study on development of a classification system about Korean leisure activities types: Focus on a survey on National Leisure Activities. *Journal of Leisure Studies*, 19(2), 85-110.

Abstract

Effect of Leisure Activities Based on the Model of Human Occupation on Quality of Life, Self-efficacy, and Time Use of Community-dwelling Persons With Disabilities

Lim, Jihyun*, Yoo, Daeseong*, Yu, Seojin*, Lee, Jihye*, Kim, Hee**, Ph.D., O.T.

*Dept. of Occupational Therapy, Konyang University, Undergraduate Studente

**Dept. of Occupational Therapy, Konyang University, Associate Professor

Purpose: This study aimed to determine the effect of leisure activities based on the Model of Human Occupation on the quality of life (QoL), self-efficacy, and time use of community-dwelling persons with disabilities.

Methods: The participants of this study included 15 community-dwelling persons with disabilities, recruited through a public health center. The participants were matched with 2-3 undergraduate volunteers majoring in occupational therapy, and evaluation and intervention were provided under the guidance of an occupational therapist in charge of community rehabilitation and a professor from the OT department. The study used a single-group pretest/posttest research design. The intervention was conducted in 10 sessions over 10 weeks. The Korean version of the WHO Quality of Life Scale-shortened version was used to evaluate QoL before and after the intervention, the General Self-efficacy Scale was used to evaluate self-efficacy and the Occupational Questionnaire (OQ) was used to evaluate time use.

Results: Through 10 weeks of leisure based on the Model of Human Occupation, the QoL of community-dwelling persons with disabilities showed improvements in overall QoL, physical health, and social relationships. The self-efficacy did not show significant improvement. The time use showed significant change is overall areas of in overall areas of OQ.

Conclusion: We expect persons living in community to benefit from more visiting rehabilitation in order to engage in leisure activities of their choice.

Key words: Leisure, Model of human occupation, People with disability in community people, Visiting rehabilitation