




Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری سرطان پستان



سرطان سینه شایع‌ترین سرطان در زنان است. این بیماری همچنین در زنان زیر ۵۰ سال شایع‌تر از سایر سرطان‌ها است. عوامل مختلفی بر خطر ابتلا تأثیر دارند؛ بعضی قابل تغییر هستند و با سبک زندگی می‌توان آن‌ها را کنترل کرد، ولی برخی دیگر خارج از کنترل ما هستند.

می‌تواند خطر ابتلا به سرطان سینه و سایر بیماری‌های مهم را کاهش دهد.

و فراموش نکنید که توصیه‌های غربالگری را دنبال کنید.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:

✓ فعالیت بدنی – هدف حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت بدنی در روز باشد

فعالیت بدنی علاوه بر کاهش خطر سرطان سینه، در پیشگیری از سرطان روده بزرگ، بیماری‌های قلبی، دیابت و سکنه هم نقش دارد. فعالیت‌هایی را که دوست دارید انتخاب کنید و آن‌ها را در روال روزانه‌تان بگنجانید. ده دقیقه اینجا و آنجا در طول روز می‌تواند به سرعت به سی دقیقه‌ای که نیاز دارید اضافه شود. به جای آسانسور از پله‌ها استفاده کنید. با یک دوست قدم بزنید.

✓ وزن سالم را حفظ کنید

حفظ وزن مناسب، به‌ویژه بعد از یائسگی، خطر ابتلا به سرطان سینه و چند سرطان دیگر (روده بزرگ، کلیه، لوزالمعده و رحم) را کاهش می‌دهد. برای کنترل وزن: فعالیت بدنی منظم داشته باشید. رژیم غذایی سرشار از میوه، سبزیجات و غلات کامل مصرف کنید. غذا را آهسته و در وعده‌های کوچک‌تر بخورید. در صورت دشواری، از پزشک یا مشاور تغذیه کمک بگیرید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ از قرص‌های ضد بارداری پرهیز کنید - با پزشک درباره خطرات و فواید صحبت کنید.

قرص‌های ضد بارداری هم خطرات و هم فواید دارند. مصرف آن‌ها کمی خطر سرطان سینه را افزایش می‌دهد، اما پس از قطع مصرف، این خطر از بین می‌رود. هم چنین این قرص‌ها خطر سکتة مغزی و حمله قلبی نیز در حین مصرف قرص افزایش می‌دهند - به ویژه اگر زن سیگار بکشد. با این حال، مزایای دیگر آن مثل کاهش خطر سرطان تخمدان و رحم و جلوگیری از بارداری ناخواسته نیز باید در نظر گرفته شود. در نتیجه با یک پزشک درباره خطرات و مزایای آن‌ها صحبت کنید. و با هم می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا آن‌ها برای شما مناسب هستند یا نه.

✓ از درمان هورمونی یائسگی پرهیز کنید - با پزشک درباره خطرات و مزایا صحبت کنید

در حالی که درمان هورمونی یائسگی می‌تواند علائم متوسط تا شدید یائسگی را درمان کند، همچنین می‌تواند خطر ابتلا به سرطان سینه را افزایش دهد. اگر زنان تصمیم به استفاده از هورمون درمانی برای کاهش علائم یائسگی (مانند تعریق شبانه، گرگرفتگی، و خشکی واژن) بگیرند، باید برای کوتاه‌ترین مدت ممکن باشد - نه بیشتر از ۱ تا ۳ سال. با یک پزشک درباره خطرات و مزایای درمان هورمونی یائسگی صحبت کنید.

✓ از مصرف الکل پرهیز کنید:

حتی مصرف کم الکل هم می‌تواند خطر سرطان سینه را افزایش دهد. اگر مصرف می‌کنید، بهتر است میزان آن را کاهش دهید یا ترک کنید.

✓ رژیم غذایی سالم:

روزانه ۵ تا ۹ وعده میوه و سبزیجات بخورید. ترکیبات گیاهی موجود در آن‌ها می‌تواند اثر محافظتی در برابر سرطان داشته باشد. راهکارها: افزودن میوه به غلات صبحانه یا ماست، اضافه کردن سبزیجات به غذا

✓ سیگار نکشید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. سیگار کشیدن خطر ابتلا به ۱۵ نوع سرطان، از جمله سرطان سینه را افزایش می‌دهد. ترک سیگار در هر سنی باعث بهبود سلامت می‌شود.





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل تولیدمثلی:

➤ سن اولین قاعدگی

زنانی که در سنین پایین اولین قاعدگی خود را تجربه می کنند، خطر ابتلا به سرطان سینه در آن ها بیشتر است. این به این دلیل است که قاعدگی زودرس بدن زن را در طول عمرش به مقادیر بیشتری از استروژن (هورمون تولید مثل زنانه) معرض قرار می دهد. استروژن بیشتر در طولانی مدت می تواند خطر سرطانی شدن سلول های پستان را افزایش دهد.

➤ سن در اولین زایمان

زنانی که برای اولین بار در سن بالا بچه دار می شوند، خطر ابتلا به سرطان سینه در آن ها بیشتر است. یکی از دلایل ممکن است این باشد که بارداری بافت پستان را به طور دائمی تغییر می دهد و احتمال تبدیل شدن آن به سرطان را کاهش می دهد. هرچه این تغییر دیرتر در زندگی یک زن رخ دهد، زمان بیشتری برای غیرطبیعی شدن و سرطانی شدن سلول های پستان وجود دارد.

➤ تعداد زایمان ها

زنان که کمتر از ۲ فرزند دارند، خطر ابتلا به سرطان سینه در آن ها بیشتر است. یکی از دلایل این است که بارداری سطح هورمون ها و بافت پستان را به گونه ای تغییر می دهد که به محافظت از سلول های پستان در برابر سرطانی شدن کمک می کند

➤ شیردهی

زنانی که به مدت یک سال یا بیشتر شیر می دهند، خطر ابتلا به سرطان سینه کمتری دارند. این به این دلیل است که شیردهی می تواند تغییراتی در هورمون ها و بافت پستان ایجاد کند که به محافظت از سلول ها در برابر سرطانی شدن کمک می کند.

زنان شیرده همچنین خطر کمتری برای ابتلا به سرطان تخمدان دارند.

➤ سن یائسگی

زنانی که در سنین بالاتر به یائسگی می رسند خطر ابتلا به سرطان سینه بیشتری دارند.





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن:

خطر با افزایش سن بیشتر می شود. بیشترین موارد در زنان بالای ۵۰ سال دیده می شود.

▪ جنسیت:

بیشتر از ۹۹٪ موارد در زنان است.

▪ سابقه خانوادگی و ژنتیک:

داشتن مادر یا خواهر مبتلا، به ویژه در سنین پایین، خطر را افزایش می دهد.
اگر یک زن چندین خویشاوند مبتلا به این بیماری داشته باشد خطر افزایش می یابد.
بعضی جهش ها مثل BRCA1 و BRCA2 ارثی هستند و خطر بالایی ایجاد می کنند.

▪ قد بلند:

با افزایش خطر همراه است (احتمالاً به دلیل عوامل هورمونی رشد).

▪ وزن هنگام تولد:

وزن بالاتر در زمان تولد → افزایش خطر پیش از یائسگی.

▪ چگالی پستان:

زنانی که سینه های متراکم دارند، بیشتر در معرض خطر هستند. این موضوع در ماموگرافی مشخص می شود.

▪ بیماری های خوش خیم پستان:

بیشترشان بی خطرند، اما بعضی مثل هایپرپلازی غیرطبیعی می توانند ریسک را بالا ببرند.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

فراموش نکنید که غربالگری سرطان سینه را انجام دهید.

نکات غربالگری

غربالگری به تشخیص زودهنگام کمک می کند، زمانی که بیماری قابل درمان تر است.

برای اکثر زنان، ماموگرافی های منظم می توانند از سن ۴۰ سالگی آغاز شوند، اما توصیه های خاص بسته به سن و خطر متفاوت است.


❖ **اگر سن شما ۴۰ تا ۴۴ سال است:** می توانید تصمیم بگیرید که ماموگرافی سالانه را شروع کنید. مهم است که با یک پزشک صحبت کنید.

❖ **اگر سن شما بین ۴۵ تا ۵۴ سال است:** ماموگرافی هر سال توصیه می شود.

❖ **اگر سن شما ۵۵ سال یا بیشتر است:** ماموگرافی هر دو سال یکبار توصیه می شود (یا سالانه در صورت تمایل).

معاینه بالینی یا خودآزمایی سینه توصیه نمی شود، اما باید با سینه های خود آشنا باشید و به محض اینکه هر گونه تغییر در ظاهر یا احساس سینه های خود مشاهده کردید، به یک پزشک اطلاع دهید.

علائم سرطان سینه



پری هوشمند سلامت



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه که درباره سرطان سینه می دانیم، این موارد هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

شما کمتر از ۳۰ دقیقه در روز فعالیت بدنی دارید.

شما در کودکی اضافه وزن نداشتید.

شما در بیشتر روزها کمتر از ۵ وعده میوه و سبزیجات می خورید.

تولد و داشتن کمتر از ۲ فرزند

شما بیماری خوش خیم پستان دارید.

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

شما سیگار نمی کشید.

تو قبلند نیستی.

الکل نمی نوشید.

شما سابقه خانوادگی سرطان سینه ندارید.

شما ۱۲ ساله یا بزرگتر بودید وقتی که پریدتان شروع شد.

شما در حال حاضر قرص های ضدبارداری مصرف نمی کنید.

شما در زمان تولد کمتر از ۸ و نیم پوند وزن داشتید.

شما سینه های متراکمی ندارید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

هوشمند سلامت

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟

ریسک بالا (High Risk)		ریسک متوسط / کم (Average) / Low Risk
نسبت مقایسه	جهش ژنتیکی با نفوذ بالا	نداشتن جهش ژنتیکی شناخته‌شده
بالاتری دارد	سابقه خانوادگی قابل توجه	مثلاً BRCA1/2
	سابقه پرتودرمانی قفسه سینه در سن جوان	نداشتن سابقه خانوادگی قوی
	سابقه ضایعات پستانی پرخطر (مثلاً آتیپیکال هیپرپلازی، LCIS)	نداشتن سابقه پرتودرمانی قفسه سینه در سنین پایین

می‌توان با دقت بیشتری محاسبه کرد.

• علم همواره در حال پیشرفت است و ممکن است عوامل جدیدی در آینده شناخته شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟


Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

توصیه‌ها

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

- **سبک زندگی سالم:** ورزش منظم، تغذیه غنی از میوه، سبزیجات و غلات کامل، حفظ وزن مناسب، پرهیز از مصرف زیاد الکل و سیگار

• **غربالگری منظم:**

- توصیه اغلب گایدلاین‌ها شروع ماموگرافی در سن ۴۰ سالگی است؛ برخی موارد ممکن است از ۴۵ سال آغاز شود.

- فرکانس معمول: سالیانه یا دو سال یک بار، بسته به دستور پزشک و تراکم پستان
- معاینه بالینی و آگاهی از تغییرات پستان توصیه می‌شود
- در صورت مشاهده تغییرات: حساس باشید به هر تغییری در پستان (توده، ترشحات غیرمعمول، تغییرات ظاهری) و سریعاً به پزشک مراجعه کنید



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

افراد ریسک بالا باید مراقبت بیش‌تری داشته باشند. طبق گایدلاین‌های به‌روز توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:

۱. ارزیابی ژنتیکی و مشاوره

- بررسی سابقه خانوادگی سه نسل و توجه به سن ابتلای بستگان، سرطان‌های همراه (مثلاً سرطان تخمدان، پانکراس)
- معرفی به مشاور ژنتیک و در صورت لزوم انجام تست ژنتیکی (BRCA1, BRCA2, PALB2, TP53) و دیگر ژن‌های قابل اقدام)

۲. غربالگری فشرده‌تر

- شروع زودهنگام: بعضی گایدلاین‌ها توصیه می‌کنند شروع از سن ۳۰ سال یا تقریباً ۱۰ سال قبل از سن ابتلای نزدیک‌ترین عضو خانواده مبتلا باشد
- ترکیب ماموگرافی + MRI سالانه: برای افزایش حساسیت تشخیص در افراد با ریسک بالا، MRI به عنوان مکمل توصیه می‌شود.
- اگر MRI در دسترس نباشد، گزینه‌های جایگزین مثل ماموگرافی با کنتراست، امیجینگ عملکردی یا اولتراسوند پشتیبان می‌تواند مطرح شود

۳. داروپیشگیری (Chemoprevention)

- زنان پرخطر ممکن است گزینه استفاده از تاموکسیفن یا رالوکسیفن به منظور کاهش خطر ابتلا به سرطان پستان را بررسی کنند (اگر شرایط مناسب داشته باشند)

۴. جراحی پیشگیرانه

- در موارد بسیار پرخطر یا جهش‌های بسیار قدرتمند، برخی زنان ممکن است گزینه ماستکتومی پیشگیرانه دوطرفه یا اوفورکتومی پیشگیرانه را در نظر بگیرند (بسته به سن، وضعیت سلامتی و تمایل فردی)

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.