




Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غریبالگری سرطان

پروستات



گرچه بیشتر موارد سرطان پروستات تهدیدی برای زندگی نیستند، ولی سرطان پروستات از نوع تهاجمی احتمال دارد که گسترش یابد و خطرناک باشد.

بیشتر دانشمندان موافقند که عواملی بر خطر ابتلا به سرطان پروستات تهاجمی تأثیر می‌گذارند. برخی از این عوامل ممکن است برای شما صدق کنند، اما برخی دیگر ممکن است صدق نکنند. و برخی را می‌توان تغییر داد، اما برخی دیگر را نمی‌توان تغییر داد.

یک سبک زندگی سالم انتخاب کنید تا خطر ابتلا به سرطان پروستات و همچنین سایر بیماری‌های مهم را کاهش دهید.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:


✓ سیگار نکشید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. سیگار کشیدن خطر ابتلا به ۱۵ نوع سرطان، از جمله سرطان پروستات را افزایش می‌دهد. ترک سیگار در هر سنی باعث بهبود سلامت می‌شود.

✓ وزن سالم را حفظ کنید

افرادی که وزن سالم خود را حفظ می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان پروستات تهاجمی کمتری دارند. نگاه داشتن وزن در حد مناسب همچنین خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان کلیه، سرطان تخمدان، سرطان رحم، بیماری قلبی، دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهد. این یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید.

مراحل سرطان پروستات و پیش آگهی





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ فعالیت بدنی را در زندگی خود بگنجانید.

فعالیت هایی را انتخاب کنید که از آنها لذت می برید، مانند پیاده روی، دویدن احساس نکنید که باید کاهش وزن را به تنهایی انجام دهید. کاهش وزن و حفظ وزن سالم می تواند چالش برانگیز باشد. با یک پزشک یا دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی برای مشاوره صحبت کنید. و به یاد داشته باشید: تغییرات کوچک می توانند با گذشت زمان تفاوت بزرگی ایجاد کنند

✓ یک رژیم غذایی غنی از میوه ها، سبزیجات و غلات کامل بخورید.

✓ غذاهای مبتنی بر گوجه فرنگی بخورید - هدف گذاری برای ۵ وعده یا بیشتر در هفته.

خوردن غذاهای مبتنی بر گوجه فرنگی به طور منظم می تواند خطر ابتلا به سرطان پروستات تهاجمی را کاهش دهد. غذاهای مبتنی بر گوجه فرنگی شامل سس ماکارونی، گوجه فرنگی، سالسا و حتی سس پیتزا هستند. یک وعده حدود 1/2 فنجان سس است. هر چه بیشتر بخورید، بهتر است. نکات:

- پاستای خود را با سس اضافی ماکارونی تزئین کنید.
- گوجه فرنگی خرد شده یا سالسا را به سس ماکارونی، سوپ ها و خوراک ها اضافه کنید.
- گوجه فرنگی تازه را مثل سیب بخورید.
- گوجه فرنگی های خرد شده را در دقیقه آخر پخت به تفت داده اضافه کنید.

✓ از مصرف بیش از حد کلسیم پرهیز کنید - سعی کنید در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ میلی گرم در روز بمانید.

در حالی که کلسیم برای سلامت استخوان ها مفید است و می تواند خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را کاهش دهد، مصرف بیش از حد آن می تواند خطر ابتلا به سرطان پروستات را افزایش دهد. سعی کنید نزدیک به توصیه های ملی برای کلسیم بمانید: مردان بزرگسال ۱۹ تا ۷۰ سال باید روزانه ۱۰۰۰ میلی گرم دریافت کنند؛ مردان ۷۱ سال و بالاتر باید روزانه ۱۲۰۰ میلی گرم دریافت کنند.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن


خطر ابتلا به سرطان پروستات با افزایش سن بالا می‌رود. بیشتر موارد در مردان بالای ۵۰ سال تشخیص داده می‌شود.

▪ قد

مردان قد بلند خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان پروستات دارند. محققان دقیقاً نمی‌دانند چرا، اما ممکن است به این دلیل باشد که افراد قد بلند بیشتر رشد می‌کنند. برخی از همان هورمون‌ها و عوامل دیگری که باعث رشد افراد می‌شوند، ممکن است شانس تبدیل شدن سلول‌های تقسیم‌شونده به سلول‌های غیرطبیعی و سرطانی را نیز افزایش دهند.

▪ سابقه خانوادگی

مردانی که پدر یا برادری با سرطان پروستات دارند، خطر ابتلا به این بیماری در آنها بیشتر است. این به این دلیل است که برخی از سرطان پروستات به جهش‌ها (تغییرات) در ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن مرتبط است که می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا


بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه که درباره سرطان پروستات می دانیم، این ها عواملی هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند. شما می توانید برخی از آن ها را تغییر دهید، اما نه همه آن ها را.

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- شما قدبلند هستید.
- شما سابقه خانوادگی سرطان پروستات دارید.
- شما در هفته ۵ وعده یا بیشتر از غذاهای مبتنی بر گوجه فرنگی نمی خورید.

چیزی که خطر شما را کاهش می دهد:

- شما سیگار نمی کشید.
- شما اضافه وزن ندارید.
- شما آسیایی هستید.





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

هوشمند سلامت

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟

محاسبه ریسک بر اساس عواملی شناخته‌شده است که پژوهش‌های علمی نشان داده‌اند بر احتمال

	ریسک بالا (High Risk)	ریسک متوسط / کم (Average / Low Risk)
جنسیت مقایسه	سابقه خانوادگی نزدیک با سرطان پروستات،	مردانی که فاقد سابقه خانوادگی قوی،
ریسک بالاتری دارد	جهش ژنتیکی مؤثر (مثل BRCA2 و دیگر ژن‌ها)،	فاقد جهش ژنتیکی شناخته‌شده،
	نژاد سیاه / آفریقایی،	فاقد نژاد پرخطر
گروه‌های بزرگ	سایر عوامل افزایش‌دهنده خطر	فاقد یافته‌های مشکوک هستند

• علم همواره در حال پیشرفت است و ممکن است عوامل جدیدی در آینده شناخته شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟

• پیش‌بینی دقیق برای یک فرد ممکن نیست، اما این تخمین‌ها بهترین برآورد علمی فعلی هستند.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

توصیه‌ها

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

سبک زندگی سالم:

فعالیت بدنی منظم، رژیم غذایی، ترک سیگار

تصمیم آگاهانه برای غربالگری (Shared Decision-Making):

مردان باید با پزشک درباره مزایا، مضرات و عدم قطعیت‌های غربالگری (PSA آزمایش، معاینه مقعدی) صحبت کنند.

- شروع غربالگری: امکان آغاز آزمایش PSA بین ۴۵ تا ۵۰ سالگی، البته نه به صورت اجباری بلکه بر اساس وضعیت فردی و ترجیحات.
- فواصل غربالگری: هر ۲ تا ۴ سال برای مردان ۵۰ تا ۶۹ سال توصیه می‌شود.
- توقف غربالگری: معمولاً برای مردان بالای ۷۰ سال یا کسانی که امید به زندگی کمتر از ۱۰ سال دارند توصیه نمی‌شود غربالگری ادامه یابد.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

افراد ریسک بالا باید مراقبت بیش‌تری داشته باشند. طبق گایدلاین‌های به‌روز توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:

۱. ارزیابی ژنتیکی و مشاوره

- بررسی سابقه خانوادگی سده‌سله با دقت، توجه به افراد مبتلا در سنین پایین.
- اگر شواهد ژنتیکی مشکوک وجود داشته باشد، انجام تست‌های ژنتیکی برای جهش‌هایی مثل BRCA2، HOXB13، ATM و سایر ژن‌های مرتبط توصیه می‌شود.

۲. شروع زودتر و فواصل کوتاه‌تر غربالگری

- اغلب منابع توصیه می‌کنند شروع غربالگری از سن ۴۰ سال یا بین ۴۰ تا ۴۵ سال برای افراد پرخطر.
- در این گروه، آزمایش PSA سالانه همراه با معاینه مقعدی (DRE) توصیه می‌شود.
- اگر PSA افزایش یابد، بررسی‌های تکمیلی (MRI، biomarker، پروستات) ممکن است پیش از بیوپسی انجام شوند.

۳. استفاده از MRI و بیوپسی هدفمند:

- برای کسانی که PSA بالا دارند، انجام MRI چندپارامتری (mpMRI) قبل از بیوپسی می‌تواند به بهبود تشخیص سرطان با اهمیت بالاتر کمک کند.
- در صورت وجود ضایعات مشکوک در MRI، بیوپسی هدفمند همراه با بیوپسی نظام‌مند توصیه می‌شود.

۴. پایش فعال (Active Surveillance):

- در مواردی که سرطان تشخیص داده شده کم‌خطر است، برخی افراد ممکن است به جای درمان پرخطر، تحت مانیتورینگ دقیق قرار گیرند تا در صورت پیشرفت درمان آغاز شود.
- این استراتژی برای کسانی که بیماری کم‌خطر دارند و امید به زندگی طولانی دارند، گزینه‌ای منطقی است.

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.