




Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری سرطان دهانه رحم



سرطان دهانه رحم یکی از قابل پیشگیری ترین انواع سرطان ها است. معاینات منظم با تست های پاپ و تست های HPV می توانند به پیشگیری از بیماری یا شناسایی زودهنگام آن در زمانی که قابل درمان ترین است، کمک کنند. و با واکسن توصیه شده HPV برای دختران و پسران پیش از نوجوانی، نرخ سرطان دهانه رحم باید حتی بیشتر کاهش یابد. ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) عامل اصلی سرطان دهانه رحم است.

بیشتر دانشمندان موافقند که این موارد بر خطر ابتلا به سرطان گردن رحم تأثیر می گذارند. برخی ممکن است برای شما صدق کنند، اما برخی دیگر نه. برخی را می توان تغییر داد، اما برخی دیگر را نمی توان.

یک سبک زندگی سالم انتخاب کنید تا خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم و همچنین سایر بیماری های مهم را کاهش دهید. و فراموش نکنید که توصیه های غربالگری را دنبال کنید.

نکات پیشگیری

چیزهایی که می توانی تغییر دهی:

✓ فرزندان خود را در برابر HPV واکسینه کنید

دختران و پسران پیش نوجوان باید در سن ۱۱ یا ۱۲ سالگی واکسن HPV را دریافت کنند. واکسن از HPV محافظت می کند که علت اصلی سرطان دهانه رحم است. ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) همچنین یکی از علل سرطان های دهان/گلو، مقعد، واژن و آلت تناسلی است. نوجوانان یا بزرگسالان جوانی که واکسیناسیون پیش از نوجوانی را از دست داده اند، می توانند هنوز هم واکسن HPV را تا سن بیست سالگی دریافت کنند. با یک پزشک برای کسب اطلاعات بیشتر صحبت کنید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ آزمایش‌های غربالگری انجام دهید

غربالگری‌های منظم با آزمایش‌های پاپ و HPV می‌توانند به پیشگیری از سرطان دهانه رحم یا شناسایی زودهنگام آن در زمانی که درمانش آسان‌تر است، کمک کنند.

آزمایش‌های غربالگری سرطان گردن رحم باید از سن ۲۱ سالگی آغاز شوند:

سن ۲۱ تا ۲۹: تست پاپ هر ۳ سال یک بار.

سن ۳۰ تا ۶۵: تست پاپ اسمیر به همراه تست HPV (که به آن "آزمایش هم‌زمان" گفته می‌شود) هر ۵ سال.

همچنین اشکالی ندارد که هر ۳ سال یک بار فقط آزمایش پاپ اسمیر انجام شود.

پس از سن ۶۵ سالگی: زنانی که به طور منظم نتایج نرمال داشته‌اند ممکن است بتوانند غربالگری را متوقف کنند.

با یک پزشک برای کسب اطلاعات بیشتر صحبت کنید.

✓ سیگار نکشید


بدون سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. سیگار کشیدن خطر ابتلا به ۱۵ نوع سرطان، از جمله سرطان دهانه رحم، را افزایش می‌دهد. دود سیگار حاوی مواد شیمیایی است که می‌توانند ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن را آسیب برسانند و باعث سرطانی شدن آن‌ها شوند.

✓ شرکای جنسی مرد متعدد نداشته باشید

HPV یک عفونت است که می‌تواند از طریق رابطه جنسی منتقل شود و برخی از انواع HPV می‌توانند باعث شوند که سلول‌های دهانه رحم سرطانی شوند.

✓ هر بار که رابطه جنسی دارید از کاندوم لاتکس یا دیافراگم استفاده کنید.

زنانی که هر بار هنگام رابطه جنسی از کاندوم لاتکس یا دیافراگم استفاده می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در آن‌ها کمتر است. این روش‌های کنترل بارداری به عنوان یک مانع در برابر ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و سایر عفونت‌های مقاربتی عمل می‌کنند. برخی از انواع HPV می‌توانند باعث شوند که سلول‌های دهانه رحم سرطانی شوند.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

▪ سن:

خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم با افزایش سن بالا می‌رود. با این حال، به دلیل غربالگری گسترده در ایالات متحده، خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در حدود سن ۴۰ سالگی متوقف می‌شود و پس از آن نسبتاً ثابت باقی می‌ماند. میانگین سنی که این بیماری در ایالات متحده شناسایی می‌شود ۴۹ سال است.

▪ رابطه جنسی در سنین پایین:

زنانی که برای اولین بار در سنین پایین رابطه جنسی دارند، خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم در آن‌ها بیشتر است. این ممکن است به این دلیل باشد که ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) می‌تواند به راحتی دهانه رحم یک زن جوان را آلوده کند زیرا سلول‌های دهانه رحم هنوز نابالغ هستند.

▪ عفونت‌های منتقل‌شونده از راه جنسی:

زنان مبتلا به عفونت‌های مقاربتی—به ویژه HPV—ریسک بالاتری برای ابتلا به سرطان دهانه رحم دارند. برخی از انواع HPV می‌توانند باعث شوند که سلول‌های دهانه رحم سرطانی شوند. سایر عفونت‌های مقاربتی نیز ممکن است باعث شوند سلول‌های دهانه رحم سرطانی شوند. زنانی که عفونت‌های مقاربتی دارند، همچنین در معرض خطر بالاتری برای مشکلات بهداشتی دیگر مانند ناباروری و درد لگن هستند.

هر کسی که احساس می‌کند ممکن است به عفونت مقاربتی مبتلا شده باشد باید فوراً با یک پزشک صحبت کند. بیشتر عفونت‌های مقاربتی قابل درمان هستند. ممکن است صحبت کردن درباره این عفونت‌ها برای مردم سخت باشد، اما مهم است که هر چه زودتر درمان شوند.

▪ تعداد زایمان‌ها:

زنانی که زایمان می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان دهانه رحم بیشتری دارند. این ممکن است به آسیب‌هایی که به دهانه رحم وارد می‌شود زمانی که نوزاد از رحم (رحم) از طریق دهانه رحم خارج می‌شود، مربوط باشد.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

فراموش نکنید که غربالگری سرطان دهانه رحم را انجام دهید.

نکات غربالگری

غربالگری‌های منظم با آزمایش‌های پاپ و HPV به تشخیص زودهنگام کمک می‌کند، زمانی که بیماری قابل درمان‌تر است.

آزمایش‌های غربالگری سرطان گردن رحم باید از سن ۲۱ سالگی آغاز شوند:

❖ **اگر سن شما ۲۱ تا ۲۹ است:** تست پاپ هر ۳ سال یک بار.

❖ **اگر سن شما ۳۰ تا ۶۵ است:** تست پاپ اسمیر به همراه تست HPV (که به آن "آزمایش هم‌زمان" گفته می‌شود) هر ۵ سال.

همچنین اشکالی ندارد که هر ۳ سال یک بار فقط آزمایش پاپ اسمیر انجام شود.

❖ **اگر سن شما بیش از ۶۵ است:** زنانی که به طور منظم نتایج نرمال داشته‌اند ممکن است بتوانند غربالگری را متوقف کنند.

با یک پزشک برای کسب اطلاعات بیشتر صحبت کنید.

تست پاپ اسمیر

تشخیص سریع سلول های سرطانی

بررسی سلول های دهانه ی رحم

تشخیص سلول های مشکوک به سرطان



دکتر مایکو

دکتر مایکو هوشمند سلامت



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه که درباره سرطان دهانه رحم می دانیم،

این موارد هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- شما یک یا چند فرزند به دنیا آورده اید.
- شما واکسن HPV را دریافت نکرده اید.
- شما عفونت HPV داشته اید.
- شما در ۳ تا ۵ سال گذشته آزمایش پاپ، یا آزمایش پاپ + HPV نداشته اید.

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

- شما سیگار نمی کشید.
- شما تعداد شرکای جنسی مرد را محدود می کنید.
- روش اصلی کنترل بارداری شما کاندوم یا دیافراگم است

از سلامت رحم خودت آگاه باش

آیا این علائم مشکوک به سرطان دهانه رحم رو داری؟



خونریزی
غیر طبیعی
واژن



درد در حین
یا بعد از
رابطه



بوی نا
خوشایند
ترشحات واژن



خونریزی بعد
از یانسی



درد پاها



درد لگنی



کاهش وزن



احساس خستگی
همیشگی



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه محاسبه می‌شود؟



چرا باید به آن توجه کرد؟

توصیه‌ها

SMART CANCER
Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

- **سبک زندگی سالم:** پرهیز از مصرف سیگار
 - **واکسیناسیون HPV:** بهترین زمان در سن ۱۱-۱۲ سال، اما افراد جوان‌تر یا بزرگسالان واجد شرایط باید در نظر گرفته شوند.
 - **غربالگری منظم:** طبق توصیه‌ها:
 - ۲۱-۲۹ سال: پاپ هر ۳ سال
 - ۳۰-۶۵ سال: پاپ + HPV هم‌زمان هر ۵ سال یا پاپ هر ۳ سال
- بعد از ۶۵ سال: اگر سابقه‌ی منفی مستمر دارند، با مشورت پزشک می‌توان غربالگری را متوقف کرد
- **کاهش تعداد شرکای جنسی و استفاده محافظتی:** کاندوم یا دیافراگم به‌عنوان مکملی در کاهش خطر HPV و سرطان سرویکس



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

افراد ریسک بالا باید مراقبت بیش‌تری داشته باشند. طبق گایدلاین‌های به‌روز توصیه‌های زیر مطرح شده‌اند:

۱. غربالگری زودتر و پیشرفته‌تر:

- ✓ شروع بحث غربالگری ممکن است از سنین پایین‌تر باشد (بسته به وضعیت فردی).
- ✓ اگر HPV مثبت یا پاپ غیرطبیعی دارند، باید پیگیری نزدیک‌تری (کولپوسکوپی، بیوپسی) انجام شود.

۲. پایش فعال بیشتر:

- ✓ در زنانی با سیستم ایمنی ضعیف یا HIV، توصیه می‌شود که غربالگری را زودتر شروع کنند و با فاصله کمتر ادامه دهند.
- ✓ ممکن است نیاز به معاینات بیشتر و پیگیری کوتاه‌مدت‌تر بین دوره‌های استاندارد باشد.

۳. درمان ضایعات پیش‌سرطانی:

- ✓ اگر ضایعاتی در کولپوسکوپی یا بیوپسی شناسایی شوند (مثل CIN2/3)، اقدام درمانی (LEEP، کونوس، درمان موضعی) ضروری است.
- ✓ بعد از درمان، پیگیری سالانه یا بیشتر با پاپ + HPV توصیه می‌شود.

۴. مداخله پیشگیرانه:

- ✓ در موارد بسیار پرخطر یا سابقه متعدد ضایعات: در برخی شرایط ممکن است هیستریکتومی پیشگیرانه مدنظر قرار گیرد (بسته به تمایل به بارداری و شرایط فردی).

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.