




Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

غربالگری

سرطان معده



نکات پیشگیری

چیزهایی که می‌توانی تغییر دهی:

درمان عفونت هلیکوباکتر پیلوری (H. pylori):

مهم‌ترین عامل قابل پیشگیری، درمان ریشه‌کن‌کننده عفونت هلیکوباکتر می‌باشد.

سیگار نکشید:

ترک سیگار بودن اولین و مهم‌ترین کاری است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. سیگار کشیدن خطر ابتلا به ۱۵ نوع سرطان، از جمله سرطان معده را افزایش می‌دهد. ترک سیگار در هر سنی باعث بهبود سلامت می‌شود.

✓ وزن سالم را حفظ کنید

افرادی که وزن سالم خود را حفظ می‌کنند، خطر ابتلا به سرطان پروستات تهاجمی کمتری دارند. نگه‌داشتن وزن در حد مناسب همچنین خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، سرطان کلیه، سرطان تخمدان، سرطان رحم، بیماری قلبی، دیابت و سکته مغزی را کاهش می‌دهد. این یکی از بهترین کارهایی است که می‌توانید برای سلامتی خود انجام دهید. پرس‌های کوچکتر انتخاب کنید و آرام‌تر غذا بخورید. یک رژیم غذایی غنی از میوه‌ها، سبزیجات و غلات کامل بخورید.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند


✓ از مصرف الکل پرهیز کنید:

حتی مصرف کم الکل هم می تواند خطر سرطان سینه را افزایش دهد. اگر مصرف می کنید، بهتر است میزان آن را کاهش دهید یا ترک کنید.

✓ از قرار گرفتن در معرض مواد شیمیایی محل کار خودداری کنید

برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) را بخوانید و از تجهیزات حفاظتی مناسب استفاده کنید. افرادی که در معرض برخی مواد شیمیایی محل کار قرار دارند، خطر ابتلا به سرطان مثانه در آنها بیشتر است. این به این دلیل است که برخی از مواد شیمیایی می توانند ساختار ژنتیکی (DNA) در سلول های بدن را آسیب برسانند. این آسیب به DNA می تواند باعث شود که سلول ها سرطانی شوند. خواندن و درک برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) بخش ضروری برای ایمن نگه داشتن شما در محل کار است. برگه های اطلاعات ایمنی مواد (MSDS) توضیح می دهند که کدام مواد شیمیایی در یک محل کار وجود دارند، خطرات بهداشتی کار با آن مواد شیمیایی چیست و رویه هایی که باید برای کار با آن ها به طور ایمن دنبال کنید چیست. تجهیزات حفاظتی شامل دستگاه های تنفسی، محافظ چشم، لباس های ویژه، دستکش و چکمه ها می شود. اگر به درستی استفاده شوند، می توانند شما را از مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک که می توانند باعث سرطان و سایر بیماری های جدی شوند، محافظت کنند.

مراحل سرطان معده





Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

عوامل غیر قابل تغییر:

هوشمند سلامت

▪ سن:

خطر ابتلا به سرطان لوزالمعده با افزایش سن افزایش می‌یابد. شیوع آن بعد از ۵۰ سال بیشتر می‌شود.

▪ جنسیت:

مردان نسبت به زنان خطر بیشتری برای ابتلا به سرطان معده دارند. با این حال، این تفاوت در طول زمان در ایالات متحده در حال کاهش است. این ممکن است به عوامل خطر سرطان، مانند سیگار کشیدن، که در زنان رایج‌تر می‌شود، مربوط باشد.

▪ سابقه خانوادگی یا ژنتیکی:

افرادی که یکی از بستگان نزدیک (مادر، پدر، برادر یا خواهر) آنها به سرطان معده یا سندرم‌های ارثی مثل Hereditary diffuse gastric cancer (CDH1 mutation) مبتلا است، خطر ابتلا به این بیماری در آنها بیشتر است. این به این دلیل است که برخی از سرطان لوزالمعده به جهش‌های ساختار ژنتیکی (DNA) سلول‌های بدن مرتبط است که می‌تواند از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

▪ گروه خونی:

گروه خونی A در بعضی مطالعات، با افزایش خطر ابتلا به سرطان معده مرتبط هستند. دقیقاً مشخص نیست که چرا این امر چنین است، اما ممکن است حداقل تا حدی به این دلیل باشد که برخی از گروه‌های خونی باعث واکنش‌های ایمنی و التهابی می‌شوند که در توسعه سرطان نقش دارند.

▪ سابقه جراحی معده:

مخصوصاً گاسترکتومی جزئی قدیمی می‌تواند ریسک ابتلا به سرطان معده را افزایش دهد. این تغییرات غیرطبیعی در سلول‌های لوزالمعده به علت تغییرات مزمن مخاط ممکن است با گذشت زمان به سرطان منجر شوند.



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

چه مواردی خطر ابتلا را افزایش یا کاهش می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

بر اساس نحوه پر کردن پرسشنامه و آنچه درباره سرطان معده می دانیم، اینها عواملی هستند که بر خطر ابتلا به این بیماری تأثیر می گذارند. شما می توانید برخی از آنها را تغییر دهید، اما نه همه آنها را.

چه چیزی خطر شما را افزایش می دهد:

- شما گروه خونی A، A+، A- دارید
- شما سابقه خانوادگی سرطان معده دارید.

چه چیزی خطر شما را کاهش می دهد:

- شما سیگار نمی کشید.
- شما اضافه وزن ندارید.
- الکل
- شما نمک زیادی مصرف نمی کنید.

علائم سرطان معده



استفراغ



احساس سیری زودرس



درد شکم



اسهال



سوزش سر دل



حالت تهوع



کاهش وزن



Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)

شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

نمودار خطر ابتلا به بیماری چه چیزی را نشان می دهد؟

بررسی ریسک ابتلا

این نمودار، تخمینی از احتمال ابتلای شما به بیماری را در مقایسه با فردی

هم‌سن و هم‌جنس شما نشان می‌دهد.

⚠ توجه: این فقط یک برآورد است. نمودار نمی‌تواند پیش‌بینی کند که شما حتماً بیمار می‌شوید یا حتماً سالم می‌مانید. هدفش این است که نشان دهد در چه سطحی از ریسک هستید و چه اقداماتی می‌توانید برای کاهش آن انجام دهید. اگر نگرانی دارید، بهترین کار مشورت با پزشک است.

چگونه به شما می‌شود؟	
ریسک بالا (High Risk)	ریسک متوسط / کم (Average / Low Risk)
سابقه خانوادگی سرطان معده	فردی که فاقد عوامل ژنتیکی شناخته‌شده،
وجود ضایعات پیش‌سرطانی معده مثل آتروفی معده، متاپلازی روده‌ای یا دیسپلازی	نتیجه این فاکتور سابقه خانوادگی برجسته
عفونت مزمن با Helicobacter pylori	یا پایین‌ترین فاکتور شرایط پیش‌سرطانی معده باشد
گروه ژنتیکی جهش‌یافته (مثلاً CDH1 در سندرم سرطان معده منتشر ارثی)	چرا فقط این
جمعیت مهاجر یا افراد از مناطق با شیوع بالای سرطان معده	• پیش‌بینی دقیق ریسک یک
سابقه قرارگیری در محیط با عوامل خطر زیست‌محیطی یا صنعتی (نمک زیاد، غذاهای شور یا فرآوری‌شده)	می‌توان با دقت بیشتری محاسبه کرد.
	• علم همواره در حال پیشرفت
	شوند یا وزن عوامل فعلی تغییر کند.

چرا باید به آن توجه کرد؟

توصیه‌ها


Artificial Intelligence Pouya Pardazan
Asr Hooshmand Company (AI-PPAH Co.)
شرکت هوش مصنوعی
پویا پردازان عصر هوشمند

✓ توصیه‌ها برای افراد با ریسک متوسط / کم

درمان عفونت H. pylori: این کار یکی از مؤثرترین مداخلات پیشگیرانه است.

سبک زندگی سالم:

- ترک سیگار: شواهد قوی نشان می‌دهد که سیگار کشیدن خطر سرطان معده را افزایش می‌دهد.
- کاهش مصرف نمک، غذاهای شور، نمک‌سود و غذاهای فرآوری‌شده
- افزایش مصرف میوه، سبزی و غلات کامل
- کنترل وزن بدن و فعالیت بدنی منظم

پایش علایم بالینی: در صورتی که علائمی مانند درد معده مزمن، کاهش وزن بی‌دلیل،

خونریزی گوارشی یا مشکل بلع وجود داشت، سریع به پزشک مراجعه کنید.

گایدلاین‌ها تأکید می‌کنند که غربالگری افراد بدون علامت و بدون ریسک بالا مؤثر نیست و ممکن است باعث زحمت، هزینه و آسیب‌های غیرضروری شود.



✓ توصیه‌ها ویژه برای افراد با ریسک بالا

برای افراد پرخطر، برخی گایدلاین‌ها توصیه به انجام مداخلات دقیق‌تر و پایش کرده‌اند. این اقدامات مشروط، با مزایا و معایب، باید با آگاهی کامل و در مراکز دارای تجربه انجام شوند.

۱. تشخیص زودتر و پایش آندوسکوپی

- انجام گاستروسکوپی (endoscopy فوقانی) با نمونه‌برداری سیستماتیک برای بیماران پرخطر توصیه می‌شود.
- آندوسکوپی باید با سیستم تصویربرداری با کیفیت بالا و پروتکل نمونه‌برداری استاندارد انجام شود.
- اگر آتروفی یا متاپلازی روده‌ای گسترده وجود داشته باشد، آندوسکوپی تکراری هر ۳ سال (یا زودتر بسته به عوامل همراه) پیشنهاد شده است.

۲. درمان H. pylori

- درمان کامل عفونت H. pylori در افراد مشکوک یا مبتلا ضروری است، به عنوان اقدام پیشگیرانه اولیه (primary prevention).
- پیگیری‌های پس از درمان ممکن است لازم باشد، مخصوصاً در صورت ضایعات پیش‌سرطانی.

۳. مدیریت ضایعات پیش‌سرطانی

- اگر ضایعاتی مثل دیسپلازی شناسایی شوند، باید بررسی و درمان صورت گیرد (بسته به درجه و وسعت ضایعه).
- پس از برداشتن ضایعات یا درمان شدن، پایش منظم ضروری است.

۴. انتخاب افراد مناسب برای پایش

- افراد باید از نظر شرایط عمومی و امید به زندگی در وضعیتی باشند که بتوانند از مزایای درمان احتمالی بهره‌مند شوند (یعنی اگر وضعیت فرد طوری باشد که درمان نتواند فایده قابل توجهی داشته باشد، ممکن است پایش متوقف شود).

تصمیم درباره این رویکردها باید با مشاوره کامل تخصصی، بررسی مزایا و معایب و ارزیابی

دقیق انجام شود.